

В хірургічне відділення доставлено чоловіка 35 років з гнійною раною на шиї попереду трахеї (в ділянці переднотрошевого простору). Куди може розповсюджуватись інфекція, якщо хворому терміново не зроблять операцію?

В грудну порожнину – переднє середостіння

В грудну порожнину – в середнє середостіння

В грудну порожнину – в заднє середостіння

В позаднотрошевий простір

В надгруднинний міжпонеуротичний простір

У хворого запалення легенів ускладнилось ексудативним плевритом. В якому з перелічених анатомічних утворень переважним чином може накопичуватись рідина?

Sinus costodiaphragmaticus pleurae

Sinus costomediastinalis pleurae

Sinus phrenicomediastinalis pleurae

Sinus transversus pericardii

Sinus obliquus pericardii

Хвора К., 30 років, скаржиться на сильну спрагу, сухість у роті, які з'явилися після сильного нервового потрясіння. При лабораторному обстеженні виявлено збільшення цукру в крові до 10 ммоль/л. Захворювання якої ендокринної залози у хворої?

Підшлункової

Щитоподібної

Статевих

Надниркових

Епіфіза

Хвора Б., 39 років, яка протягом 8 років не може завагітніти. Їй порадили звернутись до ендокринолога. При обстеженні у хворої виявлено екзофтальм, тремор повік, тахікардію. Захворювання якої ендокринної залози супроводжується такими симптомами?

Щитоподібної

Підшлункової

Статевих

Надниркових

Епіфіза

До лікаря звернулася мати, син якої за літо виріс на 18 см. При обстеженні хлопця 12 років: зріст – 180 см, вага 68 кг. З порушенням діяльності якої ендокринної залози це пов'язано?

Гіпофіза

Щитоподібної

Статевих

Надниркових

Епіфіза

У новонародженого під час сечовиділення з сечового міхура спостерігається виділення сечі із пупка. Чим обумовлене це явище?

Незарощення сечової протоки

Незарощення жовчної протоки

Неповна нориця

Ектопія вічка сечоводу

Дивертикул сечового міхура

Жінка 25 років госпіталізована в гінекологічне відділення з метою операції з приводу

пухлини яєчника. При здійсненні операції необхідно розсікати зв'язку, що з'єднує яєчник з маткою. Яку саме?

Lig. ovarii proprium

Lig. cardinale

Lig. latum uteri

Lig. suspensorium ovarii

Lig. umbilicale laterale

Чоловік 35 років звернувся до лікаря із скаргами на біль та припухлість правого яєчка. При обстеженні була виявлена пухлина, що потребує операції, під час якої необхідно розсікати 7 шарів калитки до білкової оболонки. Яка оболонка буде розсічена останньою перед білковою оболонкою?

Tunica vaginalis testis

Tunica spermatica externa

Tunica dartos

Tunica spermatica interna

Cutis

Після травми обличчя у хворого гематома щічної ділянки. Відтік з якої слинної залози заблоковано гематомою?

Привушна

Під'язикова

Піднижньощелепна

Губна

Щічна

Пацієнт помилково випив розчин оцтової кислоти. Яка оболонка стравоходу зазнала найбільших пошкоджень?

Слизова

М'язова

Серозна

Еластична мембрана

М'язова і серозна

В клініку госпіталізована пацієнтка із пухлиною, розташованою у середній частці правої легені. Показана операція. Яку найбільшу кількість сегментів можна видалити у складі цієї частки?

2

3

4

5

1

Дитина 3-х років поступила у лікарню з чужорідним тілом у бронхах. В який бронх вірогідніше всього потрапило чужорідне тіло?

В правий головний бронх

В лівий головний бронх

В правий сегментарний бронх

В лівий сегментарний бронх

В часточковий бронх

Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з вічок сечоводів сеча не надходить. Який відділ сечовидільної системи було ушкоджено при операції?

Ureter
Pelvis renalis
Uretra
Vesica urinaria
Ren

У прийомне відділення лікарні доставили дитину зі скаргами на біль за грудниною, яка з'являється після ковтання та супроводжується кашлем. Під час рентгенологічного дослідження виявлено чужорідне тіло у товщі стінки стравоходу на рівні 5 грудного хребця. В області якого звуження стравоходу сталося пошкодження його стінки?

Бронхіального
Аортального
Діафрагмового
Абдомінального
Фарінгеального

У новонародженої дитини протягом першої доби педіатр помітив відсутність акту дефекації. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт?

Атрезія заднього проходу
Атрезія стравоходу
Заяча губа
Дивертикул стравоходу
Дивертикул порожньої кишки

У новонародженої дитини протягом першої доби педіатр помітив, що під час смоктання молока воно потрапляє у носову порожнину. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт?

Незарощення піднебіння
Дивертикул стравоходу
Атрезія стравоходу
Заяча губа
Звуження стравоходу

У хворого поранення у праву половину живота. Яка частина товстої кишки, найімовірніше, може бути пошкоджена?

Висхідна ободова кишка
Поперечна ободова кишка
Низхідна ободова кишка
Сигмоподібна ободова кишка
Пряма кишка

У хворого судоми. Про гіпофункцію якої ендокринної залози можна думати?

Прищитоподібної залози
Шишкоподібного тіла
Гіпофіза
Статевих залоз
Надниркових залоз

Хворий 37 років страждає туберкульозом легень з дитинства. Йому була призначена операція. Під час операції у хворого була видалена середня частина правої легені. Які сегменти були видалені?

Латеральний і медіальний
Верхній і передній

Медіальний базальний і латеральний базальний
Верхній язичковий і нижній язичковий
Задній і передній

Під час рентгенологічного дослідження у вертикальному положенні лікар констатує у хворого наявність повітря у шлунку. В якій частині воно знаходиться?

В дні
В тілі
В кардіальній частині
В пілоричній частині
В ділянці малої кривини

У хворого 27 років встановлено гнійне запалення жовчного міхура. Визначте в який відділ очеревинної порожнини попаде гній під час розриву жовчного міхура при його типовому положенні?

В печінкову сумку
В чепцеву сумку
В лівий бічний канал
В верхній дванадцятипалокишковий закуток
В передшлункову сумку

З метою уточнення діагнозу у хворої 70 років стало необхідним пальпаторне дослідження органів тазу через передню стінку прямої кишки. Які органи при такій пальпації можна дослідити у жінки?

Матку, піхву
Маткову трубу, піхву
Піхву, яєчники
Яєчники, матку
Маткову трубу, матку

У хворого 40 років при інструментальному видаленні каменя сечоводу сталось ускладнення – розрив стінки сечоводу в черевному відділі. Куди потрапить сеча через отвір в стінці сечоводу?

Заочеревинний простір
Печінкову сумку
Порожнину очеревини
Чепцеву сумку
Хребтовий канал

Пункцію сечового міхура через передню черевну стінку, не зачіпаючи очеревини, можливо виконати:

При наповненому сечовому міхурі
При порожньому сечовому міхурі
Тільки у чоловіків
Тільки у жінок
Тільки у дітей

У хворого з діагнозом: гострий апендицит виникли симптоми захворювань печінки і жовчного міхура. При якому положенні червоподібного відростка це відбувається?

Висхідному
Низхідному
Медіальному
Латеральному

Ретроцекальному

У людини розвинувся гігантизм. Функція якої залози внутрішньої секреції порушена?

Гіпофіза

Епіфіза

Щитоподібної

Загруднинної

Надниркової

У хлопчика спостерігається вроджена калиткова грижа. Вада розвитку якої з оболонок яєчка є причиною виникнення цієї грижі?

Tunica vaginalis testis

Fascia spermatica externa

Fascia spermatica interna

Fascia cremasterica

Tunica dartos

При фіброгастроуденоскопії лікарю необхідно оглянути великий сосочок 12-палої кишки. Який анатомічний утвір може служити орієнтиром для його знаходження?

Поздовжня складка 12-палої кишки

Циркулярні складки 12-палої кишки

Цибулина 12-палої кишки

Дуоденальні залози

Печінково-дуоденальна зв'язка

При попаданні чужорідного тіла в дихальні шляхи на який бронх має бути спрямована увага лікаря в першу чергу для пошуку стороннього тіла і його видалення?

Правий головний бронх

Лівий головний бронх

Ліві часткові бронхи

Ліві сегментарні бронхи

Праві часткові бронхи

До гінекологічного відділення госпіталізована жінка з клінікою гострого живота з підозрою на позаматкову вагітність. Крізь яке анатомічне утворення або його частину буде виконувати пункцію черевної порожнини гінеколог?

Fornix vaginae posterior

Fornix vaginae anterior

Cervix uteri

Rectum

-

До лікарні доставлено пораненого вогнепальною зброєю з сильною кровотечею. При огляді хірургом установлено, що кульовий канал пройшов через передню стінку живота, склепіння шлунка і вийшов на рівні IX ребра по лівій серединній пахвовій лінії. Який орган постраждав разом з пораненням шлунка?

Селезінка

Ліва нирка

Підшлункова залоза

Поперечна ободова кишка

Ліва частка печінки

Хвора Б. 50 років скаржиться на те, що останнім часом вуха, ніс, кисті почали

збільшуватись в розмірі. Гіперфункція якої залози дасть подібні симптоми?

Гіпофіза
Щитоподібної
Статевих
Надниркових
Епіфіза

Під час оперативного втручання на малому тазі жінки виникла необхідність перев'язати яєчникову артерію. Яке з утворень може бути випадково перев'язаним разом з нею?

Сечовід
Маткова труба
Кругла зв'язка матки
Внутрішня клубова вена
Сечівник

Постраждалий доставлений до хірургічного відділення із проникаючим пораненням лівої бічної ділянки живота. Який відділ кишки, найімовірніше, ушкоджений?

Colon descendens
Colon ascendens
Colon transverses
Cecum
Rectum

Під час операції на пахвинному каналі у пацієнта хірург пошкодив його вміст. Визначте, що пошкодив хірург:

Funiculus spermaticus
Urachus
Lig. teres uteri
Lig. inguinale

--

При обстеженні лікар виявив у пацієнта гіпертрофію та запалення лімфоїдної тканини, набряк слизової оболонки між дужками м'якого піднебіння (гострий тонзиліт). Який з мигдаликів міститься в нормі в цьому місті?

Tonsilla palatina
Tonsilla pharyngealis
Tonsilla tubaria
Tonsilla lingualis

--

Хворий поступив у хірургічне відділення з діагнозом пахвинна кила. При оперативному втручанні хірург проводить пластику задньої стінки пахвинного каналу. Чим вона утворена?

Поперечною фасцією
Апоневрозом зовнішнього косого м'язу живота
Пахвинною зв'язкою
Вільним нижнім краєм поперечного м'яза живота
Очеревиною

При виконанні столярних робіт працівник випадково вдихнув предмет кулястої форми біля 0,5 см в діаметрі, що викликало реакцію у вигляді сильного кашлю. Подразнення якого відділу дихальних шляхів мало місце?

Гортані вище голосових зв'язок
Гортані нижче голосових зв'язок
Трахеї

Правого головного бронха
Лівого головного бронха

Хворий 45 років госпіталізований в хірургічне відділення зі скаргами на раптовий гострий біль в надчеревній області. Після обстеження поставлений діагноз: перфоративна (проривна) виразка задньої стінки шлунка. Куди потрапить вміст шлунка під час перфорації?

У чепцеву сумку
В печінкову сумку
У передшлункову сумку
В лівий брижовий синус
У правий брижовий синус

Хворого 65 років, прооперовано з приводу пухлини сечоводу. Під час операції виявлено, що пухлина проросла до брижі тонкої кишки. Який відділ сечових шляхів вражений пухлиною?

Черевний відділ сечоводу
Тазовий відділ сечоводу
Внутрішньостінковий відділ сечоводу
Миска нирки
Великі чашки нирки

У слизовій кишки хірург виявив скупчення лімфатичних вузликів (Пейєрові бляшки). Який це відділ кишки?

Клубова кишка
Порожня кишка
Сліпа кишка
Дванадцятипала кишка
Пряма кишка

Чоловік 40 років госпіталізований у хірургічне відділення з діагнозом – розрив селезінки. У якому анатомічному утворі буде накопичуватись кров?

Передшлункова сумка
Печінкова сумка
Чепцева сумка
Прямокишково-міхурова заглибина
Правий бічний канал

Пацієнту 50 років з приводу раку легень проведено правосторонню лобектомію (видалення) верхньої частки легень. Яка кількість сегментів вилучена при такій операції?

Три сегменти
Чотири сегменти
П'ять сегментів
Два сегменти
Жодного сегмента

Хворий госпіталізований в хірургічне відділення з підозрою на запалення дивертикулу Меккеля. Обстеження якої кишки необхідно зробити для виявлення дивертикулу під час операції?

Ileum
Duodenum
Jejunum
Caecum
Colon ascendens

При піхвовому дослідженні жінки гінеколог оглядає переднє склепіння піхви. Які анатомічні структури його утворюють?

- Шийка матки і передня стінка піхви
- Передня і задня стінки піхви
- Шийка матки і задня стінка піхви
- Передня і задня губи шийки матки
- Тіло матки і передня стінка піхви

При піхвовому дослідженні жінки гінеколог оглядає зів матки. Які анатомічні структури його утворюють?

- Передня і задня губи шийки матки
- Шийка матки і передня стінка піхви
- Передня і задня стінки піхви
- Шийка матки і задня стінка піхви
- Тіло матки і передня стінка піхви

Хворий скаржиться на порушення евакуаційної функції шлунка (тривала затримка їжі в шлунку). При обстеженні виявлено пухлину початкового відділу 12-палої кишки. Визначте локалізацію пухлини.

- Pars superior
- Pars inferior
- Pars descendens
- Pars ascendens
- Flexura duodeni inferior

При обстеженні зовнішніх статевих органів у хлопчика виявлено повне закриття уретри зверху. Сечівник залишається відкритим знизу у вигляді невеликої щілини. Який вид аномалії розвитку зовнішніх статевих органів спостерігається в даному випадку?

- Гіпоспадія
- Епіспадія
- Фімоz
- Гермафродитизм
- Парафімоz

Хворий 35 років, звернувся до лікаря із скаргами на сильну нежить та втрату відчуття запахів протягом тижня. При обстеженні, в носовій порожнині велика кількість слизу, що вкриває слизову оболонку та блокує рецептори нюху. Де в носовій порожнині розташовані ці рецептори?

- Верхня носова раковина
- Середня носова раковина
- Нижня носова раковина
- Загальний носовий хід
- Присінок носу

Хворий 45 років, госпіталізований до лікарні зі скаргами на високу температуру, біль при диханні, ядуху та кашель. Після обстеження, лабораторної та рентгенодіагностики був виставлений діагноз - плеврит. Для евакуації ексудату була призначена плевральна пункція. В якому місці плевральної порожнини знаходиться найбільша кількість ексудату?

- Реброво-діафрагмовий синус
- Діафрагмово-медіастинальний синус
- Реброво-медіастинальний синус
- Під куполом плеври
- Під коренем легенів

Хворий 35 років, звернувся до прийомного покою зі скаргами на біль та набряк в ділянці дна

ротової порожнини. Після огляду діагностовано запальний процес у ділянці вивідної протоки піднижньощелепної слинної залози. Куди відкривається ця протока?

Caruncula sublingualis

Vestibulum oris

Foramen caecum linguae

Plica fimbriata

Recessus gingivalis

Хворого 65 років, госпіталізовано з підозрою на пухлину верхнього відділу стравоходу. Під час рентгенологічного обстеження виявлено пухлинний процес на межі глотки та стравоходу. На рівні якого шийного хребця розташована ця межа?

6

5

4

3

2

Хворого 50 років, госпіталізовано з підозрою на запалення жовчного міхура. Йому призначена фіброгастродуоденоскопія з обов'язковим оглядом великого сосочка 12-палої кишки. В якій частині 12-палої кишки лікар повинен шукати цей сосочок?

Низхідна

Висхідна

Нижня (горизонтальна)

Верхня

Ампула

У лікарню потрапила дитина з порушенням носового дихання. Збільшення якого мигдалика глотки виявив лікар при обстеженні?

Глоткового

Піднебінного

Трубних

Язикового

Всіх

У хворого запалення під'язикового сосочка. Із яких слинних залоз буде затrudнене виділення слини?

Під'язикова і піднижньощелепна

Під'язикова і привушна

Привушна і піднижньощелепна

Привушна і піднебінна

Під'язикова і щічна

При огляді ротової порожнини стоматолог виявив появу у дитини перших великих нижніх кутніх зубів. Який вік дитини?

6-7 років

4-5 років

8-9 років

10-11 років

12-13 років

У лікарню потрапив хворий з пошкодженням щоки. Протока якої слинної залози може бути ушкоджена?

Привушної

Щічної

Піднижньощелепної
Під'язикової
Кутньої

У дівчинки 10 років під час клінічного обстеження виявлені ознаки передчасного статевого дозрівання. Зниження функції якої ендокринної залози могло спричинити це явище?

Епіфізу
Щитоподібної залози
Прищитоподібної залози
Загруднинної залози
Мозкової речовини надниркових залоз

До лікаря звернувся чоловік 40 років зі скаргами на наявність болючої пухлини в ділянці калитки. Лікар поставив діагноз: водянка яєчка ". Між якими оболонками яєчка накопичується рідина при цьому захворюванні?

Між парієтальною і вісцеральною пластинками піхвової оболонки
Між шкірою і м'ясистою оболонкою
Між м'ясистою оболонкою і зовнішньою сім'яною фасцією
Між зовнішньою сім'яною фасцією і фасцією мяза-підіймача яєчка
Між внутрішньою сім'яною фасцією і піхвовою оболонкою

У клініку доставлено хворого 10 років, який напередодні проковтнув арахісовий горішок, після чого з'явився безперервний кашель та симптоми утрудненого дихання. Функція голосоутворення не порушена. Де вірогідніше усього може знаходитися це стороннє тіло?

Правий головний бронх
Лівий головний бронх
Трахея
Присінкова щілина
Голосова щілина

При обстеженні хворого 67 років на рентгенограмі виявлена пухлина середньої частки правої легені. Які сегменти розташовані у цій частці?

Присередній, бічний
Верхній язиковий, нижній язиковий
Передній та задній основні
Верхівковий, передній
Верхівково-задній, передній

Запальний процес видозміненої підсерозної основи навколо шийки матки спричинив інтенсивний больовий симптом у пацієнтки. Патологічний процес якої ділянки статевих органів встановив лікар?

Parametrium
Mesometrium
Myometrium
Endometrium
Perimetrium

Під час операції на яєчнику були перев'язані судини в ділянці воріт. Де проводять маніпуляцію?

Margo mesovaricus
Margo liber
Facies medialis
Facies lateralis
Extremitas uterine

Під час операції у пацієнта було видалено частину легені, яка вентилується бронхом третього порядку, що супроводжується гілками легеневої артерії та інших судин. Яка частина легені була видалена?

Сегмент легені

Середня частка

Нижня частка

Верхня частка

Легенева часточка

До лікарні поступив пацієнт з перфоративною виразкою задньої стінки шлунка. Який елемент очеревини під час операції хірург повинен ретельно обстежити?

Чепцеву сумку

Печінкову сумку

Передшлункову сумку

Лівий бічний канал

Праву брижову пазуху

Одним із ускладнень інфекційного паротиту (“свинка”) є ураження сперматогенного епітелію. Яка анатомічна структура сперматогенезу уражена патологічним процесом?

Tubuli seminiferi contorti

Ductus epididymidis

Rete testis

Ductuli prostatici

Ductuli efferentes testis

У пацієнта діагностовано правобічну часткову пневмонію медіального та латерального сегментів. До якої частки легень вони належать?

До середньої

До верхньої правої

До нижньої правої

До верхньої лівої

До нижньої лівої

Пацієнту 50 років з приводу панкреатиту проводиться резекція хвоста підшлункової залози. Як вражений орган вкритий очервиною?

Екстраперитонеально

Мезоперитонеально

Інтраперитонеально

Парентерально

Інтрамурально

У хворого з деструктивним апендицитом, як ускладнення утворився піддіафрагмовий абсцес. В якому утворенні очеревини він локалізується?

Печінкова сумка

Передшлункова сумка

Чепцева сумка

Правий бічний канал

Лівий бічний канал

До гінекологічного відділення поступила хвора з підозрою на внутрішню кровотечу [позаматкова вагітність]. Через яке утворення проводять пункцію для термінового діагностування кровотечі?

Заднє склепіння піхви

Переднє склепіння піхви

Шийку матки
Матковий зів
Передню стінку піхви

Як наслідок перенесеного орхіту [запалення яєчка] у чоловіка 43 років порушилось продукування сперматозоїдів. В яких утвореннях яєчка відбулися патологічні зміни?

Ductuli seminiferi contorti
Rete testis
Ductuli seminiferi recti
Ductuli eferentes testis
Ductus epididymidis

При обстеженні хворого виявлено поліп в дистальному відділі товстої кишки. Визначте локалізацію поліпа.

Rectum
Caecum
Colon descendens
Colon sigmoideum
Colon transversum

Хвора звернулася зі скаргами на болі в правій бічній ділянці живота. При пальпації визначається щільне, нерухоме, пухлиноподібне утворення. В області якого відділу травної трубки можлива наявність пухлини?

Colon ascendens
Colon transversum
Colon descendens
Colon sigmoideum
Caecum

У хворого при обстеженні виявлено пухлину, яка перебуває біля входу стравоходу в шлунок. Яка частина шлунка уражена?

Pars cardiaca
Fundus
Pars pylorica
Fornix
Corpus ventriculi

Хворому діагностували пухлину відхідникового каналу прямої кишки. Як розміщується даний відділ прямої кишки відносно очеревини?

Екстраперитонеально
Інтраперитонеально
Мезаперитонеально

-

Інтра і частково мезаперитонеально

Мати звернулася за допомогою до педіатра. Хвора дівчинка 6 місяців з високою температурою, плаче, пхає іграшки у рот. Який зуб прорізується у цьому віці?

Присередній нижній різець
Бічний нижній різець
Присередній верхній різець
Бічний верхній різець
Нижній кутний зуб

При огляді хлопчика 5 років, лікар відмітив, що дитина дихає через рот. За допомогою додаткових методів дослідження було встановлено збільшення розмірів одного з мигдаликів лімфоепітеліального глоткового кільця. Який це мигдалик?

Глотковий

Язиковий

Трубний

Піднебінний

Гортанний

Під час оперативного втручання на органах черевної порожнини хірург виявив кишку, яка має жирові привіски, стрічки та випини. Який це відділ кишки?

Ободова

Пряма

Дванадцятипала

Порожня

Клубова

Чоловік 35 років звернувся до лікаря із скаргами на біль та припухлість правого яєчка. При обстеженні була виявлена пухлина, що потребує операції, при якій необхідно розсікати 7 шарів калитки до білкової оболонки. Яка оболонка буде розсічена останньою перед білковою оболонкою?

Tunica vaginalis testis

Tunica spermatica externa

Tunica dartos

Tunica spermatica interna

Cutis orchis

У військкоматі на УЗД у юнака 19 років було виявлено опущення нирки. На рівні яких хребців розташовані нирки в нормі?

11 грудного та 3 поперекового

9-10 грудних

4-5 поперекових

12 грудного та 1 поперекового

9-12 грудних

Для уточнення діагнозу жінці необхідно повести пункцію Дугласового простору (прямокишково-маткова заглибина). Де потрібно провести прокол стінки піхви?

Задня частина склепіння

Передня частина склепіння

Права бічна частина склепіння

Ліва бічна частина склепіння

Передня стінка піхви

У хворого виявлена пахова кила. Під час операції видаленням кили створюють дублікатуру передньої стінки пахвинного каналу. Які анатомічні структури передньої стінки живота використовують для створення цієї дублікатури?

Апоневроз зовнішнього косого м'яза живота

Поперечну фасцію

Очеревину

Апоневроз внутрішнього косого м'яза живота

Поперечний м'яз

Стоматолог при огляді порожнини рота виявив на межі середньої і задньої третини спинки язика запалені сосочки. Які сосочки язика запалені?

Papillae vallatae
Papillae fungiformes
Papillae foliatae
Papillae filiformes
Papillae conicae

При огляді порожнини рота лікар виявив невелику виразку на передній лівій піднебінній дужці. На який м'яз, що залягає в товщі цієї дужки, можливе поширення процесу?

M. palatoglossus
M. styloglossus
M. palatopharyngeus
M. genioglossus
M. hyoglossus

При обстеженні хворого виявлено пухлину дистального відділу тонкої кишки. Визначте локалізацію пухлини.

Ileum
Jejunum
Caecum
Colon sigmoideum
Duodenum

У хворої виявлена пухлина початкового відділу товстої кишки. Визначте локалізацію пухлини.

Caecum
Colon ascendens
Colon sigmoideum
Rectum
Colon descendens

До лікарні звернулася мати дворічного хлопчика із скаргами на збільшення розмірів калитки її дитини. Після огляду, встановлено діагноз – водянка яєчка (накопичування рідини між оболонками яєчка). Яка саме оболонка яєчка вміщує цю рідину?

Піхвова
М'ясиста
Білкова
Зовнішня сім'яна фасція
Внутрішня сім'яна фасція

Хвора 45 років, госпіталізована з підозрою на пухлину матки. Після обстеження встановлено діагноз - фіброміома матки. В якому шарі матки розміщується ця пухлина?

Myometrium
Endometrium
Perimetrium
Parametrium
Mesometrium

Під час обстеження хворої, виникла підозра на наявність гнійного випоту у прямокишково-матковому заглибленні. Через яке анатомічне утворення найкраще пропунктувати це заглиблення?

Заднє склепіння піхви
Переднє склепіння піхви
Ампулу прямої кишки
Діафрагму тазу

Передню стінку піхви

Молода людина звернулася в лікарню зі скаргами на порушення сечовипускання. При обстеженні зовнішніх статевих органів виявлено, що сечівник розщеплений зверху і сеча витікає через цей отвір. Який це вид аномалії розвитку зовнішніх статевих органів?

Епіспадія

Фімоz

Гермафродитизм

Парафімоz

Гіпоспадія

У новонародженого малюка педіатр виявив, що отвір крайньої плоті по величині не перевищує діаметр сечівника і головка статевого члена не може виходити через такий отвір. Як називається ця вада?

Фімоz

Епіспадія

Гермафродитизм

Парафімоz

Гіпоспадія

При обстеженні зовнішніх статевих органів у жінки гінеколог поставив діагноз - бартолініт (запалення бартолінових залоз). Про патології якого анатомічного утворення йде мова?

Велика присінкова залоза

Цибулина присінка

Малі присінкові залози

Сечівникові залози

Сечівникові затоки

Під час обстеження легень лікар ввів хворому бронхоскоп в один зі часткових бронхів і виявив, що він поділяється на два сегментарних бронха. У якій частці легень лікар проводив маніпуляцію?

У середній частці правої легені

У верхній частці правої легені

У нижній частці правої легені

У верхній частці лівої легені

У нижній частці лівої легені

У хірургічне відділення поступив потерпілий з проникаючим пораненням передньої черевної стінки. Раневий канал пройшов над малою кривиною шлунка. Через яке утворення очеревини пройшов рановий канал?

Ligamentum hepatogastricum

Ligamentum gastrocolicum

Ligamentum hepatoduodenale

Ligamentum hepatorenale

Ligamentum triangulare sinistrum

У чоловіка 40 років запалення яєчка ускладнилось його водянкою. Необхідне оперативне втручання. Яку з оболонок яєчка останньою розтинає хірург під час операції?

Парієтальний листок піхвової оболонки яєчка

М'ясисту оболонку

Внутрішню сім'яну фасцію

М'яз-підіймач яєчка

Зовнішню сім'яну фасцію

Сечокам'яна хвороба ускладнилася виходом камінця з нирки. На якому рівні сечоводу, вірогідніше всього, він може зупинитися?

На межі черевної та тазової частин

В місці

В середній черевній частині

На 2 см вище впадіння в сечовий міхур

На 5 см вище тазової частини

Хворий скаржиться на часте та затруднене сечовипускання. Який внутрішній статевий орган є причиною цього?

Простата

Яєчко

Цибулинно-сечівникові залози

Над'яєчко

Сім'яні пухирці

При гострому деструктивному панкреатиті проводять ревізію чепцевої сумки, оскільки підшлункова залоза утворює одну з її стінок. Яку саме?

Задню

Передню

Верхню

Нижню

Ліву

У хворого діагностовано одну із некротичних форм гострого панкреатиту. В який із очерединних просторів одразу поширюється випіт?

Чепцеву сумку

Печінкову сумку

Передшлункову сумку

Лівий бічний канал

Правий бічний канал

Хворій 30 р. лікар поставив діагноз нецукровий діабет. З порушенням діяльності якої ендокринної залози це пов'язано?

Гіпофізу

Щитоподібної

Статевих

Надиркових

Епіфіза

У хворого 60 років внаслідок злоякісної пухлини великого сосочка дванадцятипалої кишки виникла обтураційна жовтяниця. Просвіт якої анатомічної структури стискується пухлиною?

Печінково-підшлункова ампула

Міхурова протока

Загальна печінкова протока

Права печінкова протока

Ліва печінкова протока

Чоловік звернувся до лікаря зі скаргами на те, що у нього з'явилися жіночі статеві ознаки. Дослідження власних статевих органів патології не виявило. Про пухлину якої залози можна думати?

Glandula suprarenalis

Insulae pancreaticae

Glandula thyroidea

Glandula parathyroidea
Glandula pineale

На прийом до лікаря прийшов пацієнт дуже високого зросту, з довгими товстими пальцями рук, великою нижньою щелепою і відвислою нижньою губою. Підвищену секрецію якого гормону якої залози можна запідозрити?

Соматотропного гормону передньої частки гіпофіза

Гонадотропного гормону передньої частки гіпофіза

Антидіуретичного гормону задньої частки гіпофіза

Гормонів щитоподібної залози

Гормонів надниркових залоз із групи глюкокортикоїдів

Хворий 45 років госпіталізований до хірургічно відділення зі скаргами на раптовий гострий біль в надчеревній ділянці. Після обстеження встановлено діагноз: перфоративна (проривна) виразка задньої стінки шлунка. Куди вилився вміст шлунка в момент перфорації?

В чепцеву сумку

В печінкову сумку

В передшлункову сумку

В лівий брижовий синус

В правий брижовий синус

У хворого з хронічним тонзилітом виникло ускладнення – заглотковий абсцес (гнійник). Куди може поширитися інфекція із заглоткового (позанутрощового) простору, якщо абсцес терміново не ліквідувати?

В грудну порожнину, в заднє середостіння

В грудну порожнину, в переднє середостіння

В грудну порожнину, в середнє середостіння

В переднутрощевий простір

В надгруднинний міжапоневротичний простір

В який відділ дванадцятипалої кишки необхідно ввести ендоскоп, щоб оглянути великий сосочок дванадцятипалої кишки?

Низхідний

Висхідний

Верхній

Нижній

В дванадцятипало-порожньокишковий згин

Під час катетеризації сечового міхура при швидкому введенні катетера виникла кровотеча внаслідок травми слизової оболонки сечівника в ділянці довільного сфінктера. В якому місці уретри лікар повинен бути обережним і відчувати опір м'яких тканин при проходженні катетера?

Pars membranacea urethrae

Fossa navicularis urethrae

Bulbus urethrae

Pars spongiosa urethrae

Pars prostatica urethrae

Під час гінекологічного обстеження пацієнтці був виставлений діагноз ендометрит (запалення ендометрію). Яка частина маткової стінки уражена запальним процесом?

Слизова оболонка

Серозна оболонка

М'язова оболонка

Адвентиційна оболонка

Навколоматкова клітковина

Дитина віком 10 років скаржиться на порушення носового дихання. При обстеженні встановлено, що причиною є стійка гіпертрофія лімфоїдної тканини. Збільшення якого мигдалика має місце?

- Глоткового
- Піднебінного
- Трубного лівого
- Язикового
- Трубного правого

Після травматичного ураження промежини у потерпілого спостерігається нетримання сечі. Який м'яз був травмований?

- Зовнішній м'яз-замикач сечівника
- Сіднично-печеристий м'яз
- Внутрішній м'яз-замикач відхідника
- Глибокий поперечний м'яз промежини
- Поверхневий поперечний м'яз промежини

Хворий скаржиться на нестерпні болі у поперековій ділянці спини та жовтяницю. Здавлення яких анатомічних утворень привело до появи цих симптомів?

- Печінково-підшлункової ампули
- Спільної печінкової протоки
- Підшлункової протоки
- Міхурової протоки
- Жовчної протоки та міхурової протоки

При дослідженні хворого лікар визначив, що його язик не рухається вперед (не висувається з рота). Який м'яз не виконує функцію?

- Підборідно-язиковий
- Під'язиково-язиковий
- Поздовжній м'яз язика
- Шило-під'язиковий
- Поперечний м'яз язика

До отоларинголога звернувся хворий, у якого при огляді гортані виявлено неповне змикання голосових складок при фонації. Голосова щілина при цьому приймає форму овалу. Функція якого м'яза гортані порушена у хворого?

- M. vocalis
- M. cricoarytenoideus lateralis
- M. cricoarytenoideus posterior
- M. thyroarytenoideus
- M. arytenoideus transversus

На якому органі черевної порожнини можливе оперативне втручання без розтину очеревини?

- Сечовий міхур
- Шлунок
- Печінка
- Кишка
- Селезінка

У приймальне відділення міської лікарні поступив хворий з ознаками перитоніту. Із анамнезу захворювання відомо, що протягом 12-и років страждав виразковою хворобою з локалізацією виразки на задній стінці шлунку. Виставлений діагноз: перфорація виразки шлунку. Куди в даному випадку може потрапити вміст шлунку?

Чепцеву сумку
Печінкову сумку
Правий бічний канал
Лівий бічний канал
Передшлункову сумку

Хворий скаржиться на гострий біль в лівій поперековій області. Різи при сечовипусканні. При обстеженні йому поставлено діагноз сечокам'яної хвороби. Визначте найбільш ймовірну локалізацію каменю:

Миска, великі чашки
Миска, кіркова речовина
Малі чашки, мозкова речовина
Миска, мозкова речовина
Кіркова речовина, піраміди

Хворий скаржиться на болі і тяжкість в епігастральній ділянці після їжі, печію, іноді блювоту. З діагностичною метою було проведено зондування органів шлунково-кишкового тракту. До якої позначки необхідно ввести зонд в даному випадку?

40-45 см
25-30 см
25-40 см
40-50 см
30-35 см

Породіллі в зв'язку з патологічно вузьким тазом проведено кесарів розтин. Які шари стінки матки повинен розітнути хірург?

Вісцеральний листок очеревини, м'язову і слизову оболонки
Парієтальний листок очеревини, м'язову і слизову оболонки
Вісцеральний листок очеревини, навколоматкову жирову клітковину, адвентицію
Парієтальний і вісцеральний листки очеревини, навколоматкову жирову клітковину, м'язову оболонку
Вісцеральний листок очеревини, м'язову, навколоматкову жирову клітковину

У хворого болі в епігастральній ділянці живота. На захворювання яких органів це вказує?

Duodenum, ventriculus
Intestinum tenue, hepar
Ren, lien
Vesica fellae, colon
Fundus ventriculi, colon descendens

У хворого діагностовано кровотечу з виразки задньої стінки шлунка. Після серединного лапаротомічного розрізу черевної стінки хірургу необхідно провести ревізію задньої стінки шлунка. Яку зв'язку шлунка при цьому необхідно перерізати?

Шлунково-ободовокишкову зв'язку
Печінково-шлункову зв'язку
Шлунково-діафрагмову зв'язку
Шлунково-селезінкову зв'язку
Печінково-дванадцятипалокишкову зв'язку

Хворий скаржиться на нестерпні болі в правій поперековій ділянці, які віддають в праву пахвинну ділянку. Під час рентгенологічного дослідження на межі середньої і нижньої третини сечоводу виявлене затемнення округлої форми. Із діагнозом сечокам'яної хвороби хворого госпіталізовано. В ділянці якого звуження сечоводу виявлено затемнення?

При переході абдомінальної частини в тазову
В місці відходження від ниркової миски
При перехресті його із яєчковою артерією
В тазовій частині
В інтрамуральній частині

Хворому проводять правобічну пульмонектомію з приводу раку легені. Після розсічення медіастінальної плеври в першу чергу необхідно перев'язати легеневі вени, щоб зменшити можливість дисемінації пухлинних клітин. Щоб уникнути помилки, хірургу слід згадати порядок розташування анатомічних утворів кореня правої легені (у напрямку зверху вниз):

Бронх, артерія, вени
Артерія, бронх, вени
Артерія, вени, бронх
Вени, артерія, бронх
Бронх, вени, артерія

У хворого із ознаками гострого живота хірург запідозрив запалення дивертикулу Меккеля, що потребує оперативного втручання. Вкажіть, ревізія якої ділянки кишківника необхідна, щоб знайти дивертикул?

1 м клубової кишки від місця впадіння її в товсту кишку
0,5 м порожньої кишки від зв'язки Трейтца
Низхідну ободову кишку
Висхідну ободову кишку
20 см клубової кишки від клубово-сліпокишкового кута

Чоловік 26 р. скаржиться на голодні та нічні болі у животі, печія протягом останніх 3-х місяців. Проведена гастродуоденоскопія. Виявлена виразка цибулини дванадцятипалої кишки. В якій ділянці передньої черевної стінки найбільш ймовірно виявлення болісності при пальпації.

Reg. epigastrica
Reg. abdominalis lateralis dextra
Reg. hypochondriaca dextra
Reg. hypochondriaca sinistra
Reg umbilicalis

В хірургічне відділення лікарні доставлена хвора з ознаками жовтяниці, яка викликана перекриттям загальної жовчної протоки каменем. В яке утворення очеревини повинен проникнути лікар під час хірургічного втручання, щоб розкрити загальну жовчну протоку?

В печінково-дванадцятипалокишкову зв'язку
В печінково-шлункову зв'язку
В шлунково-ободовокишкову зв'язку
В верхнє заглиблення чепцевої сумки
В нижнє заглиблення чепцевої сумки

У хворого операція на жовчовивідних шляхах. Яка зв'язка печінки буде при цьому препаруватися?

Печінково-дванадцятипалокишкова
Коронарна
Кругла
Трикутна
Печінково-шлункова

На внутрішній поверхні препарату розрізаного трубчастого органа є поздовжні складки. Яка частина травного каналу на препараті?

Стравохід
Дванадцятипала кишка
Клубова кишка
Сигмоподібна кишка
Ободова кишка

У полі зору цистоскопа гладка поверхня слизової оболонки без складок. Яка частина сечового міхура у полі зору?

Міхуровий трикутник
Верхівка
Тіло
Шийка
Дно

При проведенні дуоденального зондування зонд не проходить зі шлунка в дванадцятипалу кишку. В якому відділі шлунка є перешкода (пухлина)?

В воротарному відділі
В кардіальному відділі
В ділянці дна шлунка
В ділянці тіла шлунка
У всіх перерахованих ділянках

У хворої Т. 53 років в результаті тупої травми живота діагностований розрив печінки. В якому утворенні порожнини очеревини збереться кров?

Прямокишково-маткової заглибині
Міхурово-маткової заглибині
Правому брижовому синусі
Чепцевій сумці
Лівому брижовому синусі

У жінки 37 років виявлена пухлина розмірами 3 x 4 см, на 1 см нижче місця входження стравоходу до шлунка. Яка частина шлунка уражена пухлиною?

Cardia ventriculi
Corpus ventriculi
Fundus ventriculi
Pylorus ventriculi
Curvatura major

Дитині 6 місяців при бронхіті зроблена рентгенограма грудної клітки. Крім змін, пов'язаних з бронхами, на R-грамі визначається тінь загруднинної залози (тимусу). З чим можуть бути пов'язані ці зміни?

У 6 місяців вказаний стан є варіантом норми
Є наслідком бронхіту
Є наслідком неправильного анатомічного положення
Є наслідком запалення залози
Є наслідком пухлинного процесу

На прийом до уролога звернувся чоловік 58 років зі скаргами на ускладнення сечовипускання останні 6 місяців. При обстеженні була виявлена аденома (доброякісна пухлина) передміхурової залози. У якому місці залози виникає здавлення сечівника?

Перешийок (середня частка)
Права частка
Ліва частка
Передміхурова частина уретри

Область сім'яного горбка

Пацієнту з порушенням функції зовнішнього дихання необхідно зробити трахеостомію. На рівні яких хрящових кілець трахеї найчастіше знаходиться перешийок щитоподібної залози?

II-V

I-II

IV-V

VI-VIII

V-VI

З яких частин складається шлунок?

Тіло, дно шлунка, пілорична та кардіальна частини

Дно, склепіння шлунка, пілорична частина, воротарна та кардіальна частини

Дно шлунка, велика та мала кривина, кардіальна частина

Тіло, дно, велика та мала кривина шлунка

Передня та задня стінки, пілорична та кардіальна частини