

На будівництві робітник пошкодив бокову поверхню шиї справа в результаті удару балкою при її падінні. Під час надання допомоги у потерпілого виявилось зниження чутливості шкіри на передньо-бічній поверхні шиї праворуч. Який нерв постраждав у даному випадку?

N. transversus colli

N. vagus

N. phrenicus

N. accessorius

N. trigeminus

У хворого на хронічне захворювання печінки був відзначений позитивний френікус-симптом. До якого м'яза притискають діафрагмовий нерв для перевірки цього симптому?

Переднього драбинчастого м'яза

Середнього драбинчастого м'яза

Підключичного м'яза

Заднього драбинчастого м'яза

Груднинно-ключично-соскоподібного м'яза

До лікаря звернувся пацієнт із скаргами на втрату чутливості шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового ходу, що з'явилася після порізу шкіри над груднинно-ключично-соскоподібним м'язом. Пошкодження якого нерва дало таку клінічну картину?

N. auricularis magnus

N. transversus colli

N. occipitalis minor

N. supraclaviculares

N. phrenicus

Під час операції при доступі до правої підключичної артерії з'явилося ускладнення у вигляді порушення дихання. Пошкодження якої структури обумовило вказане явище?

Діафрагмовий нерв

Зірчастий вузол

Спинномозковий нерв

Додатковий нерв

Під'язиковий нерв

Хворий скаржиться на болі в ділянці діафрагми при диханні, які з'явилися після незначного ушкодження грудної клітини. Про порушення якого нерва йдеться?

Діафрагмового нерва

Підлопаткового нерва

Надключичних нервів

Надлопаткового нерва

Поперечного нерва шиї

Внаслідок операційної травми м'яких тканин шиї справа, порушилися регулярні рухові екскурси правого куполу діафрагми. Який з нервів достовірно постраждав?

N. phrenicus dexter

N. vagus

N. accessorius

Rr. dorsales nervi spinalis

N. intercostales

Чоловік з колотою раною в ділянці чотирьохстороннього отвору звернувся до лікаря. При обстеженні виявлено, що потерпілий не може відвести руку від тулуба. Який нерв вірогідно ушкоджений?

N. axillaris

N. medianus
N. radialis
N. ulnaris
N. subclavius

Постраждалого в аварії водія доставлено у стаціонар з ушкодженням медіального надвиростка плечової кістки. Який нерв при цьому може бути ушкоджений?

N. ulnaris
N. radialis
N. axillaris
N. musculocutaneus
N. medianus

Хворий не відчуває дотику до шкіри в ділянці присередньої поверхні плеча. Запалення якого нерва спостерігається у хворого?

Шкірного присереднього нерва плеча
Шкірного присереднього нерва передпліччя
Променевого нерва
Ліктьового нерва
Пахвового нерва

У жінки, що хворіє на остеохондроз, з'явився різкий біль у плечовому суглобі, який посилювався при відведенні плеча. Ураження якого нерва може бути причиною цих симптомів?

Пахвового нерва
Підлопаткового нерва
Дорсального нерва лопатки
Підключичного нерва
Грудо-спинного нерва

Після травми передньої поверхні верхньої третини передпліччя у хворого утруднення пронації, послаблення долонного згинання кисті і порушення чутливості шкіри 1-3 пальців на долоні. Який нерв ушкоджено?

N. medianus
N. musculocutaneus
N. ulnaris
N. cutaneus antebrachii medialis
N. radialis

У хворого після травми правої верхньої кінцівки спостерігається порушення функцій м'язів-розгиначів, а також відсутність шкірної чутливості на задній поверхні руки. Який нерв пошкоджено?

Променевий
Ліктьовий
Серединний
М'язово-шкірний
Пахвовий

При запаленні глибоких лімфатичних вузлів пахвової області хірург повинен був розкрити глибоко розміщений гнійник. Після операції хворий втратив здатність згинати передпліччя в ліктьовому суглобі та порушилася шкірна чутливість бічної поверхні передпліччя. Який нерв було ушкоджено при оперативному втручанні?

N.musculocutaneus
N.radialis

N.ulnaris
N.medianus
N.axillaris

Випадково стукнувшись ліктем об стіл, хворий відчув пекучість і поколювання на внутрішній поверхні передпліччя. Який нерв був травмований в цьому випадку?

N. ulnaris
N. radialis
N. medianus
N. axillaris
N. musculocutaneus

Хворий скаржиться на порушення чутливості шкіри в медіальній частині тильної та долонної поверхні кисті. Який з нервів ушкоджений?

N. ulnaris
N. radialis
N. medianus
N. musculocutaneus
N. cutaneus antebrachii medialis

При обстеженні пацієнта з ножовими ранами правої руки встановлено втрату чутливості шкіри бічної половини тильної поверхні кисті та проксимальних фаланг 1-го, 2-го і частково 3-го пальців. Який нерв пошкоджено?

Променевий
Серединний
Ліктьовий
М'язово-шкірний
Бічний шкірний передпліччя

У постраждалого виявлено рану верхньої частини передньої ділянки плеча. При обстеженні встановлена втрата активного згинання в ліктьовому суглобі і втрата чутливості шкіри передньо-бічної поверхні передпліччя. Порушення якого нерва має місце?

М'язово-шкірного
Променевого
Серединного
Ліктьового
Пахвового

У хворого після перелому верхньої третини плечової кістки розвинувся параліч задньої групи м'язів плеча і передпліччя. Який нерв пошкоджено?

Променевий
Ліктьовий
Серединний
М'язово-шкірний
Пахвовий

Хворий не може розігнути гомілку, у нього відсутня шкірна чутливість на передній поверхні стегна. Пошкодження якого нерва виявило неврологічне обстеження?

Стегнового
Затульного
Сідничого
Верхнього сідничого
Статено-стегнового

В травматологічний пункт доставлений хворий з пораненням великого поперекового м'яза. Хворий втратив можливість розгинати гомілку в колінному суглобі. Який нерв ушкоджений в даному випадку?

- Стегновий нерв
- Клубово-підчеревний
- Клубово-пахвинний
- Статевостегновий
- Затильний нерв

У хворого не розгинається колінний суглоб, відсутній колінний рефлекс, порушена чутливість шкіри на передній поверхні стегна. Які нервові структури вражені?

- Стегновий нерв
- Верхній сідничний нерв
- Великогомілковий нерв
- Затильний нерв
- Нижній сідничний нерв

При огляді хворого лікар-невропатолог встановив відсутність «колінного рефлексу» при постукуванні по зв'язці наколінка. Який нерв може бути пошкоджений в цьому випадку?

- Стегновий
- Затильний
- Сідничний
- Великогомілковий
- Загальний малогомілковий

Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на болі в кульшовому суглобі та у всіх привідних м'язах і шкірі над ними при рухах. Який нерв ушкоджено?

- Затильний нерв
- Клубово-пахвинний нерв
- Стегновий нерв
- Латеральний шкірний нерв стегна
- Задній шкірний нерв стегна

У чоловіка, що хворіє на остеохондроз, з'явився різкий біль у м'язах живота (бічних та передніх). При об'єктивному обстеженні лікар констатував підвищену больову чутливість шкіри підчеревної ділянки. Ураження якого нерва могло спричинити цей біль?

- Клубово-підчеревного нерва
- Сідничного нерва
- Затильного нерва
- Стегнового нерва
- Статевостегнового нерва

Після операції апендектомії у хворого залишилася знижена чутливість шкіри над пахвинною зв'язкою на місці проведеної операції. Гілки якого нерва були пошкоджені в процесі оперативного втручання?

- N.iliohypogastricus
- N.ilioinguinalis
- N.genitofemoralis
- N. femoralis
- N.cutaneus femoralis lateralis

При обстеженні хворого спостерігаються сильний біль в ділянці передньої поверхні стегна, атрофія чотириголового м'яза. Який нерв уражений?

- Стегновий

Затульний
Сідничий
Великогомілковий
Малогомілковий

Порушення тактильної та температурної чутливості в ділянці нижніх двох третин передньо-зовнішньої поверхні стегна (хвороба Рота) пояснюється ураженням якого нерва?

Латерального шкірного нерва стегна

Статево - стегового нерва

Стегового нерва

Сідничого нерва

Великогомілкового нерва

Після травми стегна у пацієнта спостерігається розлад шкірної чутливості на передній поверхні стегна і медіальній поверхні гомілки, абсолютно неможливо енергійне розгинання ноги в колінному суглобі. Пошкодження якого нерва можна припустити?

Стегового

Затульного

Сідничого

Верхнього сідничного

Нижнього сідничного

У хворого виявлено порушення чутливості шкіри передньо-медіальної поверхні гомілки. Який нерв уражений?

Підшкірний

Затульний

Сідничий

Зовнішній шкірний нерв стегна

Малогомілковий

Хворий після поранення лівої гомілки втратив здатність утримувати стопу в пронованому положенні. Який нерв пошкоджено?

Поверхневий малогомілковий

Глибокий малогомілковий

Великогомілковий

Сідничий

Загальний малогомілковий

Який нерв можна пошкодити при проведенні оперативного втручання з приводу варикозного розширення великої підшкірної вени?

Підшкірний

Медіальний шкірний нерв литки

Поверхневий малогомілковий

Бічний шкірний нерв литки

Великогомілковий

При пальпації навколо анального отвору і зовнішнього сфінктера прямої кишки у хворого спостерігаються больові відчуття. Який нерв пошкоджений?

N. pudendus

N. ischiadicus

N. femoralis

N. tibialis

N. obturatorius

У хворого ознаки втрати зорового сторожового рефлексу. Які ядра стовбурової частини

мозку пошкоджено?

Ядра верхніх горбиків пластинки покрівлі

Ядра окорухового нерва

Ядра нижніх горбиків пластинки покрівлі

Ядра блокового нерва

-

Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на опущення верхньої повіки (птоз). Лікар виявив ще ознаки косоокості і запропонував подальше обстеження. Дисфункцію якого ядра припустив лікар?

Рухове ядро окорухового нерва

Рухове ядро трійчастого нерва

Підкіркові зорові ядра

Рухове ядро лицьового нерва

Кірковий центр зору

Хворий звернувся зі скаргами на порушення зору, пов'язане з опущенням повіки, неможливістю повернути око вгору і всередину. При огляді у хворого відмічено, що око відведене назовні, зіниця розширена і не реагує на світло, хворий не бачить на близькій відстані. Який нерв пошкоджено?

Окоруховий

Блоковий

Відвідний

Зоровий

Трійчастий

У результаті травми черепа з пошкодженням верхньої стінки правої очної ямки постраждалий втратив можливість піднімати верхню повіку правого ока і дивитися вгору. Який нерв імовірно пошкоджений?

R.superior n.oculomotorius

N.trochlealis

R.inferior oculomotorius

N.abducens

N.opthalmicus

Дитина, 3 роки, потрапила до клініки з діагнозом: розбіжна косоокість. Ураженням яких нервів вона викликана?

Окорухових

Зорових

Блокових

Відвідних

Очних

Пацієнт звернувся до окуліста зі скаргами на опущення верхньої повіки. При обстеженні було діагностовано пухлину головного мозку. Ядро якої пари черепних нервів уражене патологічним процесом?

III пари ЧМН

VII пари ЧМН

II пари ЧМН

IV пари ЧМН

VI пари ЧМН

У пацієнта при епідемічному енцефаліті спостерігаються одно - або двобічний птоз (опущення повік), розбіжна косоокість, порушення акомодатії. Зіниці розширені. Ядра якої пари черепних нервів уражені?

III
IV
V
VI
VII

У хворого запалення верхньощелепного нерва. Через який отвір основної кістки цей нерв виходить з порожнини черепа?

Круглий
Овальний
Яремний
Венозний
Остистий

У постраждалого лівобічний перелом верхньощелепної кістки із втратою шкірної чутливості над нею. Яке анатомічне утворення пошкоджено?

Мала гусяча лапка
Щелепно-лицьовий нерв
Лицьовий нерв
Нижньоочномковий нерв
Щічний нерв

При ковтанні їжі хворий відчуває ускладнення, що пов'язані з паралічем м'якого піднебіння. Який нерв пошкоджено?

III гілка трійчастого нерва
Лицьовий нерв
I гілка трійчастого нерва
II гілка трійчастого нерва
Під'язиковий нерв

До лікаря звернувся хворий зі скаргою на неможливість щільного зімкнення щелеп при жуванні. Лікар встановив атрофію жувальних м'язів, розміщених нижче виличної дуги. Гілки якого черепного нерва іннервують зазначену групу м'язів?

N. trigeminus (III гілка)
N. vagus
N. ophthalmicus
N. glossopharyngeus
N. facialis

У хворого спостерігається біль і відчуття оніміння в слизовій оболонці ясен верхньої щелепи. Які з нервів можуть бути пошкоджені?

Nn. alveolaris superiores (n. maxillaries)
N. facialis
N. glossopharyngeus
N. vagus
N. ophthalmicus

У постраждалого правосторонній перелом і крововилив в ділянці передньої третини нижньої щелепи, втрата шкірної чутливості в ділянці підборіддя. Який нерв травмовано?

Підборідний нерв
Верхні альвеолярні нерви
Щічний нерв
Нижній альвеолярний нерв
Щелепно-під'язикові нерви

Які з названих нервів можуть ушкоджуватися при гаймориті і оперативних втручаннях на гайморовій порожнині?

Nn. alveolares superiores

N. mandibularis

N. facialis

N. oculomotorius

N. lingualis

Хворий із запаленням слизової оболонки язика скаржиться на розлад загальної чутливості передніх двох третин язика. Ураженням якого нерва це спричинено?

Язикового

Барабанного

Барабанної струни

Блукаючого

Лицевого

При первинному обстеженні у хворого встановлено відсутність чутливості передніх 2/3 язика. Смакову чутливість збережено. Який нерв уражений?

Язикова гілка трійчастого нерва до її з'єднання з барабанною струною

Під'язиковий нерв

Барабанна струна лицевого нерва

Язикова гілка трійчастого нерва після її з'єднання з барабанною струною

Язикоглотковий нерв

Хвора відчуває нападоподібні болі в ділянці лоба, в очному яблуці, у внутрішньому куті очної ямки. Натискання в медіальній частині надочнямкового краю болюче, порушена шкірна чутливість. Який нерв уражений?

Очний

Верхньощелепний

Блоковий

Відвідний

Окоруховий

54-річний чоловік скаржиться на відсутність чутливості шкіри нижньої повіки, зовнішньої латеральної поверхні носа, верхньої губи. Лікар при огляді встановлює запалення другої гілки трійчастого нерва. Через який отвір виходить з черепа ця гілка?

Підочнямковий отвір

Рваний отвір

Верхню очнямкову щілину

Остистий отвір

Овальний отвір

У чоловіка, 60 років, вікова далекозорість у зв'язку з ослабленням властивостей акомодатії кришталика і гладких м'язів судинної оболонки очного яблука, яке вимагає корекції лінзами. Гілками якого вузла іннервуються м'язи corpus ciliare?

G. ciliare

G. oticum

G. pterygopalatinum

G. trigeminale

G. sympathicus

У хворого невралгія війкового вузла (синдром Шарлена) - герпетичний висип на шкірі лоба, ознаки ураження склери, радужної оболонки, болі в ділянці очей з іррадіацією в ніс,

болючість в ділянці внутрішнього кута ока. Гілки якого нерва утворюють чутливий корінець g. ciliare?

N. ciliaris longus

N. infraorbitalis

N. ethmoidalis anterior

N. ethmoidalis posterior

N. supraorbitalis

Лікар ввів у підчоямковий отвір розчин анестетика. Які нерви знеболюються при цьому?

Підчоямковий і передні верхні альвеолярні гілки

Відвідний

Окоруховий нерв

Блоковий нерв

Нижньощелепний нерв

У чоловіка з цукровим діабетом періодично виникають запалення сальних залоз верхньої повіки (Glandulae sebaceae (Zeis)) з пошкодженням повік, що викликає у хворого біль, свербіння. Який нерв іннервує шкіру верхньої повіки?

N. ophtalmicus

N. oculomotorius

N. abducens

N. trochlearis

N. infraorbitalis

При огляді травмованого в дорожній пригоді лікар встановив ураження зовнішньої стінки очної ямки. Постраждалий втратив можливість відведення очного яблука на травмованому боці. Який нерв міг бути ураженим у цьому випадку?

N. abducens

N. oculomotorius

N. trochealis

N. ophtalmicus

N. infraorbitalis

Після крововиливу в мозок у хворого виникла стійка косоокість правого ока, втрачено здатність до відведення його назовні. Ядро якого черепного нерва пошкоджене при крововиливі?

N. abducens dexter

N. facialis dexter

N. oculomotorius

N. abducens sinister

N. trochlearis

Після пологів акушер знайшов у новонародженого двобічну збіжну косоокість. Пошкодження яких ядер черепних нервів розвинулося у новонародженого після родової травми?

N. abducens

N. oculomotorius

N. trochlearis

N. trigeminus

N. facialis

У хворого із запаленням лицевого нерва спостерігається посилена сльозотеча і виділення з носа на ураженому боці. Який вегетативний вузол залучений в запальний процес?

Крилопіднебінний

Війковий
Під'язиковий
Піднижньощелеповий
Привушний

У хворого спостерігається асиметрія обличчя, особливо при спробі виконати активне скорочення м'язів обличчя. Про ураження якого нерва повинен думати лікар?

Лицевого, його рухових волокон
Трійчастого 1-ої гілки (очний)
Трійчастого 2-ої гілки (верхньощелепний)
Трійчастого 3-ої гілки (нижньощелепний)
Під'язикового

Унаслідок вивиху нижньої щелепи у пацієнта спостерігається відсутність відчуття смаку передньою 2/3 язика і слюзотеча. Подразненням якого нерва це викликано?

Лицевого
Блукаючого
Під'язикового
Нижньощелепного
Барабанної струни.

Який нерв уражений, якщо у хворого права носо-губна складка згладжена, розширена права очноямкова щілина (її не можна заплющити під час примруження, тому що повіки не змикаються), виникають ускладнення під час розмови і їжі (їжа застряє між щогою і зубами)?

N. facialis dexter
N. vagus dexter
N. abducens dexter
N. glossopharyngeus sinister
N. trigeminus dexter

У хворого запалення середнього вуха (отит). При цьому він скаржиться на розлад сприйняття смаку в передній частині язика. Який нерв постраждав?

N. facialis
N. trigeminus
N. vagus
N. vestibulo-cochlearis
N. glossopharyngeus

При розтині глибокого абсцесу щоки було проведено вертикальний розріз, після чого спостерігається порушення функції м'язів на місці операції. Гілки якого нерва були перерізані?

Лицевого
Нижньощелепного
Під'язикового
Блукаючого
Верхньощелепного

Хворий скаржиться на сухість у роті, зменшення виділення слини. Які нерви пошкоджені?

Парасимпатичні волокна барабанної струни
Рухові волокна під'язикового нерва
Чутливі волокна язикового нерва
Парасимпатичні волокна блукаючого нерва
Симпатичні волокна симпатичного стовбура

У хворого після перенесеного грипу спостерігається маскоподібне обличчя: кут рота опущений, носо-губна складка згладжена, нижня повіка опущена. Який з нервів пошкоджений?

Лицевий

Верхньощелепний

Нижньощелепний

Великий кам'янистий

Очний

У боксера після удару в привушну ділянку зліва виник параліч м'язів на цьому ж боці. Який нерв пошкоджено?

Лицевий

Малий кам'янистий нерв

Очний

Верхньощелепний

Нижньощелепний

У хворого знижений слух на ліве вухо. В якому утворенні локалізовані ядра ураженого нерва?

Area vestibularis ромбоподібної ямки

Гіпоталамус

Проміжний мозок

Середній мозок

Pedunculi cerebri

У хворого порушено орієнтування в просторі і рівновагу тіла. Які ядра стовбура мозку пошкоджені?

Присінкові ядра

Ядро лицевого нерва

Ядра медіальних колінчастих тіл

Рухове ядро додаткового нерва

--

У хворого втрата слухової чутливості внаслідок пошкодження восьмої пари ЧН. В якому вузлі знаходяться перші нейрони слухового шляху?

Gangl. spirale

Gangl. trigeminale

Gangl. vestibulare

Gangl. geniculi

Gangl. ciliare

Хворий скаржиться на запаморочення і втрату слуху з боку правого вуха. Який нерв пошкоджений?

Правий присінково-завитковий нерв

Лівий присінково-завитковий нерв

Під'язиковий

Блукаючий

Блоковий

Під час прийому до клініки, обстежуючи хворого, виявлено, що у нього порушені смакові рецептори, що сприймають гірке, порушена тактильна чутливість задньої 1/3 язика. Який нерв залучено у патологічний процес?

Язикоглотковий

Під'язиковий
Язиковий.
Лицевий
Трійчастий

До клініки звернувся чоловік, 45 років, зі скаргами на втрату чутливості в ділянці задньої 1/3 язика. Функція якої пари черепних нервів порушена?

IX
X
VII
V
VI

У хворого спостерігається порушення функції привушної слинної залози. Який нерв підсилює її секрецію?

N. petrosus minor
N. auricularis major
N. petrosus major
N. petrosus profundus
N. auricularis minor

Хворий скаржиться на біль в ділянці кореня язика і піднебінних мигдаликів. Який нерв іннервує ці ділянки?

Язикоглотковий нерв
Під'язиковий
Додатковий нерв
Трійчастий
Блоковий

Під час рентгенологічного дослідження у хворого виявлено збільшені лімфатичні вузли в ділянці кореня легені. Хворий скаржиться на уповільнення серцевого ритму і больові відчуття в серці. Лікар вважає, що симптоми з боку серця викликані тиском на його нерви збільшених вузлів. Які з нервів стиснуто збільшеними лімфатичними вузлами?

Rr. cardiaci n. vagus
N. splanchnicus major
N. phrenicus
Nn. intercostales
Truncus sympaticus

У хворого з анеризмою підключичної артерії спостерігається охриплість голосу. З подразненням якого нерва це може бути пов'язано?

N. laryngeus recurrens dexter
N. laryngeus inferior sinister
N. laryngeus superior dexter
N. Laryngeus recurrens sinister
N. Laryngeus superior sinister

Хворому проведено субтотальну субфасціальну резекцію щитоподібної залози. У післяопераційному періоді тривалий час зберігається охриплість голосу. Який нерв пошкоджений у ході операції?

Поворотний гортанний нерв
Під'язиковий
Верхній гортанний
Нижньощелепний

Верхньощелепний

Після операції на шлунку у хворого виявлено ускладнення: уповільнилася перистальтика і секреція залоз і послабився воротарний сфінктер. Який нерв був пошкоджений при операції?

Блукаючий нерв

Додатковий нерв

Язикоглотковий

Трійчастий

Блоковий

Виконуючи неврологічне обстеження пацієнта, 22 роки, лікар попросив його відкрити рот і вимовити звук «Аааа», при цьому оцінював, чи симетрично піднімається м'яке піднебіння. Потім лікар доторкнувся ватним тампоном до м'якого піднебіння і у відповідь виник блювотний рефлекс, що супроводжувався рухом піднебіння та глотки. Які черепні нерви досліджував лікар?

9 і 10

10,11 і 12

5,7 і 9

7,8 і 9

9 і 12

У хворого, 60 років, тромбоз сигмоподібного синуса в ділянці яремного отвору. При цьому задіяні IX, X, XI пари черепних нервів. Це призвело до порушення ковтання, охриплості, уповільнення пульсу і дихання, судом м'язів у ділянці ший. Які м'язи ший задіяні?

Mm. trapezius, m. sternocleidomastoideus

M. sternohyoideus

M. scalenus anterior

M. scalenus posterior

M. omohyoideus

Хворий скаржиться на ускладнення підйому правої руки вище горизонтального рівня. Ураження якого нерва призводить до цього?

Правий додатковий нерв

Лівий додатковий нерв

Великий грудний

Малий грудний

Правий блукаючий

У хворого при висуненні язика спостерігається відхилення його верхівки вправо. Рухова іннервація якого черепного нерва порушена в цьому випадку?

N. hypoglossus dexter

N. glossopharyngeus dexter

N. vagus dexter

N. trigeminus sinister

N. facialis sinister

Хворий із зусиллями вимовляє слова, а також скаржиться на ускладнення при ковтанні. Пошкодження якого нерва викликало таку клінічну картину?

N.hypoglossus

N.vagus

N.facialis

N.glossopharyngeus

N.accessorius

У процесі стоматологічних маніпуляцій пошкоджені волокна 12 пари черепних нервів зліва.

У чому це виявилось?

Порушення скорочення м'язів язика зліва

Порушення скорочення м'язів м'якого піднебіння

Порушення скорочення м'язів гортані

Порушення скорочення м'язів, що піднімають під'язикову кістку

Порушення скорочення м'язів глотки

У хворого, 40 років, з переломом основи черепа діагностовано синдром Граденіго, для якого характерні різкі болі в лобово-скроневій ділянці і неможливість відвести око назовні. Функція яких нервів порушена?

N. abducens, n. ophthalmicus

N. oculomotorius, n. ophthalmicus

N. trochlearis., n. ophthalmicus

N. vagus, n. ophthalmicus

N. infraorbitalis, n. ophthalmicus

У хворого на фоні розриву a. carotis interna в печеристій пазусі спостерігається пульсуючий екзофтальм (синхронно пульсу), вислуховується дуючий шум (через очне яблуко), розширення очної щілини і зіниці. Які пари черепних нервів, що проходять в sinus cavernosus разом з пошкодженою судиною, стиснуті гематомою?

III, IV, VI, I гілка V

III, IV, I гілка V

IV, VI, I гілка V

VI

VII

Під час УЗД у хворого виявлена аневризма в ділянці дуги аорти, яка призвела до зміни голосової функції гортані. Який нерв при цьому перетиснуто?

Поворотний гортанний

Діафрагмовий

Верхній гортанний

Нижньощелепний

Під'язиковий

Хворий 30 років звернувся до лікаря – невропатолога зі скаргою на втрату чутливості шкіри задньої ділянки правої гомілки, середньої і нижньої її третини. Ураження якого нерва встановив лікар?

Литкового нерва

Задньої шкірної гілки крижового сплетення

Підшкірного нерву

Гілки затульного нерва

Великогомілкового нерва

У хворого спостерігається порушення чутливості на латеральній поверхні передпліччя. Який нерв пошкоджений?

N. musculocutaneus

N. radialis

N. ulnaris

N. medianus

N. axillaris

У хворого відсутня чутливість шкіри мізинця. Який нерв постраждав?

Ліктьовий

Серединний
Променевий
М'язово – шкірний
Присередній шкірний передпліччя

Внаслідок травми гребеня клубової кістки у постраждалого відсутня чутливість шкіри в ділянці пупкового кільця й нижче. Який з названих нервів вірогідно ушкоджений?

N. iliohypogastricus
N. ilioinguinalis
N. cutaneus femoris lateralis
N. obturatorius
N. genitofemoralis

Внаслідок поранення пахвинної ділянки хворий втратив чутливість шкіри в нижньому відділі присередньої поверхні стегна і можливість приведення стегна. Який з нервів при цьому постраждав?

N. obturatorius
N. femoralis
N. genitofemoralis
N. ilioinguinalis
Ramus femoralis n.genitofemoralis

У хворого запалення внутрішнього вуха. Після обстеження лікар констатує ураження тіл 1-х нейронів слухового аналізатора. Де вони знаходяться?

G. spirale
G. vestibulare
G. geniculi
G. trigeminale
G. ciliare

Дитині 2-х років поставлений діагноз - розбіжна косоокість. Який м'яз очного яблука вражений?

Медіальний прямий
Латеральний прямий
Верхній прямий
Нижній прямий
Нижній косий

У хворого збіжна косоокість. Який з м'язів очного яблука пошкоджено?

Musculus rectus oculi lateralis
Musculus rectus oculi medialis
Musculus rectus oculi superior
Musculus rectus oculi inferior
Musculus obliquus oculi superior

До лікаря звернулась жінка 54 років із скаргами на запаморочення, нудоту, порушення рівноваги після падіння і травми голови. Порушення функції якої структури внутрішнього вуха ймовірніше всього було?

Organum vestibulare
Labyrinthus osseus
Organum spirale
Membrana tympani
Canalis longitudinalis modiolii

Хворий 28 років на виробництві отримав хімічний опік обличчя і рідина потрапила в око. Хворий втратив зір. Яка структура очного яблука ушкоджена внаслідок хімічного опіку?

Рогівка

Кришталік

Скliste тіло

Сітківка

Райдужка

У дитини 5 років при гнійному запаленні внутрішнього вуха з'явилися симптоми запалення твердої мозкової оболони. Шлях проходження інфекції ? Через:

Водопровід присінка

Каналець завитки

Вікно завитки

Вікно присінка

Барабанний каналець

В очне відділення доставлений 40 річний чоловік, який два тижні тому переніс опік очного яблука. Які з перелічених структур постраждали в першу чергу?

Рогівка

Війчасте тіло

Райдужка

Кришталік

Скliste тіло

У хворого звужена зіниця, при зменшенні освітлення не розширюється. В якому місці відбулося ураження центральної нервової системи?

Бічний ріг сірої речовини спинного мозку на рівні CVIII - ThI

Покрив ніжки середнього мозку на рівні верхніх горбиків його покришки

Основа ніжки середнього мозку на рівні нижніх горбиків його покришки

Бічне колінчасте тіло проміжного мозку

Верхні горбики покришки середнього мозку

У хворого порушений зір у вигляді випадіння медіального поля зору справа та латерального поля зору зліва. Яка частина зорового аналізатора порушена?

Лівий зоровий тракт

Правий зоровий тракт

Зорове перехрестя

Правий зоровий нерв

Лівий зоровий нерв

У чоловіка 40 років після черепно-мозкової травми спостерігається випадіння зору правих половин сітківки обох сторін. Очі без патології. Де наймовірніше всього може бути локалізоване пошкодження?

В кірковому кінці зорового аналізатора справа

В кірковому кінці зорового аналізатора зліва

В ділянці зорового перехрестя

В зоровому нерві

В латеральному ядрі таламуса

У хворого знижений слух. При огляді виявлено сірчаний корок. В якій частині органу слуху зміни?

У зовнішньому вусі

У середньому вусі

У внутрішньому вусі

У барабанній перетинці
У слуховій трубі

Хвора 25 років звернулася зі скаргами на погіршення зору. При огляді виявлено порушення акомодатції, зіниця розширена, не реагує на світло. Функція яких м'язів постраждали при цьому?

М'яз, що звужує зіницю; війковий
М'яз, що розширює зіницю; війковий
Верхній косий; війковий
Бічний прямий; м'яз, що звужує зіницю
М'язи, що звужують і розширюють зіницю

До хірурга звернулася жінка, при пальпації визначається ущільнення в молочній залозі. В якому напрямку повинен зробити розріз хірург під час операції для зменшення травмування часточки?

Радіально
Вертикально
Поперечно
Дугоподібно
-

Хвора А, 75 р., доставлена в офтальмологічне відділення лікарні зі скаргами на погіршення зору. При об'єктивному дослідженні встановлена наявність пухлини мозку, розташованої в ділянці лівого зорового тракту. Які порушення зору будуть спостерігатися у хворої?

Випадіння зору в лівих половинах сітківки обох очей
Випадіння зору в правих половинах сітківки обох очей
Випадіння зору в обох половинах лівого ока
Випадіння зору в обох половинах правого ока
Випадіння зору в сітківках обох очей

У хворого стався крововилив в потиличну ділянку, в зоні шпорної борозни. Які функції організму при цьому постраждали?

Відсутній зір
Відсутній слух
Відсутній нюх
Відсутні рухи
Відсутня чутливість

У чоловіка 35 років з перенесеним менінгоенцефалітом відмічається різке зниження слуху. Обстеження виключає патологію звукопровідного та звукосприймального апаратів органа слуху. В якій звивині кори великого мозку патологічні зміни?

Верхній скроневій
Середній скроневій
Верхній лобовій
Надкрайовій
Кутовій

У хворого пухлина в ділянці верхнього носового ходу. Порушення яких функцій можна очікувати?

Порушення нюху
Порушення слиновідділення
Порушення смаку
Порушення слуху
Порушення ковтання

Дитина 5 років поступила в лор- відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення середнього вуха . Захворювання розпочалось з запалення носоглотки. Через який канал скроневої кістки інфекція потрапила в барабанну порожнину ?

М'язово-трубний канал

Барабанний каналець

Сонний канал

Каналець барабанної струни

Сонно-барабанні каналці

При ушкодженні якого з відділів провідного шляху зорового аналізатору виявиться відсутність чутливості до світлових подразників медіальної половини сітківки обох сторін.

Зорове перехрестя

Правий зоровий тракт

Лівий зоровий тракт

Правий зоровий нерв

Лівий зоровий нерв

У пацієнта з глаукомою порушений відтік водянистої вологи з передньої камери ока у венозне сплетення через дренажну систему. Який анатомічний утвір уражений?

Шлемів канал

Кришталик

Війчастий м'яз

М'язи райдужки

Цинова зв'язка

У жінки 60 років пухлина головного мозку спричинила руйнування лівого зорового тракту. Від яких ділянок сітківки не будуть проводитися імпульси до кіркового аналізатора органу зору?

Від медіальної половини сітківки правого ока і латеральної половини лівого ока

Від медіальної половини сітківки правого і лівого ока

Від латеральної половини сітківки правого і лівого ока

Від медіальної половини сітківки лівого ока і латеральної половини правого ока

Від усієї сітківки лівого ока

У хворого порушено відчуття смаку. При цьому загальна чутливість язика зберігається. Які сосочки язика не пошкоджені?

Ниткоподібні

Валикоподібні

Грибоподібні

Листоподібні

Всі

Жінка, 42 роки, звернулася до хірурга з приводу ущільнення в правій молочній залозі. Обстеження показало наявність невеликої доброякісної пухлини, що займає одну частку молочної залози. Яку кількість часток містить молочна залоза в нормі?

15-20 часток

25-30 часток

4-6 часток

6-8 часток

10-12 часток

Під час медичного огляду у військкоматі юнакові було поставлено діагноз -гінекомастія. Про який вид аномалії розвитку похідних шкіри йдеться?

Розвиток молочної залози за жіночим типом
Відсутність волосяного покриву
Розвиток додаткових молочних залоз
Зменшення кількості потових залоз
Формування помилкових статевих губ

До косметичного кабінету звернулася молода жінка. Вона вважає, що її молочні залози розташовані дуже низько. Вона соромиться своєї зовнішності, носить закриті плаття і наполягає на проведенні пластичної операції. На якому рівні в нормі розташовуються молочні залози?

Від 3 до 6 ребра.
Від 4 до 7 ребра.
Від 2 до 5 ребра.
Від 3 до 4 ребра.
Від 4 до 6 ребра.

Оперуючи на молочній залозі, хірурги надають перевагу радіальним розрізам. З особливостями будови яких анатомічних структур пов'язана така техніка операції?

Верхівки часточок сходяться до соска
Основи часточок звернені до соска
Часточки залози розташовані поперечно
Часточки залози розташовані вертикально
--

При судмедекспертизі одного з поданих для дослідження зразків шкіри було виявлено найбільшу кількість потових залоз. Якій ділянці шкіри померлого належав поданий матеріал?

Шкірі долонь
Шкірі живота
Шкірі спини
Шкірі грудей
Шкірі ліктя

При судмедекспертизі в досліджуваних зразках шкіри трупного матеріалу не було виявлено сальних залоз. Яким ділянкам тіла людини належала шкіра?

Підшві стоп
Перехідній ділянці губ
Голівці статевого члена
Шкірі молочних залоз
Шкірі мошонки

У результаті гнійного запалення дистальної фаланги великого пальця правої руки, пацієнту необхідно було видалити нігтьову пластинку. Які чинники анатомічної будови нігтя повинен враховувати хірург під час операції?

Ніготь є похідним епідермісу
Ніготь є виростом кісткової тканини
Ніготь є хрящовою пластинкою
Ніготь є виростом сухожилка
Ніготь є похідним дерми

До косметологічного кабінету звернулася молода дівчина зі скаргою на надмірний волосяний покрив гомілок. Вона неодноразово голила волосся, але воно знову відростало і ставало жорсткішим. Косметолог запропонував їй епіляцію (видалення волосся разом з волосяними цибулинами). В якому шарі шкіри розташовуються волосяні цибулини?

У сосочковому шарі шкіри
У сітчастому шарі шкіри
У товщі епідермісу
У підшкірній клітковині
Між епідермісом і дермою

До лікарні звернувся хворий, 27 років, зі скаргами на болі, почервоніння шкіри й утворення припухлості в правій пахвовій ділянці. Ці явища виникли після застосування неякісних дезодорантів. Лікар поставив діагноз - гідроаденіт (запалення потових залоз). В якому шарі шкіри розташовуються потові залози?

У сітчастому шарі дерми
На межі епідермісу та дерми
У сосочковому шарі дерми
В епідермісі
У підшкірній клітковині

В опікове відділення потрапив хворий, 38 років, який отримав важкі опіки під час пожежі. Лікарі визначили, що площа ураженої поверхні шкірних покривів становила 60%. Яка середня площа шкірних покривів людини?

1,5-2,0 м²
2,5-3,0 м²
2,3 -2,5 м²
1,0-1,2 м²
1,2-1,4 м²

Позитивний симптом Вебера при дослідженні органа слуху (звучання камертона при розташуванні його на середині тімені чути краще хворим вухом) свідчить про ураження:

Слухових кісточок і барабанної перетинки
Завитки
ІІІ пари черепномозкових нервів
Підкіркових центрів слуху
Кіркової слухової ділянки

У хворого пухлина в ділянці верхнього носового ходу. Порушення яких функцій можна чекати?

Порушення нюху
Порушення смаку
Порушення дихання
Порушення ковтання
Порушення слиновиділення

Після травми скроневої ділянки голови у хворого погіршився нюх. Порушення функції якого анатомічного утворення спостерігається?

Uncus
Tractus olfactorius
Fila olfactoria
Trigonum olfactorium
Bulbus olfactorius

Хворому в ЛОР-відділенні поставлено діагноз: хронічний риніт. Спостерігається розлад нюху. Які нервові структури уражені?

Рецептори нюхового нерва
Нюхова цибулина
Нюховий тракт

Поясна звивина
Гачок

Внаслідок травми відбувся розрив нюхових волокон, що виходять з порожнини носа. Крізь яку кістку проходять ці волокна?

Решітчасту
Клиноподібну
Верхню щелепу
Нижню носову раковину
Носову

У хворого спостерігається зниження гостроти слуху. Яка із зазначених анатомічних структур не бере участь у проведенні механічних коливань до Кортієва органа?

Tuba auditiva
Ossicula auditus
Scala vestibule
Membrana tympani
Scala tympani

До лікаря звернулася жінка, 54 роки, зі скаргами на запаморочення, нудоту, порушення рівноваги після падіння і травми голови. Порушення функції якої структури внутрішнього вуха найімовірніше було?

Organum vestibulare
Membrana tympani
Labyrinthus osseus
Organum spirale
Canalis longitudinalis modioli

У пацієнта внаслідок черепно-мозкової травми знижена шкірна чутливість. Яка ділянка кори великого мозку може бути ураженою?

Задня центральна звивина
Потилична ділянка
Поясна звивина
Лобна ділянка кори
Передня центральна звивина

В результаті патологічного процесу порушена функція центральної ланки еферентної частини симпатичного відділу вегетативної нервової системи. Вказати, де можлива локалізація процесу в спинному мозку?

Латеральне проміжне ядро бічних рогів
Медіальне проміжне ядро бічних рогів
Дорсальне ядро задніх рогів
Власне ядро задніх рогів
Ядро передніх рогів

У хворого на туберкульоз легенів збільшилися трахеобронхіальні лімфатичні вузли, що розташовані між дугою аорти і біфуркацією трахеї, що призвело до змін серцевого ритму. Які нерви або нервові сплетення можуть стискатися за такої патології?

Глибоке серцеве сплетення
Блукаючий нерв
Поверхнєве серцеве сплетення
Симпатичні нерви
Внутрішньоорганні серцеві сплетення

При підшкірному введенні розчину адреналіну у досліджуваного через 10 хв. спостерігається збліднення шкіри, тремтіння рук, прискорення пульсу, підйом АТ, збільшення цукру крові. Збудливістю якої частини нервової системи обумовлені ці симптоми?

Симпатичної

Парасимпатичної

Блукаючого ядра

Ядра Якубовича

Дорсального ядра Х пари

При проникних пораненнях грудної порожнини для профілактики шоку виконують новокаїнову блокаду в ділянці шиї. При цьому розчин новокаїну вводять у простір між внутрішньою і передхребетною фасціями. Які нервові утворення при цьому блокуються?

Блукаючий нерв і шийний відділ симпатичного стовбура

Нерви плечового сплетення

Корінці шийних сегментів спинного мозку

Під'язиковий і діафрагмовий нерви

Передні гілки грудних спинномозкових нервів

При введенні під шкіру 1 міліграма атропіну у досліджуваного через 5-10 хв. з'явилася сухість у роті, розширення зіниць, прискорення пульсу. Робота яких структур ВНС дає таку симптоматику?

Симпатичних закінчень

Парасимпатичних центрів у головному мозку

Симпатичних центрів у спинному мозку

Парасимпатичних закінчень

Черевного сплетення

У хворого посилена секреція привушної слинної залози. З подразненням якого ядра можна це пов'язати?

Nucleus salivatorius inferior

Nucleus solitarius

Nucleus salivatorius superior

Nucleus ambiguus

Nucleus dorsalis n. vagi

При поступово підсилюванні тиску на очні яблука (око-серцевий рефлекс) протягом 20-30 сек у досліджуваного спостерігається уповільнення пульсу на 10-12 уд/хв. Подразненням якого нерва обумовлена така реакція?

Блукаючого, його вегетативної частини

Зорового

Трійчастого

Окорухового

Симпатичних сплетень а. carotis interna

Стоматолог встановив, що хворий, 23 роки, скаржиться на велику кількість слини. Стимуляція якого вегетативного вузла викликає утворення великої кількості слини серозного характеру?

Ganglion oticum

Ganglion pterigopalatinum

Ganglion submandibulare

Ganglion ciliare

Ganglion sublinguale