

У хворого виступає лопаткова ость, які м'язи атрофовані?

Надостьовий, підостьовий

Надостьовий, м'яз-підіймач лопатки

Підостьовий, лопатково-під'язиковий

Підлопатковий, великий круглий

Дельтоподібний, малий круглий

Під час виконання фізичних вправ у 15-річного учня раптово виник біль в зоні кульшового суглоба при обертанні нижньої кінцівки всередину. Який м'яз ушкоджений?

Середній сідничний

Грушоподібний

Внутрішній затульний

Зовнішній затульний

Квадратний м'яз стегна

На рентгенограмі таза видно, що всі три частини кульшової кістки відокремлені проміжками, які відповідають невидимому на рентгенограмах хрящу. Для якого віку це характерно?

14 – 16 років

18 – 25 років

26 – 30 роки

31 – 40 років

41 – 50 років

Футболіст звернувся до лікаря зі скаргами на раптово виникаючі болі в правому колінному суглобі під час гри. При обстеженні встановлено зміщення бічного меніска. Яка зв'язка ушкоджена?

Поперечна

Хрестоподібні і дугоподібна

Хрестоподібні і зв'язка наколінка

Хрестоподібні і коса

Хрестоподібні і обхідні

Після глибокого опіку верхньої частини ділянки плеча у пацієнта з'явилися скарги на неможливість відведення плеча. Про пошкодження якого м'язу слід думати у даному випадку?

Дельтоподібного м'язу

Надостьового м'язу

Малого круглого м'язу

Двоголового м'язу

Великого грудного м'язу

Під час фінальної гри баскетболіст пошкодив праву гомілку, внаслідок чого стало неможливо згинати праву стопу. Лікар команди встановив, що пошкоджено сухожилок. Сухожилок якого м'язу пошкоджено?

Триголового м'язу литки (Ахіллового сухожилку)

Довгого розгинача великого пальця

Переднього великогомілкового м'яза

Двоголового м'язу стегна

Кравецького м'язу

Чоловік 26 р., у виробничих умовах отримав травму верхньої третини плеча. При обстеженні на травмпункті пошкоджень кісток не виявлено. Відмічається відсутність активного

розгинання передпліччя. Який м'яз, імовірноше всього, ушкоджений?

- Триголовий м'яз плеча
- Круглий м'яз-привертач
- Дзьобо-плечовий м'яз
- Двоголовий м'яз плеча
- Суглобовий м'яз ліктя

При огляді травматологом жінки 45 років було встановлено пошкодження малого круглого м'яза плеча. Яка функція плечового суглоба порушена?

- Приведення
- Згинання
- Відведення
- Розгинання
- Пронація

У хворого гостре запалення носо-сльозового каналу. Відомо, що після перенесеного грипу довгий час були виділення з носа. Із якого відділу носової порожнини могла потрапити інфекція в носо-сльозовий канал?

- Із нижнього носового ходу
- Із верхнього носового ходу
- Із середнього носового ходу
- Із загального носового ходу
- Із клино-решітчастого закрутку

Хворому з пухлиною гортані показана ургентна операція - накладання трахеостоми (введення металевої трубки в трахею) Який м'яз повинен розітнути хірург при здійсненні операції?

- Груднинно-під'язиковий
- Шило-під'язиковий
- Двочеревцевий
- Груднинно-ключично-соскоподібний
- Підборідно-під'язиковий

Дитина 3-х років поступила в клініку з діагнозом-отит. Є вірогідність розповсюдження гною із барабанної порожнини. Куди найвірогідніше може потрапити гній?

- В соскоподібну печеру
- У внутрішнє вухо
- В слухову трубу
- В зовнішній слуховий прохід
- В задню черепну ямку

Чоловіка 45 років доставлено в хірургічне відділення з різаною раною на медіальному краї передпліччя. Обстеження показало, що у хворого перерізано два м'яза передпліччя – ліктьовий згинач зап'ястка і ліктьовий розгинач зап'ястка. Які рухи не може виконувати хворий?

- Приведення кисті
- Згинання кисті
- Розгинання кисті
- Відведення кисті
- Розгинання і відведення кисті

У деяких народів Африки у дітей не буває дисплазії кульшового суглобу. До цього призводить:

- Положення дитини на стегні матері з розведеними ніжками

Положення дитини зі зведеними ніжками
Туге сповивання немовляти
Генетичні фактори
Особлива форма колиски

При травмі в області тазу у хворого на рентгенологічному знімку виявлено некроз головки стегнової кістки. Яка зі зв'язок кульшового суглобу містить артерію, яка кровопостачає головку стегнової кістки та була пошкоджена під час травми?

Зв'язка головки стегнової кістки
Клубово-стегнова зв'язка
Лобкова-стегнова зв'язка
Сіднично-стегнова зв'язка
Коловий пояс

Лижник, спускаючись з крутого схилу гори, не зміг вчасно загальмувати і впав на правий зігнутий колінний суглоб з пронацією гомілки. З гострим болем він був госпіталізований у травматологічне відділення. Механізм цієї травми характерне при пошкодженні:

Медіального меніску
Латерального меніску
Поперечної зв'язки коліна
Передньої схрещеної зв'язки
Задньої схрещеної зв'язки

Поклавши хворого на спину та зігнувши його травмовану ногу на 100-120°, лікар після повного розслаблення м'язів нижньої кінцівки перевіряв симптом "висувної шухляди". Він захопив гомілку травмованої ноги в верхній третині та рухав її вперед та назад по відношенню до стегна, зафіксувавши при цьому стопу. Лікар знайшов патологічне зміщення гомілки вперед по відношенню до стегна. Це свідчить про повний розрив зв'язки колінного суглобу:

Передня схрещена зв'язка
Задня схрещена зв'язка
Великогомілкова колатеральна зв'язка
Малогомілкова колатеральна зв'язка
Поперечна зв'язка коліна

Травматолог кладе свої великі пальці обернуті марлею на жувальні поверхні нижніх молярів хворого, другими пальцями захватчує нижній край нижньої щелепи та сильно тягне її до низу, а підборіддя у цей час повертає вгору. Далі щелепа відводиться назад. Що лікує травматолог?

Вивих нижньої щелепи
Перелом основи нижньої щелепи
Перелом тіла нижньої щелепи
Артроз скронево-нижньощелепного суглоба
Запалення ясен

Педіатр оглянув дитину 11,5 місяців. Скарг немає. Дитина активна, тримає голову, сидить, стоїть в манежі. Які вигини хребтового стовпа у нього сформувалися?

Шийний лордоз, грудний кіфоз, поперековий лордоз, крижовий кіфоз
Шийний лордоз, грудний кіфоз, поперековий лордоз
Грудний лордоз, поперековий лордоз, крижовий кіфоз
Шийний лордоз, крижовий кіфоз
Шийний лордоз, грудний кіфоз, крижовий кіфоз

Після невдалого стрибка з висоти спортсмен був доставлений до травмпункту зі скаргами на

різкий біль та набряк в області правої стопи. При обстеженні права стопа у задній її третині різко болюча при пальпації, наявний крововилив на підошві, рухи у надп'яtkово-гомiлковому суглобі можливі у повному обсязі. Які кістки можуть бути пошкоджені?

П'яtkова кістка

Великогомілкова кістка

Променева кістка

Фаланги пальців стопи

Малогомілкова кістка

При переході вулиці у невстановленому місці дитина була вдарена бампером автомобіля у лівий бік. Доставлена до лікарні, де при огляді виявлений крововилив на лівій половині грудної клітини, різка болючість при пальпації, при спробі здавити грудну клітину відчувається хруст. Які кістки можуть бути пошкоджені?

Ребра

Грудні хребці

Ключиця

Лопатка

Кульшова кістка

Під час пірнання хлопець вдарився головою об дно озера. При огляді виявляється різка болючість шиї, слабкість у верхніх кінцівках, повертання голови здійснити не може. Які кістки можуть бути пошкоджені?

Шийні хребці

Лобова кістка

Під'язикова кістка

Лопатка

Ключиця

При падінні на приведену до тулуба праву руку постраждалий відчув хруст та різкий біль у верхній третині правого плеча. Рухи у плечі неможливі, є деформація у верхній його третині. Які кістки можуть бути пошкоджені?

Плечова кістка

Лопатка

Ключиця

Груднина

Ребра

Хокеїст при падінні на коліна відчув різкий біль та хруст в області лівого колінного суглоба. При огляді виявлений сильний набряк в області лівого колінного суглоба та верхньої третини лівої гомілки, крововилив і біль передньої поверхні лівого колінного суглоба. Рухи у суглобі у повному об'ємі. Які кістки можуть бути пошкоджені?

Наколінник

Малогомілкова кістка

Сіднична кістка

Стегнова кістка

Великогомілкова кістка

Під час ожеледиці жінка впала на витягнену руку і відчула різкий біль. З'явилась деформація у нижній третині правого передпліччя, набряк і неможливість рухів у правій кисті. Які кістки можуть бути пошкоджені?

Променева та ліктюва кістки

Півмісяцева кістка та перша п'яtkова кістка

Плечова кістка та лопатка

Кістки п'яtkи та фаланг пальців руки

Кульшова кістка

Будівник впав з висоти та вдарився лівою половиною тіла, після чого відчув сильний біль у верхній третині лівого стегна. Стати на ліву ногу не може, рухи у лівій нижній кінцівці виконати не вдається. Посилюється набряк в області лівого кульшового суглоба та ознаки крововтрати. Які кістки можуть бути пошкоджені?

Шийка стегнової кістки

Поперекові хребці

Крижова кістка

Ребра

Лобкова кістка

Дівчина під час виконання гімнастичних вправ, глибоко присівши, вдарилася об тверду поверхню областю крижі. Наступного дня вона стала відчувати різкий біль у місті удару, особливо при спробі сісти та ходінні. При огляді крижової області під шкірою у її нижній третині лікарем виявлений крововилив. Які кістки можуть бути пошкоджені?

Куприкова кістка

Стегнова кістка

Лобкова кістка

Сіднична кістка

Груднина

Після звільнення з під завалу у постраждалого відзначається затемнення свідомості, багато підшкірних крововиливів на голові та шиї, дрібні рани на обличчі. У задньо-верхніх відділах голови скальпована рана та різка деформація контурів голови. Які кістки можуть бути пошкоджені?

Тім'яна та потилична кістка

Клиноподібна кістка та нижня щелепа

Лобова та носові кістки

Скронева кістка та верхня щелепа

Вилична та слъозова кістка

Хворий 45 років після травми правого плеча (внаслідок падіння) не може відвести праву руку до горизонтального рівня. Пошкодження якого з м'язів викликало вказане обмеження руху?

Дельтоподібного

Плечового

Підостьового

Двоголового м'яза плеча

Великого круглого

Після перенесеної черепно-мозкової травми і рентгенологічного обстеження виявлено перелом основи черепа. Лінія перелому проходить через остистий і круглий отвори. Яка кістка пошкоджена внаслідок травми?

Клиноподібна

Скронева

Решітчаста

Лобова

Потилична

У хворого 45 років з підозрою на запалення оболонок мозку потрібно було отримати спинномозкову рідину. Зроблено діагностичну пункцію між дугами поперекових хребців (L3-L4). Через яку зв'язку повинна проникнути голка при пункції?

Жовту зв'язку

Клубово-поперекову
Передню поздовжню
Задню поздовжню
Міжпоперечну зв'язку

Хворий не може розвести пальці кисті. Функція яких м'язів порушена?
Тильних міжкісткових
Червоподібних
Долонних міжкісткових
Поверхневого згинача пальців
Глибокого згинача пальців

У хворого з ножовим пораненням стегна утруднене розгинання гомілки. Який із м'язів постраждав сильніше?
Чотириголовий м'яз стегна
Ніжний
Кравецький
Двоголовий м'яз стегна
Півсухожилковий

У хворого 28 років, діагностовано гострий запальний процес слизової оболонки нососльозової протоки. З анамнезу стало відомо, що після перенесеного грипу протягом 10-ти днів були виділення із носа. З якого відділу носової порожнини інфекція могла проникнути у нососльозову протоку?
Із нижнього носового ходу
Із середнього носового ходу
Із верхнього носового ходу
Із присінку носа
Із лобової пазухи

Хворий скаржиться на головний біль, утруднене дихання. Рентген підтвердив діагноз – фронтит (запалення лобової пазухи). В якому носовому ході при огляді порожнини носа можуть спостерігатись гнійні виділення?
Середньому
Верхньому
Нижньому
Загальному
Над верхньою носовою раковиною

Хворий з ножовим пораненням верхньобічної ділянки плеча не може відвести руку до горизонтальної площини. Який із м'язів пошкоджено?
Дельтоподібний
Двоголовий
Плечовий
Триголовий
Дзьобо-плечовий

Хворий потрапив у клініку з травмою черепа. При рентгенологічному обстеженні виявлено перелом основи черепа в ділянці каналу під'язикового нерва. Яку кістку черепа пошкоджено?
Потиличну
Скроневу
Тім'яну
Клиноподібну
Лобову

Під час обстеження пацієнта ЛОР лікар діагностував запалення верхньощелепних пазух. В якому носовому ході під час риноскопії був виявлений гній?

- В середньому
- В верхньому
- В нижньому
- У загальному
- В найвищому

Після травми ока виникло нагноєння м'яких тканин орбіти. Через який анатомічний утвір гнійний процес може поширитись у крило-піднебінну ямку?

- Через нижню очноямкову щілину
- Через круглий отвір
- Через клино-піднебінний отвір
- Через верхню очноямкову щілину
- Через вилично-очноямковий отвір

У пацієнта спостерігається обмеження обсягу відведення у плечовому суглобі (менше, ніж 50°). Функція якого м'язу порушена:

- M. deltoideus
- M. pectoralis major
- M. infraspinatus
- M. trapezius
- M. serratus anterior

У хворого гнійне запалення клиноподібної пазухи. В яку частину носової порожнини витікає гній?

- Meatus nasi superior
- Meatus nasi communis
- Meatus nasi medius
- Meatus nasi inferior

--

В травматологічне відділення поступив хлопчик 10 років із травмою правого стегна. На рентгенограмі не виявлено перелому стегнової кістки, але видно темні проміжки на її проксимальному і дистальному кінцях. Що це?

- Метафізарний хрящ
- Епіфіз
- Діафіз
- Суглобовий хрящ
- Апофіз

Після травми в ділянці колінного суглоба у хворого спостерігається симптом «висувної шухляди» - передньо-заднє зміщення гомілки по відношенню до стегна. Які зв'язки пошкоджені?

- Хрестоподібні зв'язки
- Дугоподібні підколінні зв'язки
- Коса підколінна зв'язка
- Міжкісткова мембрана
- Колатеральні зв'язки

У чоловіка 70 років внаслідок падіння стався перелом стегнової кістки. Яке найпоширеніше місце перелому цієї кістки у даному випадку?

- Шийка

Середина
Верхня третина
Нижня третина
Виростки

Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на неможливість приведення і відведення пальців в п'ястково-фалангових суглобах по відношенню до 3 пальця. Функція яких м'язів порушена?

Міжкісткових
Червоподібний
Коротких згиначів пальців
Довгих згиначів пальців
Розгиначів

При огляді пацієнта із запаленням лицевого нерва відзначається згладженість складок шкіри чола, права очна щілина ширша лівої, згладжена права носо-губних складка, кут рота справа опущений, рот перекошений вліво. Функція яких м'язів порушена?

Мімічних
Жувальних
Склепіння черепа
Надпід'язикових
Підпід'язикових

При гнійному отиті гноєм пошкоджено верхню стінку барабанної порожнини. У яку ямку черепа розповсюдився гній із барабанної порожнини?

В середню черепну ямку
В задню черепну ямку
В передню черепну ямку
В очну ямку
В крило-піднебінну ямку

При обстеженні міміки хворого виявлено, що він не може скласти губи трубочкою, не може свистіти, а ротова щілина розтягується в боки (поперечна посмішка). На атрофію якого м'язу вказують дані симптоми?

Колового м'яза
Великого виличного м'язу
Щічного м'язу
М'язу сміху
Жувального м'язу

У хворого з цукровим діабетом розвинулася волога гангрена стопи. Йому показана ампутація в ділянці поперечного суглоба заплесна (суглоба Шопара). Яку ключову зв'язку повинні пересікти хірурги для видалення в даному суглобі?

Lig. bifurcatum
Lig. cuneocuboideum dorsale
Lig. talocalcaneum laterale
Lig. mediale
Lig. talocalcaneum interosseum

Дитина 5 років страждає на деформацію ший. При клінічному обстеженні виявлено такі симптоми: виражений нахил голови вліво, обличчя повернене вправо, пасивні рухи голови вправо обмежені. Порушення розвитку якого м'язу мало місце:

Груднинно-ключично-соскоподібного
Трапецієподібного
Ремінного м'язу голови
Груднинно-під'язикового

Довгого м'язу голови.

На рентгенограмі тазової кістки у новонародженого визначаються три самостійні кістки, які з'єднані хрящем в ділянці кульшової западини. Які це кістки?

Клубова, лобкова, сіднична
Лобкова, сіднична, стегнова
Сіднична, стегнова, крижова
Клубова, крижова, куприкова
Крижова, лобкова, куприкова

У потерпілого травма в результаті прямого удару по внутрішній поверхні середньої третини гомілки. Перелом якого анатомічного утворення найбільш вірогідний?

Діафіз великогомілкової кістки
Дистальний епіфіз малогомілкової кістки
Дистальний епіфіз великогомілкової кістки
Проксимальний епіфіз великогомілкової кістки
Проксимальний епіфіз малогомілкової кістки

У хворої дитини 10-ти років визначається спинномозкова грижа в області XII грудного хребця. Незрошення якої анатомічної структури призвело до випинання спинного мозку?

Дуги хребця
Тіла хребця
Міжхребцевого диска
Суглобових відростків
Остистого відростка

У хворого вивих плечового суглоба зі зміщенням головки плечової кістки догори і вперед. Сухожилок якого м'яза може бути пошкоджено?

Довгої головки двоголового
Короткої головки двоголового
Довгої головки триголового
Дельтоподібного
Дзьобо-плечового

У спортсмена виник біль по ходу сідничного нерва внаслідок стискання його м'язом, що проходить через великий сідничний отвір. Який м'яз був травмований під час фізичних вправ?

Грушоподібний
Внутрішній затульний
Великий поперековий
Клубовий
Зовнішній затульний

У травматологічне відділення поступив чоловік 35 років з травмою лівої кисті. При огляді встановлено: різана рана долонної поверхні лівої кисті; середні фаланги II – V пальців не згинаються. Які м'язи пошкоджені?

Поверхневий м'яз-згинач пальців
Глибокий м'яз-згиначів пальців
Червоподібні м'язи
Долонні міжкісткові м'язи
Тильні міжкісткові м'язи

При рентгенологічному обстеженні у пацієнта була виявлена кіла міжхребцевого диску грудного відділу хребетного стовпа. Який вид з'єднання між хребцями зазнав патологічних

змін?

Синхондроз

Діартроз

Синсаркоз

Геміартроз

Синостоз

За даними статистики, найчастіше переломи кісток трапляються як у юнаків, так і у людей похилого віку в області розташування хірургічної шийки. Вказати, на якій із перерахованих кісток знаходиться даний утвір?

Humerus

Radius

Femur

Fibula

Talus

Під час футбольного матчу гравець отримав травму колінного суглоба. На рентгенівській плівці помітно виражений перелом кістки, що лежить у товщі сухожилка чотириголового м'яза стегна. До якої з перелічених груп кісток належить ця кістка?

Сесамоподібні

Плоскі

Трубчасті

Повітроносні

Змішані

При падінні у маленької дитини було травмоване переднє тім'ячко. Який вид з'єднання кісток черепа зазнав патологічних змін.

Синдесмоз

Синхондроз

Синостоз

Синсаркоз

Геміартроз

Внаслідок перелому великогомілкової кістки був пошкоджений м'язи передньої групи гомілки. Функція якого м'язу може бути порушена?

Довгого розгинача великого пальця стопи

Довгого згинача пальців стопи

Довгого малоомілкового м'яза

Камбалоподібного м'яза

Короткого розгинача пальців стопи

Хворий скаржиться на болі при рухах в лівій половині шиї. Найкраще положення, при якому хворий не відчуває болю - нахил шиї вліво з одночасним підняттям голови і поверненням обличчя в протилежну сторону. Функція якого м'язу порушена?

M. sternocleidomastoideus зліва

M. sternocleidomastoideus справа

M. trapezius зліва

M. trapezius справа

M. sternohyoideus

Одержавши травму плеча в ділянці великого горбка плечової кістки хворий скаржиться на неможливість повернення плеча назовні. Які м'язи травмовано?

M. infraspinatus et m.teres minor

M. supraspinatus et m. teres major

M. subscapularis et m. coracobrachialis
M. deltoideus et m. supraspinatus
M. teres major et m. teres minor

Після травми хворий не може розігнути руку у ліктьовому суглобі. Порушення функції якого м'яза може це викликати?

Musculus triceps brachii
Musculus biceps brachii
Musculus brachialis
Musculus coraco-brachialis
Musculus subscapularis

У чоловіка внаслідок поранення ділянки передньої поверхні плеча рука не згинається у ліктьовому суглобі. Який з названих м'язів вірогідно постраждав?

M. biceps brachii
M. deltoideus
M. pectoralis major
M. triceps brachii
M. anconeus

Спортсмен-баскетболіст скаржиться на біль вище п'яти, що підсилюється під час ходіння. Сухожилок якого з м'язів вірогідно ушкоджено?

M. triceps surae
M. tibialis posterior
M. flexor digitorum longus
M. fibularis longus
M. fibularis brevis

У хворого порушені рухи кисті. Встановлено запалення спільної синовіальної піхви м'язів-згиначів. З анамнезу відомо, що хворий тиждень тому отримав колоту травму пальця. Який з пальців найбільш вірогідно був ушкоджений?

Digitus minimus
Pollex
Digitus medius
Index
Digitus anularis

У дитини перелом плечової кістки. Зламана рука почала відставати в рості. Яка частина кістки постраждала?

Метафіз
Епіфіз
Діафіз
Апофіз
Кістковомозковий канал

Для визначення межі між шийним та грудним відділами хребта, лікар повинен пальпаторно знайти відросток VII шийного хребця. Що це за відросток?

Остистий
Поперечний
Верхній суглобовий
Нижній суглобовий
Соскоподібний

У пораненого кровотеча із гілок сонної артерії. Для тимчасового припинення кровотечі,

сонну артерію треба притиснути до горбка поперечного відростка шийного хребця. Якого саме?

- VI
- V
- IV
- III
- II

У дитини природжене спастичне скорочення м'язів на одній стороні шиї, або “кривошия”. Який м'яз при цьому страждає?

- Груднинно-ключично-соскоподібний
- Підшкірний
- Груднинно-під'язиковий
- Груднинно-щитоподібний
- Лопатково-під'язиковий

В результаті травми, хворий не може підняти руку до горизонтального рівня. Який м'яз постраждав?

- Дельтоподібний
- Двоголовий
- Триголовий
- Трапецієподібний
- Найширший м'яз спини

У хворої під час травми стався розрив лобкового симфізу. Який тип з'єднання постраждав ?

- Геміартроз
- Синдесмоз
- Синхондроз
- Синостоз
- Діартроз

Під час ДТП водій отримав численні ушкодження бічної поверхні голови, серед яких був перелом виличної дуги. Функція якого з м'язів вірогідно буде страждати?

- M. masseter
- M. orbicularis oris
- M. buccinator
- M. procerus
- M. risorius

Після падіння з дерева у хлопчика утруднене відведення руки до горизонтального положення. Який із м'язів ймовірно пошкоджений?

- M. deltoideus
- M. triceps brachii
- M. anconeus
- M. coracobrachialis
- M. supinator

Хворий скаржиться на неможливість бічних рухів нижньої щелепи. Який з м'язів найвірогідніше ушкоджено?

- M. pterygoideus lateralis
- M. pterygoideus medialis
- M. buccinator
- M. masseter
- M. risorius

Внаслідок аварії у постраждалого сильна болісність і набряк передньої поверхні гомілки, тильне згинання стопи утруднене. Функція якого з названих м'язів гомілки вірогідно постраждала?

M. tibialis anterior

M. flexor digitorum longus

M. flexor hallucis longus

M. peroneus longus

M. peroneus brevis

У хворого очна щілина праворуч помітно більша ніж ліва. Функція якого з мімічних м'язів порушена?

M. orbicularis oculi

M. procerus

M. corrugator supercilli

M. occipitofrontalis [venter frontalis]

M. zygomaticus major

Хворий 30 років, із запаленням пульпи 2-го верхнього моляра, звернувся до лікаря зі скаргами на головний біль та слизові виділення з носа. Після огляду йому встановили діагноз – пульпіт, ускладнений синуситом. До якої з пазух потрапила інфекція від кореня зуба?

Верхньощелепної

Лобової

Клиноподібної

Решітчастої

Соскоподібних комірок

Хворий 35 років, звернувся до приймального відділення із скаргами на нежить та головний біль протягом 5 днів. Після обстеження йому встановили діагноз – гайморит (запалення верхньощелепної пазухи). Крізь який носовий хід інфекція потрапила до пазухи?

Середній

Верхній

Нижній

Загальний

Носоглотковий

У хворого спостерігається запалення клиноподібної пазухи. Куди відкривається її апертура?

Recessus sphenoethmoidalis

Infundibulum

Meatus nasi medius

Meatus nasi inferior

Meatus nasi communis

У дитини 2 років після перенесеного грипу з'явилися скарги на біль у вусі. Лікар виявив зниження слуху та запалення середнього вуха. Яким шляхом інфекція потрапила до середнього вуха?

Через слухову трубу

Через foramen jugularis

Через canalis caroticus

Через atrium mastoideum

Через canalis nasolacrimalis

У хворої М., 37 р. в результаті попадання чужорідного тіла в дихальні шляхи виник кашель, а потім ядуха. Хворому була зроблена трахеотомія в ділянці шиї, яка обмежена верхнім

черевцем m. omohyoideus, m. sternocleidomastoideus та серединною лінією шиї. В якому трикутнику шиї проведено хірургічне втручання?

Omotracheale

Caroticum

Submandibulare

Omotrapezoideum

Omoclaviculare

У вагітної жінки 29 р., лікар-акушер визначив розміри таза. За допомогою циркуля була виміряна відстань між двома верхніми передніми клубовими остями. Який розмір великого таза був визначений?

Distantia spinarum

Distantia cristarum

Distantia trochanterica

Conjugata vera

Conjugata anatomica

До лікаря звернувся хворий із скаргами на болі в лівій половині шиї, які посилюються при рухах голови. Положення при якому болі не турбують - це нахил голови вліво, з поверненням обличчя вправо. Ураження якого м'яза спричиняє біль в даному випадку?

Musculus sternocleidomastoideus sinister

Musculus sternocleidomastoideus dexter

Musculus platysma dexter

Musculus platysma sinister

Musculus longus colli

У хворого діагностовано тріщину задньої поверхні тіла плечової кістки. Наявні симптоми ураження променевого нерва в ділянці canalis humeromuscularis. Чим обмежений цей канал?

Задньою поверхнею плечової кістки і m. triceps humeri

Передньою поверхнею плечової кістки і m. biceps brachii

Передньою поверхнею плечової кістки і m. coracobrachialis

Передньою поверхнею плечової кістки і m. brachialis

Задньою поверхнею плечової кістки і m. anconeus

Хворий 25 років, звернувся до приймального відділення зі скаргами на нежить та головний біль протягом 4 днів. Після обстеження йому встановили діагноз фронтит. Крізь який носовий хід інфекція потрапила до лобової пазухи?

Середній

Верхній

Нижній

Загальний

Носоглотковий

У наслідок травми внизу передньої стінки живота у хворої ушкоджена зв'язка, що знаходиться у пахвинному каналі. Яка це зв'язка?

Ligamentum teres uteri

Ligamentum latum uteri

Ligamentum ovarium proprium

Ligamentum lacunare

Ligamentum inguinale

Під час обстеження, у хворого виявлено абсцес крило-піднебінної ямки. Куди може розповсюдитись інфекція при несвоєчасному наданні медичної допомоги?

Орбіту

Міжкрилоподібний простір
Лобову пазуху
Підапоневротичний скроневий простір
Барабанну порожнину

Після перенесеного ГРЗ у хворої спостерігається затrudнене носове дихання, підвищена температура, головні болі, слезовиділення, болючість при пальпації в ділянці fossa canina справа. Запаленням якої пазухи ускладнилось захворювання?

Sinus maxillaris dexter
Sinus frontalis dexter
Sinus shenoidalis dexter
Cellulae ethmoidales anteriores
Cellulae ethmoidales posteriores

У потерпілого вогнепальне поранення передньої стінки пахвової ямки. Які м'язи можуть бути пошкоджені при цьому?

Великий і малий грудні м'язи
Дельтоподібний і дзьобо-плечовий м'язи
Двоголовий м'яз плеча і плечовий
Передній зубчастий і підлопатковий м'язи
Великий і малий круглі м'язи

У спортсмена розрив Ахіллового сухожилка. Визначте, який м'яз пошкоджений.

Триголовий м'яз гомілки
Довгий малогомілковий
Передній великогомілковий
Довгий розгинач пальців
Короткий малогомілковий

У чоловіка глибока рубана рана стопи в області тильної поверхні першої плеснової кістки. Які м'язи постраждали при травмі?

Довгий і короткий розгиначі великого пальця
Передній великогомілковий м'яз і згиначі великого пальця
Довгий розгинач і згинач великого пальця
Короткий і довгий згиначі великого пальця
Короткий розгинач пальців і м'яз, що відводить великий палець

Травмований отримав різану рану нижньої третини лівого стегна. При обстеженні встановлено утруднене розгинання в колінному суглобі. Який м'яз стегна постраждав при травмі?

Чотириголовий
Кравецький
Великий привідний
Клубово-поперековий
Тонкий

У хворого встановлено запалення слизової оболонки лобової пазухи. В який з перелічених утворів буде прямувати запальна рідина?

Середній носовий хід
Верхній носовий хід
Нижній носовий хід
Хоани
Підскронева ямка

У пацієнта діагностовано перелом плечової кістки в ділянці міжгорбкової борозни. Сухожилок якого м'яза може бути травмований уламками кістки в першу чергу?

Двоголового м'яза плеча
Дельтоподібного м'яза
Великого круглого м'яза
Найширшого м'яза спини
Великого грудного м'яза

У хворого фронтит. З анамнезу відомо, що в нього було запалення верхньощелепної пазухи. Через який відділ носової порожнини могла потрапити інфекція в лобову пазуху?

Із середнього носового ходу
Із верхнього носового ходу
Із нижнього носового ходу
Із присінка носової порожнини
Із клино-решітчастого закутку

У пацієнта діагностовано компресійний перелом поперекового хребця. При цьому різко збільшилась кривизна лордозу поперекового відділу хребта. З ушкодженням якої зв'язки може супроводжуватись така зміна кривизни хребтового стовпа?

Передня поздовжня зв'язка
Задня поздовжня зв'язка
Жовта зв'язка
Клубово-поперекова зв'язка
Міжостьова зв'язка

До реанімаційного відділення поступив чоловік з пораненням задньої ділянки шиї (regio nuchae). Який з м'язів тіла займає цю ділянку?

M. trapezius
M. sternocleidomastoideus
M. latissimus dorsi
M. rhomboideus minor
M. scalenus anterior

Жінка похилого віку госпіталізована з скаргами на різкий біль, набряк в ділянці правого кульшового суглобу, що з'явилася після падіння. При огляді: стегно приведенне всередину, рухи в кульшовому суглобі порушені. Перелом якої кістки або її частини визначив лікар?

Шийка стегнової кістки
Тіло стегнової кістки
Виростки стегнової кістки
Лобкова кістка
Сіднича кістка

Внаслідок пухлини гіпофіза при рентгенографії виявлено руйнування і збільшення ямки турецького сідла. Яка кісткова порожнина при цьому вражена?

Пазуха клиноподібної кістки
Сонний канал
Зоровий канал
Барабанна порожнина
Лицевий канал

У чоловіка 70 років внаслідок падіння стався перелом стегнової кістки. Яке найпоширеніше місце перелому цієї кістки у даному віці?

Шийка

Середня третина тіла
Верхня третина тіла
Нижня третина тіла
Виростки

Хворий не може підняти опущену вниз нижню щелепу. Які м'язи не можуть виконати свої функції?

Жувальні м'язи
Мімічні м'язи
Коловий м'яз рота
Надчерепний м'яз
М'яз-підіймач кута рота

40 річний чоловік звернувся до стоматолога зі скаргою на розлади жування, у нього виникає біль при відтягуванні щелепи назад. Лікар встановив запалення одного з жувальних м'язів. Якого?

Скроневого (задні волокна)
Скроневого (передні волокна)
Крилоподібного медіального
Крилоподібного латерального
Жувального

Дитина, 5 років, потрапила в тяжкому стані в інфекційне відділення клінічної лікарні з діагнозом дифтерії. Для запобігання ядухи дитині провели трахеотомію. В якому трикутнику шиї проведена дана операція?

Omotracheale
Caroticum
Omoclaviculare
Submandibulare
Omotrapezoideum

У хворого з невритом стегнового нерва порушено згинання стегна та розгинання гомілки у колінному суглобі. Функція якого м'яза при цьому порушена?

Чотириголового м'язу стегна
Двоголового м'язу стегна
Триголового м'яз стегна
Півсухожилкового м'язу
Півперетинчастого м'язу

Хворий звернувся до лікаря з пораненням проксимальної фаланги пальця, яке ускладнилося флегмоною долоні. Гній заповнив спільну синовіальну піхву для згиначів, в який лежать сухожилки поверхневого та глибокого м'язів-згиначів пальців. На якому пальці було ушкодження проксимальної фаланги?

V
II
III
IV
I

У хворого після травми коліна можна зміщувати гомілку у зігнутому під прямим кутом положенні вперед і назад, подібно до висувної шухляди. Які зв'язки розірвані?

Хрестоподібні зв'язки коліна
Коса підколінна зв'язка
Поперечна зв'язка коліна

Великогомілкова обхідна
Малогомілкова обхідна

На заняттях з лікувальної фізкультури лікар-фізіотерапевт запропонував юнакам відхилитися назад і дістати долонями підлогу. Яка зв'язка запобігає надмірному розгинанню хребтового стовпа?

Передня поздовжня
Жовта
Задня поздовжня
Надостьова
Міжпоперечна

Молода людина внаслідок активного підтягування на перекладині відчула різку біль у м'язах спини. При обстеженні спостерігається біль при спробах руху верхньою кінцівкою, обмеження таких функцій як приведення та пронація. Пошкодження якого м'язу відбулося вірогідніше всього?

M. latissimus dorsi
M. levator scapulae
M. romboideus major
M. trapezius
M. subscapularis

Після травми хворий не може утримувати тіло у вертикальному положенні, не може піднятися навшпиньки. Функція якого м'яза порушена?

M. triceps surae
M. tibialis anterior
M. extensor digitorum longus
M. fibularis longus
M. extensor hallucis longus

Параніхій мізинця ускладнився флегмоною кисті та передпліччя. Нагнійний процес поширився через:

Vagina synovialis communis mm.flexorum
Vagina tendinis m.flexor pollicis longi
Canalis carpalis
Vagina tendinis m.flexor carpi radialis
--

При огляді лікарем у хворого виявлена стегова кила. Через яке анатомічне утворення вона виходить під шкіру?

Hiatus saphenus
Anulus femoralis
Canalis adductorius
Lacuna musculorum
Anulus inguinalis superficialis

У юнака 18 років після вуличної бійки травмована бічна ділянка лиця. При огляді лікар встановив, що шкіра травмована, рана відкрита, гілка нижньої щелепи зламана, з жувальних м'язів залишився цілим тільки той, що не піднімає щелепу. Який це м'яз?

Бічний крилоподібний
Передні пучки скроневого
Середні пучки скроневого
Жувальний
Присередній крилоподібний

При обстеженні жінки виявили перелом однієї з кісток черепа, ускладнений кровотечею з поперечної пазухи твердої оболони мозку. Назвіть кістку, на якій розташовується борозна цієї пазухи:

Потилична
Тім'яна
Клиноподібна
Скронева
Лобова

У хворого коса пахвинна грижа. Яке анатомічне утворення стало слабким місцем передньої черевної стінки?

Латеральна пахвинна ямка
Надміхурова ямка
Стегнова ямка
Медіальна пахвинна ямка
Пахвинний трикутник

У травмованого перелом виличної дуги. Пацієнт скаржиться на неможливість зворотного руху нижньої щелепи яка зміщена вперед. Функція якого м'яза порушена?

M. temporalis
M. pterigoideus medialis
M. pterigoideus lateralis
M. zygomaticus minor
M. zygomaticus major

Хворий, 25 років, отримав травму скронево-нижньощелепного суглоба. Який м'яз прикріплюється до суглобового диска?

M. pterygoideus lateralis
M. temporalis
M. pterigoideus medialis
M. zygomaticus minor
M. zygomaticus major

Хворому 60 років, з пухлиною гортані показана ургентна операція – накладання трахеостоми (введення металевої трубки у трахею). Які м'язи повинен розсунути хірург при здійсненні операції?

Груднинно-під'язикові м'язи
Щелепно-під'язикові м'язи
Шило-під'язикові м'язи
Лопатково-під'язикові м'язи
-

Пацієнт звернувся до лікаря через нагноєння м'яких тканин орбіти. Крізь який анатомічний отвір гнійний процес може поширитися у середню черепну ямку?

Верхню очноямкову щілину
Вилично-очноямковий отвір
Передній решітчастий отвір
Нижню очноямкову щілину
Задній решітчастий отвір

Під час планового огляду дворічної дитини лікар виявив незакрите переднє тім'ячко. У який період життя дитини відбувається його закриття?

На другому році

В 1-2 місяці
У 3 місяці
На першому році
У 6-9 місяців

На рентгенограмі діагностовано перелом кісток черепа. Лінія перелому проходить через верхню каркову лінію. Яка кістка пошкоджена?

Потилична
Тім'яна
Клиноподібна
Скронева
Лобова

У постраждалого пошкоджена кам'яниста частина скроневої кістки. Лінія перелому пройшла позаду від внутрішнього слухового отвору. Який канал скроневої кістки був пошкоджений?

Лицевий
Сонний
Каналець барабанної струни
Барабанний
М'язово-трубний

У хворого діагностовано перелом вінцевого відростка нижньої щелепи зі зміщенням. Який м'яз змістить відросток?

Скроневий
Жувальний
Медіальний крилоподібний
Латеральний крилоподібний
-

Хірург прооперував пацієнта з приводу пахвинної грижі. Нижньою стінкою пахвинного каналу є пахвинна зв'язка. Апоневрозом якого м'язу живота вона утворена?

Зовнішнього косого
Внутрішнього косого
Прямого
Поперечного
-

Пацієнт звернувся до лікаря з приводу вивиху головки нижньої щелепи. До якого виду сполучення кісток належить даний суглоб?

Діартроз
Геміартроз
Синхондроз
Синостоз
Синдесмоз

У хворого діагностовано пошкодження міжхребцевого диска в поперековому відділі хребта. До якого виду сполучення кісток належить це з'єднання?

Геміартроз
Синхондроз
Синдесмоз
Синостоз
Діартроз