

1. В новонародженого маса правого і лівого шлуночків становить відповідно 38,6 і 29,9% від загальної маси серця. Чи буде змінюватися співвідношення між обома шлуночками до періоду статевого дозрівання?

- A. Так. Маса лівого шлуночка збільшиться в 2,5 рази, а правого - тільки в 0,5 рази.
- B. Немає. Обидва шлуночка будуть збільшуватися практично рівномірно.
- C. Так. Маса правого шлуночка збільшиться в 2,5 рази, лівого - тільки в 0.5 рази.
- D. Так. Маса лівого шлуночка збільшиться в 2,5 рази, правого - не зміниться.
- E. Так. Маса правого шлуночка збільшиться в 2,5 рази, лівого - не зміниться.

А. Так. Маса лівого шлуночка збільшиться в 2,5 рази, а правого - тільки в 0,5 рази.

2. Судово-медичний експерт при вивченні серця визначив, що у загиблого пошкоджена **вінцева пазуха** серця. Визначте **місце впадіння** пошкодженої анатомічної структури.

А. Праве передсердя

В. Нижня порожниста вена

С. Верхня порожниста вена

Д. Правий шлуночок

Е. Ліве передсердя

А. Праве передсердя

3. При УЗД серця виявлено що у дитини 2-х років дефект перетинчастої частини міжшлуночкової перетинки серця. Визначте, в якій ділянці міжшлуночкової перетинки він розташований?

- A. Верхньої
- B. Передньої
- C. Нижньої
- D. Середньої
- E. Задній

А. Верхньої

4. При УЗД вагітної в
серцево-судинній системі
плоду порушень не виявлено,
венозна протока функціонує.
Визначте, які судини вона
з'єднує?

- А. Пупкову вену з нижньою порожнистою веною
- В. Легеневий стовбур з аортою
- С. Легеневий стовбур з нижньою порожнистою веною
- Д. Пупкову вену з аортою
- Е. Пупкову вену з пупковою артерією

А. Пупкову вену з нижньою порожнистою веною

5. При УЗД вагітної в
серцево-судинній системі
плоду порушень не
виявлено, **артеріальна**
протока функціонує.
Визначте, які судини вона
з'єднує?

- А. Легеневий стовбур з аортою
- В. Легеневий стовбур з верхньою порожнистою веною
- С. Легеневий стовбур з нижньою порожнистою веною
- Д. Пупкову вену з аортою
- Е. Пупкову вену з пупковою артерією

А. Легеневий стовбур з аортою

6. Під час розтину порожнин
серця на внутрішній стінці були
виявлені **гребінчасті м'язи**. Які
відділи порожнин
розкриті?

А. Праве і ліве вушко

В. Правий і лівий шлуночок

С. Ліве вушко і лівий шлуночок

Д. Ліве передсердя і лівий шлуночок

Е. Праве передсердя і правий
шлуночок

А. Праве і ліве вушко

7. Звуження великої судини призвело до погіршення **відтоку** крові з **лівого шлуночка**. Яка судина зазнала патологічних змін?

А. Аорта

В. Нижняя порожниста вена

С. Легеневий стовбур

Д. Легенева вена

Е. Верхняя порожниста вена

A. Aорта

8. Підвищення кров'яного тиску в **аорті**, викликало навантаження на серцевий м'яз. М'язова стінка якої **камери серця** реагує на подразнення?

А. Лівого шлуночка

В. Лівого передсердя

С. Правого шлуночка

Д. Правого передсердя

Е. Венозний синус

А. Лівого шлуночка

9. Підвищення кров'яного тиску у великій судині, яка несе кров в легені, викликало навантаження на серцевий м'яз. М'язова стінка якої камери серця реагує на подразнення?

- A. Правого шлуночка
- B. Лівого шлуночка
- C. Правого передсердя
- D. Лівого передсердя
- E. Венозних синусів

А. Правого шлуночка

10. У хворого виявлена гіпертрофія **лівого шлуночка**. Звуження якого **отвору** серця могло привести до цієї патології?

А. Отвору аорти

В. Правого передсердно-шлуночкового отвору

С. Отвору легеневого стовбура

Д. Лівого передсердно-шлуночкового отвору

Е. Отвору верхньої порожнистої вени

А. Отвору аорти

11. У хворого діагностовано ураження стулок **правого передсердно-шлуночкового** клапана. В результаті запального процесу якої анатомічної структури серця відбулися **зміни стулок**?

А. Ендокарда

В. Фіброзного перикарда

С. Серозного перикарда

Д. Міокарда

Е. Епікарда

А. Эндокарда

12. При обстеженні підлітка, лікарем виявлена вроджена вада серця — функцінування боталової протоки.

Що з'єднує ця протока у внутрішньоутробному періоді розвитку?

- А. Легеневий стовбур та аорту
- В. Правий та лівий шлуночок
- С. Аорту та нижню порожнисту вену
- Д. Праве та ліве передсердя
- Е. Легеневий стовбур та верхню порожнисту вену

А. Легеневий стовбур та аорту

13. У хворого стеноз
легеневого стовбура. З якої
камери серця починається
дана судина?

- A. Ліве передсердя
- B. Вінцевий синус
- C. Лівий шлуночок
- D. Праве передсердя
- E. Правий шлуночок

Е. Правий шлуночок

14. У медико-генетичній консультації було проведено обстеження вагітної жінки (20-тижнева вагітність). На УЗД плід розвинутий нормально, у серцево-судинній системі відхилень від норми немає, **артеріальна** **протока** функціонує. Які судини плода вона з'єднує?

А. Легеневий стовбур з легеневими
венами

В. Аорту з нижньою порожнистою
веною

С. Аорту з верхньою порожнистою
веною

Д. Легеневий стовбур з аортою

Е. Легеневий стовбур з нижньою
порожнистою веною

Д. Легеневий стовбур з аортою

15. Хворому діагностовано
недостатність **мітрального**
клапана. Де даний клапан
розміщується?

- A. Між правим передсердям і правим шлуночком
- B. Між лівим і правим шлуночками
- C. В місці виходу аорти
- D. Між лівим передсердям і лівим шлуночком
- E. Між лівим і правим передсердями

D. Між лівим передсердям і лівим шлуночком

16. При обстеженні
дитини виявлено
незарощення
отвору. Де розміщений
даний отвір?

- A. В ділянці мітрального клапана
- B. Між лівим і правим передсердями
- C. Між лівим передсердям і лівим шлуночком
- D. Між правим передсердям і правим шлуночком
- E. Між лівим і правим шлуночками

В. Між лівим і правим передсерддями

17. Під час ультразвукового дослідження серця у дитини 1,5 років знайдено незарощення **овального отвору**, що підтверджено клінічно. У якому **відділі серця** розташований даний дефект?

А. Міжшлуночкова перетинка

В. Лівий передсердно-шлуночковий
клапан

С. Верхівка серця

Д. Міжпередсердна перетинка

Е. Правий передсердно-шлуночковий
клапан

D. Міжпередсердна перетинка

18. Підвищення артеріального кров'яного тиску в аорті спричиняє збільшення навантаження на серцевий м'яз. Міокард якої камери серця реагує на це подразнення насамперед?

A. Ventriculus sinister

B. Sinus coronarius

C. Ventriculus dexter

D. Atrium dextrum

E. Atrium sinistrum

A. Ventriculus sinister

19. Під час ультразвукового
обстеження серця лікар
спостерігає за стулками
мітрального клапана. Що
відбувається з ними при
систолі передсердь?

А. Вивертаються в порожнину шлуночка

В. Притискаються до стінок передсердя

С. Вивертаються в порожнину передсердя

Д. Стуляються, закриваючи просвіт отвору

Е. Притискаються до стінки судин

А. Вивертаються в порожнину
шлуночка

20. При аускультції лікар помітив у пацієнта функціональні порушення двостулкового [мітрального] клапана. В якому місці його вислуховував лікар?

- A. На верхівці серця
- B. У мечоподібного відростка
- C. У місці прикріплення реберного хряща праворуч
- D. У другому міжребер'ї зліва від груднини
- E. У другому міжребер'ї праворуч від груднини

А. На верхівці серця

21. При обстеженні у хворого **верхня межа** серця проектується на рівні других міжреберних проміжків. На якому **рівні** знаходиться ця межа у здорової людини?

A. III ребро

B. II ребро

C. I ребро

D. IV ребро

E. V ребро

A. III ребро

22. У хворого патологія
клапана аорти. В якій
точці грудної клітки
лікар вислуховує тони
цього клапана?

A. На 2 см праворуч від краю
груднини у другому міжребер'ї

B. Ліворуч біля основи
мечоподібного відростка

C. У п'ятому міжребер'ї

D. Праворуч біля основи
мечоподібного відростка

E. На 2 см ліворуч від краю
груднини у другому міжребер'ї

А. На 2 см праворуч
від краю груднини у
другому міжребер'ї

23. При гіпертонічній хворобі **ліва межа** серця зазвичай зміщена ліворуч. За рахунок якої **камери** серця це відбувається?

- A. Лівого шлуночка
- B. Лівого передсердя
- C. Правого шлуночка
- D. Правого передсердя
- E. Вушка правого передсердя

А. Лівого шлуночка

24. При обстеженні хворого виявлено, що **верхівковий поштовх** зміщений на 3,5 см ліворуч лівої середньоключичної лінії. Які камери серця при цьому гіпертрофовані?

А. Лівий шлуночок

В. Всі камери серця

С. Правий шлуночок

Д. Праве передсердя

Е. Ліве передсердя

А. Лівий шлуночок

25. У пацієнта, 25 років, на тлі
хронічного тонзиліту
розвинувся ревматизм і
діагностовано ураження
мітрального клапана. Де буде
вислуховуватися патологічний
шум при аускультації?

- A. На верхівці серця
- B. У VII міжребровому проміжку зліва від груднини
- C. У VII міжребровому проміжку праворуч від груднини
- D. У ділянці мечоподібного відростка груднини
- E. У VIII міжребровому проміжку праворуч від груднини

А. На верхівці серця

26. У хворого перикардит визначається накопиченням серозної рідини в **синусах перикардіальної порожнини**. Які синуси виділяють в нормі?

- A. Sinus transversus pericardii et sinus obliquus pericardii
- B. Sinus transversus et sinus verticalis
- C. Sinus dexter et sinus sinister pericardii
- D. Sinus transversus pericardii et sinus rectus
- E. Sinus obliquus pericardii et sinus superior

A. Sinus transversus pericardii et sinus obliquus pericardii

27. При аускультції серця
було встановлено роздвоєння
І тону в **V міжребровому**
просторі по
середньоключичній лінії.
Патологію якого **клапана**
вислухав лікар?

А. Тристулкового

В. Клапана легеневого стовбура

С. Клапана верхньої порожнистої
вени

Д. Двостулкового

Е. Клапана аорти

Д. ДВОСТУЛКОВОГО

28. При аускультації серця було встановлено роздвоєння І тону на основі мечоподібного відростка грудини. Патологію якого клапана вислухав лікар?

А. Клапана верхньої порожнистої
вени

В. Тристулкового

С. Клапана аорти

Д. Двостулкового

Е. Клапана легеневого стовбура

В. Тристулковского

29. При аускультації серця був визначений діастолічний шум в II міжреберному проміжку по правій пригруднинній лінії. Патологію якого клапана вислухав лікар?

А. Двостулкового

В. Клапана легеневого стовбура

С. Клапана верхньої порожнистої
вени

Д. Клапана аорти

Е. Тристулкового

D. Клапана аорти

30. При аускультації серця
був визначений систолічний
шум в II міжреберному
проміжку по лівій
пригруднинній лінії.
Патологію якого клапана
вислухав лікар?

А. Клапана аорти

В. Клапана верхньої порожнистої
вени

С. Двостулкового

Д. Тристулкового

Е. Клапана легеневого стовбура

Е. Клапана легеневого стовбура