

В результаті травми голови утворилася **гематома** з локалізацією в районі **середньої черепної ямки** зліва. Внаслідок цього на боці ураження виникло **розширення зіниці**. Який нерв перетиснуто гематомою?

A. n. abduceus

Б. n. oculomotorius

В. n. opticus

Г. n. trochlearis

Д. n. trigeminus

n. oculomotorius

При огляді хворого виявлено **східну косоокість, відхилення очного яблука досередини і неможливість відвести очне яблуко назовні**. Який нерв уражений?

А. Очний

Б. Відвідний

В. Окоруховий

Г. Блоковий

Д. Зоровий

Відвідний

Після черепно-мозкової травми жінці віком 45 років встановлено діагноз: **синдром верхньої очноямкової щілини**. Це симптомокомплекс, що виникає внаслідок ураження пар черепних нервів, які проходять через однойменну щілину. Які пари нервів уражено?

- N. olfactorius, n. opticus
- N. vestibulocochlearis, n. glossopharyngeus
- N. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens, r. ophthalmicus n. trigemini
- N. facialis, n. trochlearis, n. abducens
- N. vagus, n. accessorius, n. hypoglossus

N. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens,
r. ophthalmicus n. trigemini

Хворий скаржиться на **опущення верхньої повіки**, що
виникло внаслідок ураження одного з черепних нервів. Який нерв
уражений?

А. Окоруховий

Б. Відвідний

В. Блокової

Г. Зоровий

Д. Очний

Окоруховий

Хворий звернувся зі скаргами на порушення зору, що супроводжується **опущенням повіки**, неможливістю **повернути око вгору та досередини**. При огляді у хворого відмічено, що **око відведене назовні, зіниця розширена та не реагує на світло**, хворий **не бачить близько**. Який нерв ушкоджено?

А. Окоруховий

Б. Блоковий

В. Відвідний

Г. Зоровий

Д. Трійчастий

Окоруховий

Після перенесеного запального захворювання у хворого виникло **неповне відведення очного яблука вбік**. Який нерв у хворого пошкоджений?

А. Лицевий

Б. Окоруховий

В. Блоковий

Г. Зоровий

Д. Відвідний

Відвідний

При перевірці зіничного рефлексу у хворого спостерігаються **сповільнення реакції на світло** на лівому оці. Функція якого ядра порушена?

А. Додаткове ядро окорухового нерва

Б. Ядро блокового нерва

В. Ядро відвідного нерва

Г. Ядра верхніх горбиків покрівлі

Д. Ядро окорухового нерва

Додаткове ядро окорухового нерва

Хворому 60 років важко **формувати і рухати харчову грудку**, це порушує процес їжі. При цьому **язик нерухомий, мова стала неможливою**. Причиною цього могло стати порушення

- А. Під'язикового нерву
- Б. Додаткового нерву
- В. Язикоглоткового нерва
- Г. Трійчастого нерву
- Д. Лицевого нерву

Під'язикового нерву

При внутрішньомозковому крововиливі у хворого стала **невиразна мова**. Звукоутворення гортані й рухи нижньої щелепи збереглися. Ядра яких нервів уражені?

- A. nuclei n. hypoglossi
- Б. n. vagi nuclei
- В. nuclei n. accessorii
- Г. n. facialis
- Д. n. glossopharyngeus

- nuclei n. hypoglossi

При огляді хворого спостерігається атрофія
груднинно-ключично-соскоподібного і верхнього краю
трапецієподібного м'язів. Утруднений поворот голови в
протилежний бік. Який нерв уражений?

- А. Додатковий
- Б. Блукаючий
- В. Міжреберний
- Г. Плечове сплетення
- Д. Під'язиковий

Додатковий

Хворому на злоякісну **пухлину** **язика** хірург перев'язує **a. lingualis** у ділянці трикутника Пирогова. Водночас він особливу увагу звертає на:


- N. sublingualis
- N. glossopharyngeus
- N. lingualis
- Ansa cervicalis
- N. hypoglossus

N. hypoglossus


The patient has addressed to the ophthalmologist with complaints to a **blepharoptosis**. The tumor of a brain has been diagnosed during clinical examination. What is the cranial nerves nucleus struck with a pathological process?

- A. VII pair of CN.
- B. II pair of CN.
- C. IV pair of CN.
- D. VI pair of CN.
- E. III pair of CN.

III pair of CN.



Normal
eyelid



Falling of
the upper eyelid

The patient had **stable strabismus** of the **right eye**, ability to its **lateral abduction is lost** after a cerebral hemorrhage. What nucleus of a cranial nerve is damaged by hemorrhage?

- A. N. facialis dexter.
- B. N. abducens dexter.
- C. N. oculomotorius.
- D. N. abducens sinister.
- E. N. trochlearis.

N. abducens dexter.

Three-years-old child has entered a hospital with the diagnosis: a **divergent squint**. By damage of what nerves it is caused?

- A. Optic
- B. Trochlear
- C. Abducent
- D. Oculomotor
- E. Ophthalmic

- Oculomotor



The patient complains to difficulty **right upper arm rising above a horizontal level**. What nerve defeat does result to this?

- A. Left accessory nerve.
- B. Right accessory nerve.
- C. Greater pectoral.
- D. Lesser pectoral.
- E. Right vagus.

- Right accessory nerve.

14. The patient has deviation of tongue apex to the right. What cranial nerve motor innervation is broken in this case?

- A. N. hypoglossus dexter.
- B. N. glossopharyngeus dexter.
- C. N. vagus dexter.
- D. N. trigeminis sinister.
- E. N. facialis sinister.

- N. hypoglossus dexter.