

- У новонародженого хлопчика під час огляду калитки у правій половині **не виявлено яєчка**. Про яку аномалію розвитку йдеться?

- А. Епіспадію.
- В. Гермафродитизм.
- С. Крипторхізм.
- D. Гипоспадію
- Е. Монорхізм.

- Монорхізм.

- До лікаря звернувся чоловік 40 років зі скаргами на наявність хворобливої пухлини в ділянці калитки. Лікар поставив діагноз - **водянка яєчка**. Між якими оболонками яєчка накопичується рідина при цьому захворюванні?

- А. Між зовнішньою сім'яною фасцією і фасцією м'яза, що піднімає яєчко.
- В. Між шкірою і м'ясистою оболонкою.
- С. Між м'ясистою оболонкою і зовнішньою сім'яною фасцією.
- D. Між парієтальною і вісцеральною пластинками вагінальної оболонки.
- Е. Між внутрішньою сім'яною фасцією і вагінальною оболонкою.

- Між парієнтальною і вісцеральною пластинками вагінальної оболонки.

- У чоловіка 40 років запалення яєчка ускладнилося його **водянкою**. Необхідне оперативне втручання. Яку з оболонок яєчка останньою розкриває хірург під час операції?

- А. Внутрішню сім'яну фасцію.
- В. М'ясисту оболонку.
- С. Парієнтальний листок вагінальної оболонки яєчка.
- D. М'яз, що піднімає яєчко.
- Е. Зовнішню сім'яну фасцію.

- Парієнтальний листок вагінальної оболонки яєчка.

- У новонародженого хлопчика при огляді хірург не виявив ліве яєчко в калитці (монорхізм). В якому віці в нормі яєчко повинне знаходитися в мошонці?

- А. До одного року.
- В. На момент народження.
- С. До трьох років.
- D. До п'яти років.
- Е. До семи років.

- На момент народження.

- До лікаря - уролога на консультацію поступив хлопчик зі скаргами на припухлість у ділянці калитки. При огляді і пальпації виявлено **рідину навколо правого яєчка**. З чим пов'язана ця патологія?

- A. Незарощення верхньої ділянки піхвового відростка
- B. Крипторхізм
- C. Анорхізм
- D. Розширення поверхневого пахвинного кільця
- E. Незарощення глибокого кільця пахвинного каналу

- Незарощення верхньої ділянки піхвового відростка.

- Чоловік, 35 років, звернувся до лікаря зі скаргами на біль і припухлість правого яєчка. При обстеженні було виявлено пухлину, що потребує операції, при якій необхідно розсікати **7 шарів калитки** до білкової оболонки. Яка оболонка буде розсічена останньою перед білковою оболонкою?

- A Tunica dartos.
- B. Tunica spermatica externa.
- C. Tunica vaginalis testis.
- D. Tunica spermatica interna.
- E. Cutis orchis.

- Tunica vaginalis testis.

- У хлопчика спостерігається **калиткова грижа**. Вада розвитку якої з оболонок яєчка є причиною виникнення цієї грижі?

- A. Fascia spermatica interna.
- B. Fascia spermatica externa.
- C. Tunica vaginalis testis.
- D. Fascia cremasterica.
- E. Tunica dartos.

- Tunica vaginalis testis.

- У хворого діагностовано **водянку яєчка** — збільшення кількості рідини в серозній порожнині. Між якими оболонками яєчка локалізується патологічний вміст ?

- A. Між пристінковим і нутрощевим листками піхвової оболонки яєчка.
- B. Між шкірою і м'ясистю оболонкою.
- C. Між внутрішньою сім'яною фасцією і піхвовою оболонкою.
- D. Між м'ясистю оболонкою і внутрішньою сім'яною фасцією.
- E. Між шкірою і м'язом — підіймачем яєчка.

- Між пристінковим і нутрощевим листками піхвової оболонки яєчка.

- У хворого — лівобічне **варикоцеле** (варикозне розширення вен яєчка).
Порушення відтоку крові відбулося через:

- A. Vena testicularis sinistra.
- B. Vena testicularis dextra.
- C. Vena renalis sinistra.
- D. Vena renalis dextra.
- E. Vena ovarica.

Vena testicularis sinistra.

- Сімейна пара скаржиться на неможливість мати дітей. Після обстеження виявлено - у чоловіка пошкоджено сперматогенний епітелій яєчка, що призвело до **відсутності сперматозоїдів** у спермі як наслідок - до безпліддя. Який відділ сім'явивідних шляхів постраждав?

- А. Звивисті сім'яні каналці.
- В. Прямі сім'яні каналці.
- С. Сітка яєчка.
- D. Протоки придатка.
- Е. Сім'явивідна протока.

- Звивисті сім'яні каналці.

- Унаслідок травми яєчка, крововиливу у паренхіму, пошкоджено **звивисті сім'яні канальці**. Яка функція яєчка при цьому порушується?

- А. Ерекція статевого члена.
- В. Утворення статевих клітин.
- С. Проведення сперми.
- D. Утворення рідкої частини сперми.
- Е. Усе перераховане.

- Утворення статевих клітин.

- Віддаленими наслідками перенесеного гострого запалення **привушної слинної залози** у чоловіка може бути порушення функціонування епітеліальних клітин **звивистих сім'яних** трубочок чоловічих статевих залоз, яке призведе до зменшення утворення:

- Сперматозоїдів
- Оогоній
- Тестостерону
- Адренокортикотропного гормону
- Прогестерону

- Сперматозоїдів

- В спеціалізовану лікарню поступив чоловік, який побажав змінити стать. При обстеженні було виявлено **наявність чоловічих і жіночих залоз** при чоловічому типі будови зовнішніх статевих органів. Яка аномалія розвитку статевих органів у чоловіка?

А Справжній гермафродитизм

В Несправжній чоловічий гермафродитизм

С Несправжній жіночий гермафродитизм

Д Додатковий яєчник

Е Ектопія яєчка

- Справжній гермафродитизм

- Хворий скаржиться на **часте** й утруднене **сечовипускання**. Патологія якого внутрішнього статевого органа є причиною цього?

- А. Яєчка.
- В. Передміхурової залози.
- С. Цибулинно-сечівникових залоз.
- D. Над'яєчка.
- Е. Сім'яних пухирців.

- Передміхурової залози.

- У хлопчика 17 років у калитці міститься одне яєчко. Друге яєчко палькується у ділянці пахового каналу. Як називається така аномалія розвитку?

- А. Тріпорхізм.
- В. Біпорхізм.
- С. Анархізм.
- Д. Крипторхізм.
- Е. Монорхізм.

- Крипторхізм.

- У чоловіка 60 років при обстеженні виявлено, що закрилось ліве вічко протоки, що відкривається на сім'яному горбку, це ductus:

- A. Deferens.
- B. Excretorius.
- C. Epididymius.
- Д. Glandulae bulbouretralis.
- E. Ejaculatorius.

- Ejaculatorius.

- До лікаря - уролога звернулась мати хлопчика зі скаргами на відсутність правого яєчка в калитці. Пальпаторно **яєчко визначається біля поверхневого пахвинного кільця.** З якою вадою розвитку яєчка пов'язане таке явище?

- A. Retentio testis
- B. Ectopia testis pelvina
- C. Ectopia testis perinealis
- D. Ectopia testis femoris
- E. Inversio testis

- Retentio testis

- У новонародженої доношеної дитини чоловічої статі при обстеженні не було виявлено в калитці обох яєчок. Встановлено діагноз: "**Крипторхізм**". В якому віці в нормі у плоду повинні опуститися яєчка в калитку?

- А. Близько 8 місяця.
- В. До моменту народження.
- С. Після народження.
- D. До двох років життя дитини.
- E. До трьох років життя дитини.

- До моменту народження.

- У новонародженої дитини в області промежини виявлено **статевий прутень та піхву**. При додатковому обстеженні мало місце наявність яєчок та яєчників. Як називається даний вид аномалії розвитку статевої системи?

- А. Справжній гермафродитизм.
- В. Несправжній гермафродитизм.
- С. Гіпоспадія.
- D. Фімоz.
- Е. Епісподія.

- Справжній гермафродитизм.

- While performing a man's inguinal canal operation on account of hernia a surgeon damaged the canal's contents. What exactly was damaged?

- A. Lig. teres uteri
- B. Urachus
- C. Funiculus spermaticus
- D. Lig. inguinale
- E. Broad ligament of uterus

Funiculus spermaticus

- A patient complains of having urination disorder. He is diagnosed the **hypertrophy of prostate gland**. What part of gland is damaged?

- A. Base
- B. Left lobe
- C. Right lobe
- D. Median lobe
- E. Apex

Median lobe