

Поповнення тестових завдань з бази “Крок” та буклетів поточного року «Стоматологія»

1. Хірургу необхідно провести видалення частини травмованої ступні по лінії Лісфранкова суглоба. Яку зв'язку необхідно перетнути?

Таранно-човноподібна

П'ятково-човноподібна

Таранно-п'яткова

Медіальна міжкісткова заплесно-плеснова

Роздвоєна

2. У боксера після отриманої травми носа відзначається порушення нюху. Укажіть клітини, ушкодження яких може призвести до втрати нюху:

Нейросенсорні клітини

Підтримувальні епітеліоцити

Базальні епітеліоцити

Мікроворсинчасті епітеліоцити

Війчасті епітеліоцити

3. У хворого травматолог діагностував перелом кістки в ділянці іклової ямки. На якій кістці розташована дана ямка?

Нижня щелепа

Верхня щелепа

Лобова кістка

Піднебінна кістка

Вилична кістка

4. На рентгенограмі діагностовано перелом кісток черепа. Лінія перелому проходить через верхню каркову лінію. Яка кістка пошкоджена?

Потилична

Тім'яна

Скронева

Піднебінна

е. Лобова

5. При дослідженні хворого лікар визначив, що його язик не рухається вперед (не висувається з рота). Який м'яз пошкоджений?

Підборідно-язиковий

Поздовжній м'яз язика

Під'язиково-язиковий

Шило-під'язиковий

Поперечний м'яз язика

6. Який гормон навколоушних слинних залоз підсилює мінералізацію зубів шляхом стимуляції надходження кальцію у звапнені тканини?

Паротин

Глюкагон

Кальцитонін

Паратирин

Кортизол

7. Хірург пошкодив нерв, що іннервує щелепно-під'язиковий м'яз. Назвіть пошкоджений нерв:

N. glossopharyngeus

N. accessorius

N. trigeminus

N. hypoglossus

N. facialis

8. У новонародженої дитини щелепи добре розвинені та в кожній є зачатки молочних і постійних зубів. Скільки зачатків зубів у новонародженого в одній щелепі?

10 молочних та 10 постійних

20 молочних

10 молочних та 16 постійних

10 молочних та 8 постійних

20 молочних та 10 постійних

9. Хворого оперують з приводу травми скронево-нижньощелепного суглоба. Під час розсічення виявлена структура, що доповнює конгруентність суглобових поверхонь. Що це за структура?

Складка

Зв'язка

Меніск

Диск

Губа

10. При огляді плода спостерігається розщеплення верхньої губи. Поставте діагноз вродженої вади обличчя:

Палатосхізис

Хейлосхізис

Макростомія

Мікрогнатія

Гіпертелорізм

11. Під час огляду плода виявлено розщеплення твердого піднебіння. Встановіть імовірний діагноз вродженої вади обличчя.

Палатосхізис

Хейлосхізис

Макростомія

Мікрогнатія

Гіпертелорізм

12. У дитини травмована нижня губа. Який м'яз при цьому ушкоджений?

M. levator labii superioris

M. orbicularis oris

M. buccinator

M. risorius

M. levator anguli oris

13. У хворого при огляді порожнини рота встановлено різке почервоніння слизової оболонки кореня язика. Визначте, яке утворення залучене в запальний процес:

Піднебінна завіска

Глотковий мигдалик

Язиковий мигдалик

Трубний мигдалик

Піднебінний мигдалик

14. У хворого 12-ти років запальний процес у внутрішньому вусі викликав розлите ураження оболонок мозку. Лікар припустив, що процес розповсюдився через сполучення між субарахноїдальним простором головного мозку та перилімфатичним простором внутрішнього вуха. Через яке анатомічне утворення розповсюдилось запалення?

Aqueductus vestibuli

Fossa subarcuata

Hiatus canalis n. petrosi majoris

Hiatus canalis n. petrosi minoris

Fissura petrosquamosa

15. Під час огляду ротової порожнини у пацієнта спостерігається торкання різальних країв верхніх та нижніх різців. Для якого прикусу характерне таке розміщення зубів?

Прямий прикус

Закритий прикус

Прогенія

Ортогнатія

Біпрогнатія

16. Дитині 13-ти років видалили другий молочний великий кутній зуб. Який постійний зуб виросте на його місці?

Другий малий кутній зуб

Другий великий кутній зуб

Третій великий кутній зуб

Перший малий кутній зуб

Перший великий кутній зуб

17. При обстеженні хворої дитини лікар виявив часткову відсутність сосочків на бічній поверхні язика. Які це сосочки?

Листоподібні

Ниткоподібні

Грибоподібні

Конічні

Жолобуваті

18. До порушення якої функції призведе ураження груднинно-щитоподібного м'яза?

Опускання гортані

Розгинання шиї

Підняття гортані

Підняття під'язикової кістки

Нахилу шиї вперед

19. У потерпілого травмована верхня щелепа - вибитий перший малий корінний зуб. Який відросток верхньої щелепи пошкоджено?

Альвеолярний

Виличний

Очноямковий

Піднебінний

Лобовий

20. У пацієнта віком 59 років діагностована хорея, яка проявляється мимовільними швидкими рухами, що супроводжуються гримасами. Із ушкодженням якої структури мозку пов'язують виникнення хореї?

Смугастого тіла (стріатум)

Ядра Даркшевича

Мигдалеподібного тіла (мигдалина)

Огорожі

Таламуса

21. У пацієнта має місце пошкодження волокон дев'ятої пари черепних нервів (язикоглотковий). Формування якого відчуття буде порушено?

Гірке

Солодке

Солоне

Усіх смакових відчуттів

Кисле

22. У пацієнта після екстракції 7 верхнього зуба в лунці з'явилося повітря. Стінка якої приносової пазухи найімовірніше пошкоджена у цьому разі?

Гайморової пазухи

Клиноподібної пазухи

Середні комірки решітчастої пазухи

Задні комірки решітчастої пазухи

Лобової пазухи

23. Під час огляду порожнини рота лікар-стоматолог виявив наявність запалення тканин, які оточують зуб. Запалення якого анатомічного утворення виявив лікар?

Paradontium

Alveola dentalis

Gingiva

Cementum

24. Під час стану емоційного напруження у людини з'явилися поперечні зморшки на лобі посередині. Скорочення якого м'яза відбулося?

M. occipitofrontalis

M. temporoparietalis

M. procerus

M. auricularis anterior

M. corrugator supercilii

25. Нормальну оклюзію зубних дуг можна посилити, відтягнувши нижню щелепу назад. Який м'яз виконує цю функцію?

Скроневий

Медіальний крилоподібний

Латеральний крилоподібний

Жувальний

Груднинно-ключично-соскоподібний

26. На поверхні коронки другого великого кутнього зуба, яка контактує з щогою, лікар виявив каріозну порожнину. Як називається вражена поверхня коронки?

Facies vestibularis

Facies mesialis

Facies lingualis

Facies distalis

Facies occlusalis

27. У пацієнта пухлина лівої половини довгастого мозку. Під час обстеження виявлено, що м'яке піднебіння на стороні ураження провисає, глотковий рефлекс знижений, язичок відхиляється у здоровий бік під час вимови звуку "а", також спостерігається осиплість голосу. Функція яких нервів імовірно порушиться через пухлину?

Язикоглоткового та блукаючого

Язикоглоткового та лицевого

Додаткового та під'язикового

Язикоглоткового та додаткового

Блукаючого та додаткового

28. У хворого спостерігається запальний процес нижньої стінки очної ямки. Крізь яке анатомічне утворення можливо розповсюдження запального процесу до крило-піднебінної ямки?

Нижня очноямкова щілина

Надочноямкова вирізка

Верхня очноямкова щілина

Зоровий канал

Задні решітчасті отвори

29. При огляді ротової порожнини стоматолог виявив появу у дитини перших великих верхніх кутніх зубів. Який вік дитини?

6-7 років

12-13 років

8-9 років

4-5 років

10-11 років

30. Під час операції на органах черевної порожнини у пацієнта відбулася рефлекторна зупинка серця. Укажіть місце розташування центру цього рефлексу?

У довгастому мозку

У спинному мозку

У корі великих півкуль

У середньому мозку

У проміжному мозку

31. Під час дослідження кровотоку в судинах головного мозку лікар встановлює датчик над артерією, що проходить у поперечних отворах шийних хребців. Яку артерію обстежує лікар?

A. vertebralis

A. basilaris

- A. carotis interna
- A. cerebri anterior
- A. carotis externa

32. У постраждалого пошкоджена кам'яниста частина скроневої кістки. Лінія перелому пройшла позаду від внутрішнього слухового отвору. Який канал скроневої кістки був пошкоджений?

- a. Барабанний
- b. Каналець барабанної струни
- c. *Лицевий*
- d. Сонний
- e. М'язово-трубний

33. Педіатр, оглядаючи однорічну дитину, виявив в порожнині рота 4 зуба. Вкажіть, яку кількість молочних зубів повинна мати дитина цього віку:

8

- 14
- 20
- 12
- 10

34. Пацієнтка віком 36 років звернулася до лікаря-стоматолога із приводу набряку під правим оком. Після обстеження встановлено діагноз: флегмона підочном'якової ділянки. Від яких зубів інфекція найчастіше поширюється в цю ділянку обличчя?

Другого премоляра та першого моляра

Верхнього ікла й першого премоляра

Верхніх першого та другого молярів

Верхнього присереднього різця

Верхніх бічних та присередніх різців

35. Жінка скаржиться на біль у лівій половині нижньої щелепи та нижніх зубів. Ураження яких нервів є найімовірнішою причиною таких симптомів?

- a. Рухових волокон третьої гілки V пари черепних нервів
- b. Першої гілки V пари черепних нервів
- c. Другої гілки V пари черепних нервів
- d. VII пари черепних нервів
- e. *Чутливих волокон третьої гілки V пари черепних нервів*

36. Внаслідок гнійного отитугноєм зруйновано верхню стінку барабанної порожнини. У яку ямку черепа розповсюдився гній з барабанної порожнини?

Середня черепна

Крило-піднебінна

Передня черепна

Очна

Задня черепна

37. Під час планового огляду дворічної дитини лікар виявив незакрите переднє тім'ячко. У який період життя дитини відбувається його закриття?

У 6-9 місяців

На другому році

В 1-2 місяці

У 3 місяці

На першому році

38. Під час огляду порожнини рота на губній та язиковій поверхні зубів знайдено темно-жовті та коричневі плями, які вкривають більше ніж половину поверхні зубів; емаль та дентин зруйновані. Який із наведених діагнозів найімовірніший?

Ерозія зубів

Клиноподібні дефекти

Глибокий карієс

Флюороз

Карієс емалі

39. При обстеженні хворого виявлено зниження секреторної функції залоз носової порожнини. Який нерв забезпечує парасимпатичну іннервацію даних залоз?

N. maxillaris

N. petrosus major

N. petrosus minor

N. chorda tympani

N. petrosus profundus

40. Під час огляду пацієнта виявлено перелом латеральної кістки передпліччя в середній третині. Частина якої кістки передпліччя травмована?

Епіфіз променевої кістки

Метафіз ліктьової кістки

Діафіз променевої кістки

Епіфіз ліктьової кістки

Діафіз ліктьової кістки

41. До лікаря-невролога звернулася пацієнтка віком 52 роки зі скаргами на втрату чутливості шкіри правої половини обличчя в ділянці нижньої повіки, спинки носа та верхньої губи. Гілка якого нерва ушкоджена у цієї пацієнтки?

Очний нерв трійчастого нерва

Великий кам'янистий нерв лицевого нерва

Нижньощелепний нерв трійчастого нерва

Барабанна струна лицевого нерва

Верхньощелепний нерв трійчастого нерва

42. У пацієнта, якому видалено другий великий кутній зуб нижньої щелепи, спостерігається коміркова кровотеча. Яка артерія є джерелом кровотечі?

Верхньощелепна

Висхідна глоткова

Очна

Язикова

Лицева

43. У хворого порушено процес акомодатії ока. Який м'яз пошкоджений?

Musculus dilatator pupillae

Musculus rectus superior

Musculus rectus inferior

Musculus ciliaris

Musculus sphincter pupillae

44. Важливим топографічним орієнтиром тіла людини є реберна дуга. Хрящами яких ребер вона утворена?

З 1 по 7

З 7 по 10

З 1 по 12

З 11 по 12

Тільки 12

45. У хворого діагностовано пошкодження міжхребцевого диска в поперековому відділі хребта. До якого виду сполучення кісток належить це з'єднання?

Синхондроз

Синдесмоз

Геміартроз

Діартроз

Синостоз

46. На розтині померлого після абдомінальної операції у венах малого тазу були знайдені численні тромби. Клінічно був зафіксований тромбоемболічний синдром. Де слід шукати ембол?

Легеневі артерії

Вени нижніх кінцівок

Головний мозок

Портальна вена

Лівий шлуночок серця

47. Внаслідок хондродисплазії (аномалія розвитку хряща) пошкоджено волокнистий хрящ. Де можливо спостерігати патологічні зміни?

У міжхребцевих дисках

У вушній мушлі

У трахеї

У гортані

У бронхах

48. У постраждалого з травмою основи черепа встановлене пошкодження гачкоподібного відростка присередньої пластинки крилоподібного відростка клиноподібної кістки. Функція якого м'яза м'якого піднебіння буде порушена?

Напрягача піднебінної завіски

Піднебінно-язикового

Піднебінно-глоткового

М'яза язичка

Підіймача піднебінної завіски

49. Лікар спостерігає одностороннє порушення слюзовиділення, що пов'язано з подразненням однієї з гілок VII пари черепних нервів. Подразнення якої гілки цього нерва має місце?

N. stapedius

Chorda tympani

N. petrosus major

N. auricularis posterior

R. colli

50. У хворого при обстеженні виявлено зміну секреторної функції привушної залози, що пов'язано з патологією нерва, що несе від вушного вузла до залози післявузлові парасимпатичні волокна. Який це нерв?

N. facialis

N. auriculotemporalis

N. lingualis

N. buccalis

N. petrosus major

51. У людини зуби закріплені в особливих комірках верхньої та нижньої щелеп. До якої системи відносять зуби людини?

Гетеродонтної

Акродонтної

Гомодонтної

Плевродонтної

Текодонтної

52. Для уточнення діагнозу хворому 15-ти років потрібно зробити сіалографію привушної залози. Де розташований отвір, крізь який буде введена рентгенконтрастна маса?

На щоглі в ділянці навпроти 2-го верхнього великого кутнього зуба

На щоглі в ділянці навпроти 2-го нижнього великого кутнього зуба

На щоглі в ділянці навпроти 2-го нижнього малого кутнього зуба

На щоглі в ділянці навпроти 2-го верхнього малого кутнього зуба

-

53. Хворому на злоякісну пухлину язика хірург перев'язує а. lingualis у ділянці трикутника Пирогова. Водночас він особливу увагу звертає на:

N. sublingualis

N. glossopharyngeus

N. lingualis

Ansa cervicalis

N. hypoglossus

54. Лікар виявив у пацієнта запалення слизової оболонки ротової порожнини, яке супроводжувалося нестерпним болем. З ураженням якого нерва це пов'язано?

Барабанної струни

Блукаючого

Лицьового

Язикоглоткового

Трійчастого

55. В лікарню надійшов пацієнт з травмою голови. Діагностовано перелом клиноподібної кістки у ділянці основи крилоподібного відростка. Вміст якого з названих каналів може бути пошкоджено?

Лицевий

М'язовотрубний

Крилоподібний

Сонний

Барабанний

56. У хворого ножове проникне поранення діафрагми рота. Який м'яз треба ушити при цьому пораненні, щоб відновити цілісність дна ротової порожнини?

M. stylohyoideus

M. platysma

M. mylohyoideus

M. omohyoideus

M. sternocleidomastoideus

57. У жінки діагностоване запалення жирової клітковини між листками широкої зв'язки матки. Укажіть це анатомічне утворення.

Ендоетрій

Периметрій

Міометрій

Мезометрій

Параметрій

58. Під час рентгенологічного дослідження грудної клітки в пацієнта діагностовано діафрагмову килу, що розташована в задньому середостінні. За рахунок якого слабкого місця діафрагми утворилася ця кила?

Попереково-ребрового трикутника

Груднинно-ребрового трикутника

Присередньої та латеральної дугоподібної зв'язок

Сухожилкового центру

Отвору нижньої порожнистої вени

59. При виконанні оперативного втручання на діафрагмі ротової порожнини хірургу необхідно виділити ділянку, що має назву "піднижньощелепний трикутник". Який з м'язів його обмежує?

M. stylohyoideus

M. geniohyoideus

M. hyoglossus

M. digastricus

--

60. Під час обстеження пацієнта у відділенні щелепно-лицевої хірургії лікар вивчає контрфорси верхньої щелепи. Скільки основних контрфорсів вона має?

4

6

3

5

2

62. У пацієнта хронічний неврит трійчастого нерва. Який із травних процесів буде порушено найбільше у цьому разі?

Формування смакових відчуттів

Слиновиділення

Слиноутворення

Жування

Ковтання

63. Жінка звернулася до лікаря зі скаргами на порушення смакової чутливості язика. Пошкодження якого ядра довгастого мозку могло викликати ці розлади?

Дорсальне ядро блукаючого нерва

Під'язикового нерва

Подвійне

Поодиноке

Нижнього слиновидільного

64. Пацієнт звернувся до ортопеда-стоматолога з приводу протезування зубів. Лікар визначив, що протезування потребують зуби, які не мають додаткових антагоністів. Назвіть ці зуби:

Нижні перші моляри

Верхні другі моляри

Нижні другі премоляри

Нижні другі моляри

Верхні треті моляри

65. Під час сальпінгоотита спостерігається втягнення барабанної перетинки. Рукоятка однієї зі слухових кісточок, яка пов'язана з membrana tympani, набуває більш горизонтального положення. Положення якої кісточки визначає лікар під час обстеження?

Incus

Processus mastoideus

Malleus

Squama os temporale

Stapes

68. Вегетативні ефекти подразнення черепно-мозкового нерва виявлено в гортані, стравоході, серці, шлунку, кишечнику та травних залозах. Ядро якого нерва подразнено?

Лицьового

Під'язичного

Блукаючого

Язикоглоточного

Додаткового

