



- ▶ Хвору, 28 років, було доставлено в гінекологічне відділення зі скаргами на біль у ділянці живота. Клінічно виявлено пухлину яєчника і показана операція з його видалення. При її виконанні необхідно розсікати зв'язку, що з'єднує яєчник з маткою. Яку зв'язку повинен перерізати хірург?

- ▶ A. Lig. ovarii proprium.
 - ▶ B. Lig. latum uteri.
 - ▶ C. Lig. cardinali.
 - ▶ D. Lig.umbilicale laterale.
 - ▶ E. Lig. suspensorium ovarii.
- 

- ▶ A. Lig. ovarii proprium.

- ▶ Під час гінекологічного обстеження пацієнтці було виставлено діагноз: **ендометрит** (запалення ендометрія). Яка частина маткової стінки уражена запальним процесом?

- ▶ А. Слизова оболонка.
 - ▶ В. Серозна оболонка.
 - ▶ С. М'язова оболонка.
 - ▶ D. Адвентиційна оболонка.
 - ▶ Е. Навколоматкова клітковина.
- 

- ▶ Слизова оболонка.

- ▶ У наслідок поранення у постраждалої виявлено пошкодження **передньої частини матки** anteversio. Яка частина матки ушкоджена?

- A. corpus.
- B. isthmus.
- C. portio vaginalis cervix uteri.
- Д. fundus.
- E. portio supravaginalis cervix uteri

▶ corpus.


- ▶ При обстеженні зовнішніх статевих органів у жінки гінеколог поставив діагноз: **бартолініт** (запалення бартолінових залоз). Про патологію якого анатомічного утворення йдеться?

- ▶ А. Малі присінкові залози.
- ▶ В. Цибулина присінку.
- ▶ С. Велика залоза присінку.
- ▶ D. Залози сечівника.
- ▶ Е. Лакуни сечівника.

Велика залоза присінку.



- ▶ У маленької дівчинки було діагностовано запалення порожнини очеревини в ділянці малого тазу (**пельвіоперитоніт**). Через яке анатомічне утворення інфекційний агент потрапив із зовнішнього середовища до місця запалення?

- ▶ A. Ostium vaginae.
 - ▶ B. Ostium urethrae externum.
 - ▶ C. Ostium urethrae internum.
 - ▶ D. Ductuli glandulae vestibularis major.
 - ▶ E. Canalis analis.
- 

Ostium vaginae



- ▶ У гінекологічне відділення потрапила хвора з підозрою на внутрішню кровотечу [позаматкова вагітність]. Через яке утворення проводять пункцію для термінового діагностування кровотечі ?

- ▶ А. Матковий зів.
- ▶ В. Переднє склепіння піхви.
- ▶ С. Шийку матки.
- ▶ D. Заднє склепіння піхви.
- ▶ Е. Передню стінку піхви.

Заднє склепіння піхви



- ▶ У жінки з позаматковою трубною вагітністю проведено пункцію **заднього склепіння піхви**. В яке анатомічне утворення очеревини повинна проникнути голка?

- ▶ А. Лівий брижовий синус.
- ▶ В. Правий брижовий синус.
- ▶ С. Прямокишково–маткове заглиблення.
- ▶ D. Правий бічний канал.
- ▶ Е. Міхурно–маткове заглиблення.

- ▶ Прямокишково–маткове заглиблення.

- ▶ До спеціалізованої клініки потрапив пацієнт, який зажадав змінити стать. Під час обстеження було виявлено наявність **чоловічих і жіночих статевих залоз** при чоловічому типові будови зовнішніх статевих органів. Який вид аномалії розвитку статевих органів зафіксовано у пацієнта?

- ▶ А. Додатковий яєчник.
- ▶ В. Чоловічий несправжній гермафродитизм.
- ▶ С. Жіночий несправжній гермафродитизм.
- ▶ D. Справжній гермафродитизм.
- ▶ Е. Ектопія яєчка.


- ▶ Справжній гермафродитизм.

- ▶ Хвора 23 років потрапила до гінекологічного відділення зі скаргами на масивний набряк малих статевих губ і **гнійні виділення** біля їх основи **у присінку піхви** ближче до задньої спайки. Про запалення яких залоз статевих органів слід думати:

- A. Великі присінкові (Бартолінові).
- B. Бульбоуретральні (Купера).
- C. Передміхурові.
- D. Малі присінкові.
- E. Цервикальні.


- ▶ Великі присінкові (Бартолінові).

- ▶ Після травматичного **ураження промежини** у потерпілого через деякий час спостерігаються явища **імпотенції**. Який м'яз було травмовано?

- ▶ А. М'яз–підіймач ануса.
 - ▶ В. Внутрішній стискач сечівника.
 - ▶ С. Зовнішній стискач сечівника.
 - ▶ D. Цибулинно–губчастий.
 - ▶ Е. Сідничо–печеристий.
- 

- ▶ Сідничо-печеристий.

- ▶ Ультразвукове дослідження органів малого тазу здійснюється при наповненому сечовому міхурі. Який м'яз промежини утримує при цьому сечу?

- ▶ А. Цибулинно-губчастий.
 - ▶ В. Сфінктер сечівника.
 - ▶ С. Сідничо-печеристий.
 - ▶ D. Поверхневий поперечний.
 - ▶ Е. Глибокий поперечний.
- 


- ▶ Сфінктер сечівника.

- ▶ Під час пологової діяльності при важкому прорізуванні голівки плода, щоб уникнути розриву промежини проводять **розтин отвору піхви** в основі великої статевої губи. Який м'яз промежини при цьому розтинають?

- ▶ А. Поверхневий поперечний.
- ▶ В. Сідничо– печеристий.
- ▶ С. Цибулинно–губчастий.
- ▶ D. Зовнішній сфінктер прямої кишки.
- ▶ Е. Глибокий поперечний.

Цибулинно-губчастий

- ▶ У хворої запалення **бульбоуретральних залоз**. Між якими фасціями промежини знаходяться ці органи?

- ▶ A. Fasciae diaphragmatis pelvis inferior et superior.
 - ▶ B. Fasciae perinei superficialis et diaphragmatic urogenitalis inferior.
 - ▶ C. Fasciae diaphragmatis urogenitalis superior et diaphragmatis pelvis inferior.
 - ▶ D. Fasciae diaphragmatis urogenitalis superior et inferior.
- 

- ▶ Fasciae diaphragmatis urogenitalis superior et inferior.

A patient was diagnosed with **bartholinitis** (inflammation of greater vulvovaginal glands). In which organ of urogenital system are these glands localized?



- ▶ A. Clitoris
- ▶ B. Small lips of pudendum
- ▶ C. Large lips of pudendum
- ▶ D. Vagina
- ▶ E. Uterus

Large lips of pudendum

While performing a woman's **inguinal canal** operation because of **hernia** a surgeon damaged the canal's contents. What exactly was damaged?

- ▶ A. Lig. inguinale
- ▶ B. Urachus
- ▶ C. Funiculus spermaticus
- ▶ D. Lig. teres uteri
- ▶ E. Broad ligament of uterus

Lig. teres uteri