

Стоматолог при огляді ротової порожнини дитини виявив **коротку вуздечку верхньої губи**. На які **зуби** впливає ця аномалія розвитку?



- ▶ А. медіальні верхні різці;
- ▶ В. медіальні нижні різці;
- ▶ С. латеральні верхні різці;
- ▶ D. латеральні нижні різці;
- ▶ Е. верхні ікла.

А. Медіальні верхні різці.



-
- ▶ Мати звернулася до педіатра. Хвора дівчинка **6 міс.** з високою температурою, плаче, запихає іграшки до рота. Який **зуб** прорізується?



-
- ▶ А. присередній нижній різець;
 - ▶ В. бічний нижній різець;
 - ▶ С. присередній верхній різець;
 - ▶ D. бічний верхній різець;
 - ▶ Е. нижній кутній зуб.



Присередній нижній різець.



-
- ▶ Мати звернулася до педіатра за допомогою. Хвора дівчинка **9 міс.** з високою температурою, плаче, запихає іграшки до роту. Який зуб прорізується?



-
- ▶ А. бічний нижній різець;
 - ▶ В. присередній нижній різець;
 - ▶ С. малий кутній зуб;
 - ▶ D. ікло;
 - ▶ Е. нижній кутній зуб.



► Бічний нижній різець.



- ▶ Мати звернулася по допомогу до педіатра. Хворий хлопчик 12 міс. з високою температурою, плаче, запихає іграшки до рота. Який зуб прорізується?



-
- ▶ А. Нижній перший великий кутній зуб;
 - ▶ В. Присередній нижній різець;
 - ▶ С. Ікло;
 - ▶ D. Малий кутній зуб;
 - ▶ Е. Нижній другій великий кутній зуб;



-
- ▶ нижній перший великий кутній зуб.



- ▶ Мати звернулася до педіатра за допомогою. Хвора дівчинка 20 міс. з високою температурою, плаче, кусає іграшки. Який зуб прорізується?



-
- ▶ А. Перший верхній великий кутній зуб;
 - ▶ В. Присередній нижній різець;
 - ▶ С. Малий кутній зуб;
 - ▶ D. Ікло;
 - ▶ Е. Нижній другий великий кутній зуб.



-
- ▶ Нижній другий великий кутній зуб.



-
- ▶ При огляді дівчинки **18 міс.** лікар відмітив припухлість ясен. Дівчинка з високою температурою, плаче, запихає іграшки до рота іграшки. Який **зуб** прорізується в цьому віці?



-
- ▶ А. нижнє ікло;
 - ▶ В. присередній нижній різець;
 - ▶ С. верхнє ікло;
 - ▶ D. нижній другій великий кутній зуб;
 - ▶ Е. малий кутній зуб.



► верхнє ікло.



-
- ▶ Мати звернулася до педіатра за допомогою. Хвора дівчинка **13 міс.** з високою температурою, плаче, кусає іграшки. Який **зуб** прорізується в цьому віці?



- ▶ А. верхнє ікло;
- ▶ В. нижнє ікло;
- ▶ С. верхній другій великий кутній зуб;
- ▶ D. нижній другий великий кутній зуб;
- ▶ Е. перший нижній великий кутній зуб.



► Перший нижній великий кутній зуб.



- ▶ При огляді ротової порожнини стоматолог виявив, що у дитини з'явилися перші великі нижні корінні зуби. Який вік дитини?



-
- ▶ A. 6- 7 років.
 - ▶ B. 5-6 років.
 - ▶ C. 8-9 років.
 - ▶ D. 10-11 років.
 - ▶ E. 12-13 років.



► 6- 7 років.



- ▶ Мати звернулася до педіатра за допомогою. Хвора дівчинка **19 міс.** з високою температурою, плаче, кусає іграшки. Який **зуб** прорізується в цьому віці?



-
- ▶ А. верхнє ікло;
 - ▶ В. нижнє ікло;
 - ▶ С. верхній другій великий кутній зуб;
 - ▶ нижній другий великий кутній зуб;
 - ▶ Е. перший нижній великий кутній зуб;



▶ верхнє ікло.



У стоматологічну поліклініку звернувся хворий з запаленням **комірки коміркового відростка** верхньої щелепи. Яка **тканина зуба** постраждає при цьому захворюванні у першу чергу?



А. Дентин.

В. Эмаль.

С. Цемент.

Д. Пульпа зуба.

Е. Коронка зуба.



А. Цемент.



Студент на занятті записує порядок розташування зубів у зубних рядах формулою, у якій кожна цифра позначає номер зуба. Скільки зубів у зубній дузі, починаючи від серединної вертикальної лінії з кожного боку у дитини 5 років?



A. 5.

B. 6.

C. 8.

D. 16.

E. 32.



A.5.



Під час лікування жінки 30 років, стоматолог ретельно оглянув всі **поверхні зубів**. Зуб має всі поверхні, крім?



A. Distalis.

B. Lingualis.

C. Vestibularis.

D. Mesialis.

E. Proximalis



E. Proximalis



Пацієнту діагностовано пульпіт. Що входить до складу пульпи?



- А. Дентин, пухка сполучна тканина.
- В. Судини і нерви.
- С. Дентин, судини і нерви.
- Д. Пухка сполучна тканина, дентин і нерви.
- Е. Пухка сполучна тканина, судини і нерви.



Е. Пухка сполучна тканина, судини і нерви



При огляді порожнини рота дитини педіатр
знайшла **8 різців**. Розвиток дитини відповідає віковій
нормі. Визначте вік дитини:



A. 10-12 місяців

B. 6-7 місяців

C. 7-8 місяців

D. 12-15 місяців

E. 16-20 місяців



A. 10-12 місяців



Dentist at examination of oral cavity of child found out the short bridle of upper lip. On what teeth will render the negative consequences this anomaly of development?



-
- ▶ A. Medial upper incisors
 - ▶ B. Lateral upper incisors
 - ▶ C. Lateral lower incisors
 - ▶ D. Medial lower incisors
 - ▶ E. Upper canines

Medial upper incisors

A tooth in which lingual surface less than a cheek is remote in a patient. Masticatory surface in the form of oval. A deep transversal fissure divides cheek and language tubercles. A root is strongly constrained in mesio-distal direction with longitudinal fissures on aproximal surfaces and bifurcated. Define what tooth is this.

-
- ▶ A. First upper premolar
 - ▶ B. Upper canine
 - ▶ C. Lower canine
 - ▶ D. First lower premolar
 - ▶ E. Second upper premolar

First upper premolar