


- ▶ Пацієнт помилково випив розчин оцтової кислоти. Яка оболонка стравоходу зазнала найбільших пошкоджень?

- ▶ А. слизова
 - ▶ В. м'язова
 - ▶ С. серозна
 - ▶ D. еластична мембрана
 - ▶ Е. м'язова і серозна
- 

► **Слизова**

- ▶ У дітей часто можна спостерігати затруднене носове дихання, яке пов'язане з надмірним розвитком лімфоїдної тканини слизової оболонки **глотки**. Розростання яких мигдаликів може спричинити це явище?

- ▶ A. Tonsilla pharyngea
- ▶ B. Tonsilla palatina
- ▶ C. Tonsilla lingualis
- ▶ D. Tonsilla tubaria
- ▶ E. Усіх названих мигдаликів

▶ **Tonsilla pharyngea**

- ▶ Неефективність ортодонтичного лікування дитини зумовлена стійким **ротовим диханням**. Носове дихання утруднене за рахунок **гіпертрофії мигдаликів**:

- ▶ А.Трубних
- ▶ В.Глоткового
- ▶ С.Язикового
- ▶ Д.Піднебінних
- ▶ Е.Піднебінних і трубних

► **Глоткового**

- ▶ Мати немовляти скаржитися на постійне зригування неперетравленого молока її дитиною. Про який дефект розвитку свідчить цей факт?

- ▶ А. Атрєзія стравоходу
- ▶ В. Заяча губа
- ▶ С. Вовча паща
- ▶ D. Атрєзія анального отвору
- ▶ Е. Нориця стравоходу


▶ **Атрезія стравоходу**

- ▶ Під час рентгенологічного обстеження шлунка хворого 35 років у вертикальному положенні лікар констатує наявність повітря. В якій частині шлунка воно знаходиться?

- ▶ А. Дні.
- ▶ В. Тілі.
- ▶ С. Кардіальній.
- ▶ D. Пілоричній
- ▶ Е. Ділянці малої кривизни.

Дні.


- ▶ У хворого 22-х років під час операції виявлений **наскрізний отвір** діаметром 3 мм на **передній стінці шлунка** в середній третині, ближче до малої кривизни. Яка частина шлунка ймовірноше всього уражена?

- ▶ A. Corpus
 - ▶ B. Fundus
 - ▶ C. Pars cardiaca
 - ▶ D. Pars pylorica
 - ▶ E. Antrum pyloricum
- 

Corpus




- ▶ Хворий 18 років, звернувся до лікарні із скаргами на шум та больові відчуття у вусі. Об'єктивно – у хворого гостре респіраторне захворювання, риніт. Крізь який **отвір глотки** інфекція потрапила до **барабанної порожнини** та викликала її запалення?


- ▶ А. Барабанний отвір слухової труби
 - ▶ В. Глотковий отвір слухової труби
 - ▶ С. Хоани
 - ▶ D. Зів
 - ▶ Е. Вхід до гортані
- 

Глотковий отвір слухової труби



Під час огляду хлопчика 5 років, лікар відмітив, що дитина дихає через рот. За допомогою додаткових методів дослідження було встановлено **збільшення розмірів** одного з **мигдаликів** лімфоепітеліального глоткового кільця. Який це мигдалик?




- ▶ А. Глотковий
 - ▶ В. Язиковий
 - ▶ С. Трубний
 - ▶ D. Піднебінний
 - ▶ Е. Гортанний
- 

Глотковый




У дитини 8-и років на рівні 10 грудного хребця рентгеноскопично виявлено чужорідне тіло стравоходу. В ділянці якого стравохідного звуження зупинилось чужорідне тіло?

- ▶ А. Аортальне звуження
 - ▶ В. Глоткове звуження
 - ▶ С. Бронхіальне звуження
 - ▶ D. Діафрагмове звуження
 - ▶ Е. Абдомінальне звуження
- 

Діафрагмове звуження



У приймальне відділення лікарні доставили дитину зі скаргами на біль за грудниною, що з'являється після ковтання та супроводжується кашлем. При рентгенологічному дослідженні виявлено **стороннє тіло** в товщі стінки стравоходу на рівні **4 грудного хребця**. У ділянці якого звуження стравоходу сталося пошкодження його стінки?




- ▶ А. У місці проходження крізь діафрагму.
- ▶ В. У місці перехрещення з лівим головним бронхом.
- ▶ С. У місці прилягання дуги аорти.
- ▶ D. У місці переходу в шлунок.
- ▶ Е. У місці переходу глотки в стравохід.

У місці прилягання дуги аорти.



Хворий 40 років звернувся до лікаря зі скаргами на часту печію у стравоході. При огляді виявлено недостатність сфінктеру. Якого саме?


- ▶ А. Стравохідного.
 - ▶ В. Пілоричного.
 - ▶ С. Глоткового.
 - ▶ D. Кардіального.
 - ▶ Е. Дуоденального.
- 

Кардіального



Хворий госпіталізований у лікарню з виразкою стравоходу. Через деякий час у хворого з'явилися симптоми запалення очеревини. В якій частині стравоходу стався прорив стравоходу?



- ▶ А. Глотковій.
 - ▶ В. Грудній.
 - ▶ С. Шийній.
 - ▶ D. Шлунковій.
 - ▶ Е. Черевній.
- 

Черевній.



У пацієнта **мезоморфної статури** з
циліндричною грудною кліткою,
проводилося рентгенологічне дослідження
шлунка. Яка **форма шлунка** найімовірніше
була визначена?



- ▶ А. Шлунок у формі подовженого гачка.
- ▶ В. Шлунок у формі рогу.
- ▶ С. Шлунок у формі панчохи.
- ▶ D. Шлунок у формі гачка.
- ▶ Е. Подовжений шлунок.

Шлунок у формі гачка



Чоловікові **брахіморфної статури**, з
конічною грудною кліткою проводилося
рентгенологічне дослідження шлунка.
Яка **форма шлунка** найімовірніше була
визначена?



- ▶ А. Шлунок у формі подовженого гачка
- ▶ В. Шлунок у формі гачка.
- ▶ С. Шлунок у формі панчохи.
- ▶ D. Подовжений шлунок.
- ▶ Е. Шлунок у формі рогу.
- ▶

Шлунок у формі рогу




1. During the X-ray, examination of a 30-year-old patient in vertical position a doctor detected the presence of **air in the stomach**. What part of the stomach is it in?

- ▶ A. At the fundus
- ▶ B. In the cardial
- ▶ C. In the body
- ▶ D. In the pyloric
- ▶ E. In the area of the lesser curvature

At the fundus



- ▶ During a duodenal intubation, the probe does not pass from the **stomach into the duodenum**. What part of the stomach is an obstacle (tumor) in?

- ▶ A. In the area of the lesser curvature
 - ▶ B. In the cardial part
 - ▶ C. In the fundus area
 - ▶ D. In the body area
 - ▶ E. In the pyloric part
- 

In the pyloric part

