


- ▶ При оперативному втручанні з приводу каменів жовчних ходів хірург повинен знайти **загальну печінкову протоку**. Між листками якої зв'язки вона знаходиться?

- ▶ А. Печінково-дванадцятипалокишкової.
- ▶ В. Печінково-шлункової.
- ▶ С. Печінково-ниркової.
- ▶ D. Круглої зв'язки печінки.
- ▶ Е. Венозної зв'язки.


- ▶ Печінково-дванадцятипалокишкової.

- ▶ При дослідженні **жовчний міхур** переповнений жовчю. Яка ділянка **позапечінкових жовчних ходів** патологічно змінена?

- ▶ А. Ліва часткова протока.
 - ▶ В. Міхурова протока.
 - ▶ С. Загальна печінкова протока.
 - ▶ D. Загальна жовчна протока.
 - ▶ Е. -
- 


► Міхурова протока.

- ▶ Під час холецистектомії (видалення жовчного міхура), конкременти (жовчні камінчики) можуть переміститися по широкій **міхуровій протоці в наступні відділи жовчовивідних шляхів**. В якому місці хірург повинен провести огляд?

- ▶ A. Ductus hepaticus communis.
 - ▶ B. Ductus choledochus.
 - ▶ C. Ductus hepaticus dexter.
 - ▶ D. Ductus hepaticus sinister.
 - ▶ E. Ductulus billiferi.
- 


▶ Ductus choledochus.

- ▶ Хворий потрапив в клініку зі скаргами на болі в ділянці живота, нудоту. При пальпації живота лікар-хірург виявив болючу точку на перетині правої ребрової дуги і зовнішнього краю правого прямого м'яза живота (**точка Кера**). Який попередній діагноз найімовірніше поставить лікар?

- ▶ А. Нефрит.
 - ▶ В. Панкреатит.
 - ▶ С. Холецистит.
 - ▶ D. Гастрит.
 - ▶ Е. Дуоденіт.
- 


▶ Холецистит.

- ▶ У хворого з **пухлиною підшлункової залози** розвинулася механічна жовтуха, внаслідок здавлення **жовчновивідної протоки**. Яка протока здавлена?

- ▶ A. ductus choledochus;
 - ▶ B. ductus cysticus;
 - ▶ C. ductus hepaticus communis;
 - ▶ D. ductus hepaticus dexter;
 - ▶ E. ductus hepaticus sinister
- 

- ▶ Ductus choledochus.

- ▶ У хворого з жовчнокам'яною хворобою розвилася механічна жовтуха. При обстеженні встановлено, що камінь знаходиться в загальній жовчній протоці. Які жовчовивідні протоки утворюють обтуровану протоку?

- ▶ A. Ductus hepaticus communis et ductus cysticus;
 - ▶ B. Ductus hepaticus dexter et sinister;
 - ▶ C. Ductus hepaticus dexter et ductus cysticus;
 - ▶ D. Ductus hepaticus sinister et ductus cysticus;
 - ▶ E. Ductus hepaticus communis et ductus choledochus.
- 


- ▶ Ductus hepaticus communis et ductus cysticus.

- ▶ Лікар пальпує у хворого 43 р. **нижній край печінки**. На якому рівні у здорової людини розташована нижня межа печінки ?

- ▶ А. По краю ребрової дуги
- ▶ В. На 2 см нижче краю ребрової дуги
- ▶ С. На 4 см нижче краю ребрової дуги
- ▶ D. На 4 см вище краю ребрової дуги
- ▶ Е. На 3 см нижче краю ребрової дуги


► По краю ребровой дуги

- ▶ Хворому поставлено діагноз: **панкреатит**.
В якій області передньої стінки живота
можна пропальпувати запалений орган?

- ▶ А. Надчеревній і лівому підребер'ї
 - ▶ В. Надчеревній і правому підребер'ї
 - ▶ С. Лівій бічній
 - ▶ D. Пупковій
 - ▶ Е. Правій бічній
- 


▶ Надчеревній і лівому підребер'ї

- ▶ Визначення розмірів печінки дозволило встановити, що по правій середньоключичній лінії верхня її межа знаходиться на рівні IV міжребрового простору, нижній її край виступає з під ребрової дуги на 4 см. Оцініть розміри печінки.

- ▶ А. Печінка збільшена - нижня її межа зміщена донизу.
 - ▶ В. Печінка зменшена - нижня її межа зміщена донизу.
 - ▶ С. Печінка зменшена - нижня її межа зміщена догори.
 - ▶ D. Печінка збільшена - верхня її межа зміщена догори
 - ▶ Е. Розміри печінки нормальні.
- 

- ▶ Печінка збільшена - нижня її межа зміщена донизу.


- ▶ Під час операції, маніпулюючи в ділянці між шлунком та печінкою, хірург остерігався пошкодити **печінково-дванадцятипалу зв'язку**, тому що там знаходиться:

- ▶ А. Спільна жовчна протока, власна печінкова артерія, ворітна вена
 - ▶ В. Спільна жовчна протока, спільна печінкова артерія, ворітна вена печінки.
 - ▶ С. Власна печінкова артерія, шлунково-дванадцятипалокишкова артерія.
 - ▶ D. Ворітна вена печінки, печінкові вени
 - ▶ Е. Нижня порожниста вена, міхурова протока.
- 

- ▶ Спільна жовчна протока, власна печінкова артерія, ворітна вена


Проводячи хірургічне втручання на жовчному міхурі, лікарю необхідно визначити **загальну міхурову протоку**. В якому анатомічному утворенні очеревини вона знаходиться?



- ▶ A. Lig. Hepatoduodenale.
 - ▶ B. Lig. Hepatorenale.
 - ▶ C. Lig. Gastrocolicum.
 - ▶ D. Lig. Duodenorenale.
 - ▶ E. Lig. Hepatogastricum.
- 

▶ Lig. Hepatoduodenale.


- ▶ У хворого 62 років, який звернувся до лікаря зі скаргами на **підвищену спрагу**, схуднення, прискорене сечовиділення. Був поставлений діагноз: цукровий діабет. Яка залоза уражена?

- ▶ А. Підшлункова залоза
 - ▶ В. Острівці підшлункової залози
 - ▶ С. Гіпофіз
 - ▶ D. Надниркова залоза
 - ▶ Е. Щитоподібна залоза
- 

► Підшлункова залоза

1. A patient with cholelithiasis fell ill with mechanic jaundice. Examination revealed that the stone was in the **common bile duct**. What bile-excreting ducts make up the obturated duct?


.

- ▶ A. Ductus hepaticus sinister et ductus cysticus
 - ▶ B. Ductus hepaticus dexter et sinister
 - ▶ C. Ductus hepaticus dexter et ductus cysticus
 - ▶ D. Ductus hepaticus communis et ductus cysticus
 - ▶ E. Ductus hepaticus communis et ductus choledochus
- 

Ductus hepaticus communis et ductus cysticus

A surgeon has to find the **common hepatic duct** during the operative intervention on account of concrements in the gall ducts. The common hepatic duct is located between the leaves of:



- ▶ A. Venous ligament
 - ▶ B. Hepatogastric ligament
 - ▶ C. Hepatorenal ligament
 - ▶ D. Round ligament of liver
 - ▶ E. Hepatoduodenal ligament
- 

Hepatoduodenal ligamen



- При вивченні препарату печінки студент визначив, що печінка має всі зв'язки, крім:

- A. Печінково–підшлункової
- B. Печінково–дванадцятипалокишкової
- C. Печінково–шлункової
- D. Вінцевої
- E. Серпоподібної

Печінково-підшлункової