

Підготовка до складання ЛІ “Крок-1. Стоматологія”

2026 рік

- Пацієнт віком 26 років скаржиться на головний біль та утруднене дихання. Рентгенологічно діагностовано: фронтит (запалення лобової пазухи). В який носовий хід поширюються гнійні виділення?

A. Середній

B. Над верхньою носовою раковиною

C. Верхній

D. Загальний

E. Нижній

- Пацієнт віком 36 років з ВІЛ-позитивним статусом скаржиться на дискомфорт та печіння в ділянці язика. Під час огляду виявлено картину **«волохатого язика»**: зроговіння сосочків на задній та середній третинах спинки язика, зміна їхнього кольору на темно-коричневий. Патологією яких сосочків язика зумовлена така клінічна картина?

A. Жолобкуватих

B. Ниткоподібних

C. Грибоподібних

D. Листоподібних

E. Ниткоподібних та жолобкуватих

- Пацієнт скаржиться на раптовий біль у ділянці глотки, мигдаликів, язика та шиї під час жування. Із анамнезу відомо, що за останній місяць він схуд на 10 кг, оскільки через страх відновлення болю він відмовлявся приймати їжу. З невралгією якої пари черепних нервів пов'язане виникнення таких симптомів?

- A. X
- B. XII
- C. VII
- D. IX
- E. XI

• Під час обстеження пацієнта з травматичне пошкодження головного мозку виявлено, що він втратив **тактильну чутливість**. Який відділ кори мозку пошкоджений?

A. Передня центральна звивина

B. Задня центральна звивина

C. Потилична доля кори

D. Тім'яна частка кори

E. Лобова частка кори

- Під час електротравми у потерпілого в ділянці шиї сформувався **патологічний фіксований нахил голови в бік пошкодження у поєднанні з поворотом у протилежний бік**. Який м'яз шиї піддався рубцевим змінам?

A. Передній зубчастий

B. Трапецієподібний

C. Лопатково-під'язиковий

D. Двочеревцевий

E. Грудинно-ключично-соскоподібний

- Під час дослідження видаленого зуба пацієнта виявлено: *зуб має довгий корінь, на язиковій поверхні - серединний валик, який розширювався до ріжучого краю зуба*. Який зуб, найімовірніше, видалений у пацієнта?
 - A. Великий кутній зуб верхньої щелепи
 - B. Присередній різець верхньої щелепи
 - C. Ікло верхньої щелепи**
 - D. Премоляр верхньої щелепи
 - E. Бічний різець нижньої щелепи

• Під час хірургічного втручання лікар маніпулює на **внутрішній стінці барабанної порожнини**. Руйнування якого каналу скроневої кістки можливе в цьому разі?

A. Барабанного

B. Канальця барабанної струни

C. Лицевого

D. М'язово-трубного

E. Сонного

- У пацієнта виявлено запалення **верхньощелепного нерва**. Крізь який отвір черепа проходить цей нерви?

A. Яремний

B. Овальний

C. -----

D. Круглий

E. Остистий

- На прийом до лікаря прийшла пацієнтка віком 20 років. Об'єктивно спостерігається: *високого зросту, зі збільшеними губами, носом, кистями та стопами*. Підвищення секреції якої залози можна запідозрити у цієї пацієнтки?

A. Прищитоподібної залози

B. Передньої частки гіпофіза

C. Задньої частки гіпофіза

D. Щитоподібної залози

E. Епіфіза

- Під час огляду ротової порожнини пацієнта лікар-стоматолог звернув увагу, що при змиканні щелепи *верхні різці виступають вперед і прикривають присінкові поверхні коронок нижніх передніх зубів*. Який прикус виявлено в пацієнта?

- A. Фізіологічну ортогнатію
- B. Патологічну прогнатію
- C. Патологічну прогенію
- D. Закритий прикус**
- E. Фізіологічну ортогенію

- У пацієнта діагностовано: ураження **ядра під'язикового нерва**. Який відділ головного мозку уражений патологічним процесом?

A. Мозочок

B. Середній мозок

C. Довгастий мозок

D. Проміжний мозок

E. Міст

• Пацієнт віком 45 років звернувся до лікаря з приводу різаної рани м'яких тканин дистальної фаланги великого пальця кисті, яка супроводжується кровотечею. Гілками якої артерії кровопостається великий палець кисті?

A. Задньою міжкістковою

B. Передньою міжкістковою

C. Ліктьовою

D. Променевою

E. Плечовою

- Пацієнт звернувся до лікарні з травмою щоки та скаргами на **неможливість зімкнути щелепи на боці поранення та висунути нижню щелепу вперед**. Який м'яз ймовірно пошкоджено у пацієнта?

A. Скроневий

B. Жувальний

C. Щічний

D. Присередній крилоподібний

E. Бічний крилоподібний

• Пацієнту 45 роки діагностовано спинномозкову травму. Під час обстеження виявлено порушення больової та температурної чутливості. Який висхідний шлях зазнав ураження?

A. Передній спинномозково-мозочковий

B. Бічний спинномозково-таламічний

C. Передній спинномозково-таламічний

D. Задній спинномозково-мозочковий

E. Спинномозково-сітчастий

- Пацієнт після перенесеного інсульту скаржиться на значні **труднощі з вимовлянням слів**, але при цьому розуміння мовлення не викликає складнощів. Яка ділянка кори головного мозку, ймовірно пошкоджена у пацієнта?

A. Префронтальна зона

B. Зона Верніке

C. Зорова кора

D. Сенсомоторна кора

E. Зона Брока

- У пацієнта після травми спостерігається втрата чутливості задніх ділянок шкіри плеча та передпліччя. Гілки якого нерва ушкоджені?

A. N. ulnaris

B. N. musculocutaneus

C. A. axillaris

Д. N. radialis

E. N. medianus

- Чоловіка шпиталізовано з травмою голови. Після обстеження лікар виявив **перелом кістки лицевого черепа** в пацієнта. Лінія перелому проходить через **іклову ямку**. Яка кістка травмована в пацієнта?
- A. Os zygomaticum
- B. Os palatinum
- C. Mandibula
- D. Os lacrimale
- E. **Maxilla**

- У пацієнта внаслідок ішемічного інсульту розвинувся **бульбарний синдром**. Спостерігається **дисфагія, дисфонія, їжа потрапляє в носову порожнину**. Лікар діагностував ушкодження одного зі **спільних ядер IX та X пар** черепних нервів. Укажіть це ядро.
- A. Nucleus n. accessorius
- B. Nucleus principalis
- C. **Nucleus ambiguus**
- Д. Nucleus impar
- E. Nucleus salivatorius superior

- Пацієнту діагностовано фурункульоз нижньої губи. Прийнято рішення провести висікання вени з метою попередження розповсюдження запального процесу на печеристу пазуху. Яку вену висікають в цьому разі?
- А. Підборідну
- В. Поперечну вену лиця
- С. Зовнішню яремну
- D. Лицеву
- Е. Кутову

- У пацієнта порушена **больова та температурна чутливість язика**. Які сосочки уражені?
- А. Жолобуваті, ниткоподібні
- В. **Ниткоподібні, конічні**
- С. Грибоподібні, ниткоподібні
- D. Листоподібні, грибоподібні
- Е. Конічні, жолобуваті

- У пацієнта діагностовано травму черепа. На рентгенограмі спостерігається лінія перелому основи черепа, що проходить між **овальним та круглим отворами**. Яка кістка черепа ушкоджена?

- А. Вилична
- В. Потилична
- С. Решітчаста
- Д. **Клиноподібна**
- Е. Скроснева

- Після крововиливу в мозок у пацієнта виникло значне погіршення **смакової чутливості**. Яка структура мозку, імовірно, ушкоджена?
- А. Гіпоталамус
- В. **Постцентральна звивина**
- С. Гіпокамп
- D. Чорна субстанція
- Е. Мигдалеподібне тіло

- Пацієнт скаржиться на **неможливість зворотного руху нижньої щелепи**, яка зміщена вперед. За результатами рентгенографії черепа виявлено: **перелом виличної дуги**. Функція якого м'яза порушена в цьому разі?
- A. M. pterigoideus medialis
- B. M. zygomaticus major
- C. M. pterigoideus lateralis temporalis
- D. **M. temporalis**
- E. M. zygomaticus minor

- У пацієнта внаслідок ДТП виникла наскрізна **рана в центрі щоки**, на яку необхідно накладати шви. На який м'яз лікар-хірург накладе шви під час надання медичної допомоги пацієнту?
- A. *M. corrugator supercilii*
- B. *M. depressor anguli oris*
- C. *M. zygomaticus major*
- D. *M. orbicularis oris*
- E. ***M buccinator***

- Пацієнту віком 40 років під час рентгенологічного дослідження кісток основи черепа виявлено: **збільшення порожнини турецького сідла**, стоншування передніх нахилених відростків, руйнування різних відділів турецького сідла. Пухлина якої ендокринної залози може призвести до такої рентгенологічної картини?
- А. Щитоподібної
- В. Підшлункової
- С. Наднирника
- Д. Епіфіза
- Е. **Гіпофіза**

- У жінки віком 30 років діагностовано: гострий гнійний **середній отит із подальшим запаленням комірок соскоподібного відростка**. Через яку стінку барабанної порожнини міг потрапити гній до комірок?
- A. **Paries mastoideus**
- B. Paries labyrinthicus
- C. Paries caroticus
- D. Paries membranaceus
- E. Paries tegmentalis

- У пацієнта діагностовано **неврит трійчастого нерва**. Який із травних процесів порушиться найбільше у цьому разі?
- А. Слиноутворення
- В. **Жування**
- С. Слиновиділення
- D. Формування смакових відчуттів
- Е. Ковтання

- Чоловіку віком 48 років, хворому на злоякісну пухлину язика, лікар-хірург перев'язує **a. lingualis** у ділянці **трикутника Пирогова**. Який нерв є верхньою межею цієї анатомічної ділянки?
- A. N. glossopharynseus
- B. **N. hypoglossus**
- C. Ansa cervicalis
- D. N. sublingualis
- E. N. lingualis

- У результаті травматичного пошкодження вінцевого відростка нижньої щелепи потерпілий не може піднімати і тягнути назад щелепу. Який м'яз пошкоджено?
- А. Латеральний крилоподібний
- В. Щічний
- С. Скроневий
- D. Жувальний
- С. Медіальний крилоподібний

- У пацієнта віком 28 років перелом нижньої щелепи призвів до **кровотечі з нижньої коміркової артерії**. Гілка якої артерії ушкоджена?
- А. Лицевої
- В. Зовнішньої сонної
- С. **Верхньощелепної**
- D. Внутрішньої сонної
- E. Підборідної

- У новонародженої дівчинки під час смоктання **молоко потрапляє до носової порожнини**. Яка вроджена вада розвитку в дитини?
- А. Атрезія стравоходу
- В. Звуження стравоходу
- С. **Незарощення м'якого піднебіння**
- D. Дивертикул стравоходу
- E. ГЕРХ (гастроезофагальна рефлюксна хвороба)

- До порушення якої функції призведе ураження груднинно-щитоподібного м'яза?
- А. Розгинання шиї
- В. Нахилу шиї вперед
- С. Опускання гортані
- D. Підняття під'язикової кістки
- E. Підняття гортані

- У новонародженої дівчинки спостерігається неправильне зрощення відростків верхньої щелепи зі лемешем. Який патологічний стан виник у дитини?
- А. Макростомія
- В. Хейлосхизіс ("заяча губа")
- С. Макроглосія
- D. Палатосхизіс ("вовча паща")
- Е. Мікростомія

- Після пошкодження мозку у людини порушене сприйняття **зорової інформації**. В якому відділі кори сталося пошкодження?
- А. Скронева ділянка кори
- В. Задня центральна звивина
- С. Тім'яна ділянка кори
- D. Передня центральна звивина
- Е. **Потилична ділянка кори**

- Жінка звернулася до лікаря зі скаргами на порушення **смакової чутливості язика**. Пошкодження якого ядра довгастого мозку могло викликати ці розлади?
- А. Подвійне
- В. Під'язикового нерва
- С. **Поодинокі**
- D. Нижнього слиновидільного
- E. Дорсальне ядро блукаючого нерва

- У хворого при огляді порожнини рота встановлено різке **почервоніння слизової оболонки кореня язика**. Визначте, яке утворення залучене в запальний процес:
 - А. Глотковий мигдалик
 - В. **Язиковий мигдалик**
 - С. Піднебінна завіска
 - D. Піднебінний мигдалик
 - Е. Трубний мигдалик

- У пацієнта діагностовано злоякісну **пухлину епіфіза** із проростанням в одну із **цистерн підпаутинного простору** головного мозку. У ділянці якої цистерни необхідно проводити оперативне втручання для видалення пухлини?
- A. Cisterna ambiens
- B. Cisterna interpeduncularis
- C. Cisterna chiasmatis
- D. **Cisterna quadrigeminalis**
- E. Cisterna pericallosa

- В яких лімфатичних вузлах може розвиватися запальна реакція при гінгівіті (запаленні слизової рота)?
- A. **Nodi submandibulares**
- B. Nodi cervicales laterales
- C. Nodi supraclaviculares
- D. Nodi parotidei superficiales
- E. Nodi parotidei profundi

- У потерпілого з травмою носа встановлений перелом кістки черепа, що обмежує верхній край грушоподібного отвору кісткової носової порожнини. Яка кістка пошкоджена ?
- А. Носова
- В. Сльозова
- С. Верхня щелепа.
- D. Лобова
- Е. Решітчаста

- Під час обстеження головного мозку на комп'ютерному томографі лікар виявив пухлину, що локалізується в ділянці **НИЖНЬОГО СЛИНОВИДІЛЬНОГО ЯДРА**. Який це відділ мозку?
- А. Довгастий мозок
- В. Середній мозок
- С. Проміжний мозок
- D. Міст
- E. Мозочок

- У травматологічне відділення поступив пацієнт з різаною раною трапецієподібного м'яза. Яка фасція шиї формує піхву для даного м'яза?
- А. Поверхнева пластинка шийної фасції
- В. М'язова частина передтрахейної пластинки шийної фасції
- С. Вісцеральна частина передтрахейної пластинки шийної фасції
- D. Передхребтова пластинка шийної фасції
- Е. Сонна піхва шийної фасції

- При трепанації черепа на скроневій кістці нейрохірург знайшов **трійчастий вузол**. Де знаходиться даний вузол?
- **A. На передній поверхні кам'янистої частини**
- B. На задній поверхні кам'янистої частини
- C. На нижній поверхні кам'янистої частини
- D. На барабанній частині
- E. На лускатій частині

- У хворого перелом основи черепа **попереду від великого потиличного отвору**. Частина якої кістки травмована?
- A. **Pars basilaris ossis occipitalis**
- B. Pars lateralis ossis occipitalis
- C. Pars squamosa ossis occipitalis
- D. Pars squamosa ossis temporalis
- E. Pars petrosa ossis temporalis

- До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на обмеженість **зміщення нижньої щелепи праворуч**. Функція якого м'язу порушена?
- A ***M. pterygoideus lateralis sinister***
- B *M. temporalis dexter*
- C *M. pterygoideus lateralis dexter*
- D *M. zygomaticus major*
- E *M. masseter sinister*

- Під час дорожньо-транспортної пригоди водій отримав численні пошкодження бічної поверхні голови, серед яких був **перелом виличної дуги**. Функція якого м'язу страждатиме?
- A. **M. masseter**
- B. M. buccinator
- C. M. procerus
- D. M. risorius
- E. M. orbicularis oris

- В щелепно-лицеву хірургію доставлено дитину з раною лица, яка знаходиться **вздовж переднього краю жувального м'яза**. З рани джерельцем витікає кров. Визначте пошкоджену судину.
- A. **A. facialis**
- B. A. carotis externa
- C. A. temporalis superficialis
- D. A. maxillaris
- E. A. lingualis

- Під час огляду порожнини рота лікар-стоматолог виявив наявність запалення **тканин, які оточують зуб**. Запалення якого анатомічного утворення виявив лікар?
- Cementum
- **Paradontium**
- ---
- Gingiva
- Alveola dentalis

**Дякуємо за
увагу!**

