

*1. Яка **артерія** може бути пошкоджена при виконанні провідникової анестезії в ділянці **отвору нижньої щелепи?**

А. Нижня альвеолярна артерія

В. Щічна артерія

С. Язикова артерія

Д. Крилоподібні гілки

Е. Середня оболонкова артерія

А. Нижня альвеолярна артерія

*2. Хворому для виготовлення функціонального повноцінного протеза необхідно видалити ліве верхнє ікло. Після **інфраорбітальної анестезії** у хворого з'явилася гематома в передній ділянці обличчя, яка швидко збільшувалася. Встановлено, що травмовано **артерію**, яка є гілкою:

A. A.maxillaris

B. A.alveolaris inferior

C. A .temporalis superficialis

D. A.opthalmica

E. A.labialis superior

A. A.maxillaris

* 3. До стоматолога звернулася жінка зі скаргою на синець і припухлість під оком. З анамнезу: кілька днів тому під **підочноямковою анестезією** видалений перший малий кутній зуб, а через кілька днів з'явилась гематома в ділянці foramen intraorbitale. Гілку якої **артерії** було травмовано?

А. Верхньощелепної

В. Лицевої

С. Поверхневої скроневої

Д. Верхньої губної

Е. Жувальної

А. Верхньощелепної

*4. Хворий 60-ти років при падінні отримав травму голови і був доставлений до лікарні. При обстеженні виявлена підшкірна гематома скроневої ділянки. Пошкодження якої судини призвело до появи гематоми?

A. A. temporalis superficialis

B. A. maxillaris

C. A. auricularis posterior

D. A. buccalis

E. A. occipitalis

A. A. temporalis superficialis

*5. Потерпілий доставлений у лікарню з переломом **нижньої щелепи** та значною кровотечею у ділянці перелому. Пошкодження якої **артерії** вірогідніше всього мало місце?

- А. Нижньої коміркової артерії
- В. Висхідної глоткової артерії
- С. Язикової артерії
- Д. Висхідної піднебінної артерії
- Е. Верхньої коміркової артерії

А. Нижньої коміркової артерії

*6. Потерпілий доставлений у клініку з відкритим переломом **гілки нижньої щелепи** з великою кровотечею в ділянці перелому. Пошкодження якої **артерії**, вірогідніше за все, мало місце?

А. Коміркової нижньої

В. Середньої скроневої

С. Лицевої

Д. Язикової

Е. Висхідної піднебінної

А. Коміркової
НИЖНЬОЇ

*7. У травмованого
епідуральна гематома у
скроневій ділянці. Яка
артерія пошкоджена?

- A. Середня оболонна артерія
- B. Середня мозкова артерія
- C. Задня сполучна артерія
- D. Передня оболонна артерія
- E. Передня мозкова артерія

А. Середня оболонна артерія

*8. Під час операції закриття природженої щілини піднебіння (уранопластики), при збиванні долотом крилоподібного гачка, ушкоджено **великий піднебінний канал**. Виникла кровотеча яку можна зупинити лише шляхом тампонади каналу. Яку **артерію** ушкоджено?

- A. Низхідну піднебінну артерію.
- B. Висхідну піднебінну артерію.
- C. Висхідну глоткову артерію.
- D. Клиноподібну артерію.
- E. Задню верхню альвеолярну артерію.

А. Низхідну піднебінну
артерію.

*9. До хірурга-стоматолога потрапив чоловік 28 років з вуличною травмою. Лікар виявив, що при ушкодженні луски скроневої кістки у хворого виникла субдуральна гематома. Ушкодження якої артерії найбільш ймовірно спричинило утворення гематоми?

A. A. meningea media

B. A. ophthalmika

C. A. carotis interna

D. A. sphenopalatina

E. A. maxillaris

A. A. meningeae media

*10. В відділення черепно-мозкової травми потрапив хворий з пошкодженням великого крила **клиноподібної** кістки. Лінія перелому пройшла через **остистий отвір**. Яка **судина** постраждала?

- A. Середня оболонна артерія
- B. Латеральна крилоподібна артерія
- C. Задня глибока скронева артерія
- D. Передня глибока скронева артерія
- E. Поверхнева скронева артерія

А. Середня оболонна артерія

*11. При трепанації соскоподібного відростка скроневої кістки з приводу гнійного отиту для хірурга стоматолога існує можливість пошкодження каналу лицевого нерва та кровотечі. Яка артерія проходить разом з лицевим нервом в каналі?

A. a. meningeamedia

B. a. occipitalis

C. a. facialis

D. a. auricularisposterior

E. a. stylomastoidea

E. a. stylomastoidea

*12. При обстеженні хворого з порушенням іннервації шкіри та слизових оболонок обличчя, було виявлено запалення **трійчастого вузла** та порушення його **кровопостачання**. Гілкою якої артерії він кровопостачається в нормі?

A. A. sphenopalatina

B. A. ophtalmica

C. A. carotis interna

D. A. infraorbitalis

E. A. meningeae media

E. A. meningeae media

*13. Лікар-стоматолог, знеболюючи нижньощелепний нерв в ділянці овального отвору, випадково ушкодив **артерію**, яка проходить через **остистий отвір**. Яку артерію було ушкоджено?

A. A.maxillaris

B. A.temporalis profunda

C. A.sphenopalatina

D. A.alveolaris inferior

E. A.meningea media

E. A.meningea media

*14. У постраждалого перелом тіла нижньої щелепи. Кровотеча з рани. Яка артерія ушкоджена?

A. A. alveolaris inferior

B. A. lingualis

C. A. maxillaris

D. A. carotis externa

E. A. facialis

A. alveolaris inferior

15. Злоякісна пухлина
привушної слинної залози
спричинила пошкодження
артерії, яка проходить через її
паренхіму. Яка це артерія?

А. Поверхнева скронева

В. Верхньощелепна

С. Висхідна глоткова

Д. Лицева

Е. Задня вушна

А. Поверхнева
скронева

*16. У пацієнта вилучений
верхній медіальний різець.
Гілки якої артерії його
кровопопстачають?

A. *A.infraorbitalis*

B. *A.buccalis*

C. *A.palatina descendens*

D. *A.sphenopalatina*

E. *A.alveolaris inferior*

A. A.infraorbitalis

*17. У постраждалого травма голови, яка супроводжується артеріальною кровотечею в ділянці тім'яної кістки. Яка артерія уражена?

A. A. temporalis superficialis

B. A. facialis

C. A. auricularis posterior

D. A. maxillaris

E. A. thyroidea superior

A. A. temporalis
superficialis

*18. У хворого після видалення
верхнього лівого присереднього
різця виникла кровотеча з
комірки. Яка артерія зумовила
кровотечу?

- A. Задня верхня коміркова артерія
- B. Низхідна піднебінна артерія
- C. Нижня коміркова артерія.
- D. Передня верхня коміркова артерія
- E. Висхідна піднебінна артерія

D. Передня верхня коміркова артерія

*19. У хворого поранення
м'яких тканин в **скроневій**
ділянці. Яка гілка зовнішньої
сонної **артерії** ушкоджена?

А. Поперечна лицева

В. Поверхнева скронева

С. Потилична

Д. Лицева

Е. Задня вушна

В. Поверхнева
скронева

*20. У травмованого кровотеча з
рани позаду соскоподібного
відростка. Яка артерія
ушкоджена?

A. A. carotis externa

B. A. facialis

C. A. occipitalis

D. A. temporalis superficialis

E. A. meningeae media

C. A. occipitalis

*21. У травмованого кровотеча з глибокої рани в ділянці **шийки нижньої щелепи**. Яка **артерія** ушкоджена?

A. A. infraorbitalis

B. A. maxillaris

C. A. carotis externa

D. A. facialis

E. A. temporalis superficialis

B. A. maxillaris

*22. Кровоточить різана рана
під **нижнім краєм очної**
ямки. Гілки якої **артерії**
пошкоджені?

A. A. ophthalmica

B. A. supraorbitalis

C. A. facialis

D. A. maxillaris

E. A. infraorbitalis

E. A. infraorbitalis

*23. У хворого, якому видалений другий великий кутній зуб нижньої щелепи, визначається коміркова кровотеча. Вкажіть яка судина є джерелом кровотечі?

- А. Верхньощелепна артерія
- В. Лицева артерія
- С. Висхідна глоткова артерія
- Д. Очна артерія
- Е. Язикова артерія

А. Верхньощелепна артерія

*24. При видаленні **верхнього**
лівого **третього** **моляра**
виникла значна кровотеча.
Ураження якої **артерії**
призвело до кровотечі?

A. A. facialis

B. A. alveolaris superioris posterioris

C. A. alveolaris inferior

D. A. infraorbitalis

E. A. alveolaris superioris anterioris

B. A. alveolaris
superioris posterioris

*25. При проведенні оперативного втручання на шийі хірургові потрібно виділити **зовнішню сонну** артерію. Що є анатомічним орієнтиром для встановлення місця **початку** зазначеної судини **на шийі**?

- А. верхній край щитоподібного хряща
- В. яремна вирізка
- С. кут нижньої щелепи
- Д. нижній край щитоподібного хряща
- Е. місце початку груднино-ключично-соскоподібного м'яза

А. верхній край
щитоподібного хряща

*26. До лікаря-стоматолога звернувся пацієнт зі скаргами на кровоточивість **ясен** **верхньої щелепи**. Яка **артерія** обумовлює кровотечу?

A. a. supraorbitalis

B. a. maxillaris

C. a. facialis

D. a. infraraorbitalis

E. a. angularis

B. a. maxillaris

* 27. У травмованого перелом шийки нижньої щелепи, що призвело до кровотечі з артерії, яка розташована поруч з місцем перелому. Яка артерія ушкоджена?

A. A. infraorbitalis

B. A. maxillaris

C. A. carotis externa

D. A. facialis

E. A. occipitalis

B. *A.* maxillaris