

Внаслідок операційної травми м'яких тканин шиї справа, порушилися регулярні рухові **екскурсії правого куполу діафрагми**. Який з нервів нервів вірогідно постраждав?

- A. N. phrenicus dexter.
- B. N. vagus
- C. N. accessorius
- D. Rr. dorsales nervi spinalis
- E. N. intercostales.

N. phrenicus dexter

У хворого відсутня **чутливість в передньому трикутнику шиї**. Який нерв із шийного сплетення пошкоджено?

- A. Поперечный шейный
- B. Великий ушной
- C. Малый потиличный
- D. Надключичный
- E. Шейная петля

Поперечний шийний

Хворий потрапив у клініку з пораненням в ділянці шиї. При обстеженні виявлено пошкоджений **нерв**, розташований **попереду переднього драбинчастого м'яза**. Який нерв пошкоджений?

- А. Діафрагмальний
- В. Блукаючий
- С. Язикоглотковий
- Д. Під'язиковий
- Е. Шийний відділ симпатичного стовбуру

Діафрагмальний

У потерпілого - різана рана шиї, яка знаходиться уздовж заднього краю m. sternocleidomastoideus, послаблена **чутливість шкіри задньої поверхні вушної раковини**. Який нерв може бути ушкодженим?

- A. n. auricularis magnus
- B. r. auricularis nervi vagi
- C. nn. auriculares anteriores
- D. n. auriculotemporalis
- E. n. auricularis posterior

n. auricularis magnus

У оперованого чоловіка 36 років , спостерігалися судорожні скорочення діафрагми. Блокаду якого нерва необхідно зробити, щоб ліквідувати це ускладнення?

A. n. frenicus

B. n. vagus

C. n. splanchnicus major

D. n. accessorius

E. tr. Sympathicus

n. frenicus

У хворого після перелому верхньої третини плечової кістки розвинувся **параліч задньої групи м'язів плеча і передпліччя**. Який нерв пошкоджено?

- А. Променевий
- В. Ліктьовий
- С. Серединний
- Д. М'язово-шкірний
- Е. Пахвовий

- Променевий

Випадково стукнувшись ліктем об стіл, хворий відчув пекучість і **поколювання на внутрішній поверхні передпліччя**. Який нерв був травмований в цьому випадку?

A. N. ulnaris.

B. N. radialis.

C. N. medianus.

D. N. axillaris.

E. N. musculocutaneus.

- *N. ulnaris*.

Хворий скаржиться на порушення чутливості шкіри в медіальній частині тильної та долонної поверхні кисті. Який з нервів ушкоджений?

A. N. ulnaris

B. N. radialis

C. N. medianus

D. N. Musculocutaneus

E. N. cutaneus antebrachii medialis

- *A. N. ulnaris*

Після травми передньої поверхні верхньої третини передпліччя у хворого порушена **пронація**, ослаблене **долонне згинання кисті** і порушена **чутливість шкіри 1,2,3-го та променевої сторони 4-го пальців долонної поверхні та шкіри нігтьової і проміжної фаланг тильної поверхні 2,3,4 пальців**. Який нерв уражений при порушенні вказаних функцій?

- A. Серединний нерв у верхній третині передпліччя
- B. Ліктювий нерв
- C. Променевий нерв
- D. М'язово-шкірний нерв
- E. Присередній шкірний нерв передпліччя

Серединний нерв у верхній третині передпліччя

У постраждалого з глибокою травмою м'яких структур присередньої поверхні дистальної половини плеча при обстеженні виявлена **втрата чутливості 5-го і 4-го пальців**. Який нерв пошкоджено?

А. ліктювий

В. променевий

С. серединний

Д. присередній шкірний передпліччя

Е. м'язово-шкірний

- ЛІКТЬОВИЙ

Хворий скаржить на порушення чутливості шкіри в медіальній частині тильної та долонної поверхні кисті. Який з нервів ушкоджений?

A. N. ulnaris

B. N. radialis

C. N. medianus

D. N. musculocutaneus

E. N. cutaneus antebrachii medialis

- N. ulnaris

У хворого після перелому верхньої третини плечової кістки розвинувся параліч задньої групи м'язів плеча і передпліччя. Який нерв пошкоджено?

- A. Променевий
- B. Ліктьовий
- C. Серединний
- D. М'язово-шкірний
- E. Пахвовий

- Променевий

Хворий не відчуває **дотику до шкіри в ділянці присередньої поверхні плеча**. Запалення якого нерва спостерігається у хворого?

- A. Шкірного присереднього нерва плеча
- B. Шкірного присереднього нерва передпліччя
- C. Променевого нерва
- D. Ліктьового нерва
- E. Пахвового нерва

Шкірного присереднього нерва плеча

При обстеженні пацієнта з ножовими ранами правої руки встановлено втрату чутливості шкіри бічної половини тильної поверхні кисті та проксимальних фаланг 1-го, 2-го і частково 3-го пальців. Який нерв пошкоджено?

А. Променевий

В. Серединний

С. Ліктьовий

Д. М'язово-шкірний

Е. Бічний шкірний передпліччя

- Променевий

У постраждалого виявлено рану верхньої частини передньої ділянки плеча. При обстеженні встановлена втрата активного **згинання в ліктьовому суглобі і чутливості шкіри передньо-бічної поверхні передпліччя**. Порушення якого нерва має місце?

А. М'язово-шкірного

В. Променевого

С. Серединного

Д. Ліктьового

Е. Пахвового

- М'язово-шкірного

У хворого спостерігається порушення чутливості на латеральній поверхні передпліччя. Який нерв пошкоджений?

A. N. musculocutaneus

B. N. radialis

C. N. ulnaris

D. N. medianus

E. N. axillaris

- N. musculocutaneus

У хворого відсутня чутливість шкіри мізинця. Який нерв постраждав?

- A. Ліктювий
- B. Серединний
- C. Променевий
- D. М'язово – шкірний
- E. Присередній шкірний передпліччя

- ЛіКТЬОВИЙ

У травматологічне відділення поступив чоловік 35 років з травмою в ділянці правого плеча. При огляді встановлено **перелом діафіза** правої **плечової кістки** в середній третині зі зміщенням відломків; **пальці** правої **кисті не розгинаються**. Який нерв постраждав?

А. Променевий

В. Ліктьовий

С. Серединний

Д. М'язово – шкірний

Е. Пахвовий

- Променевий

У хворого після травми помічено зниження больової і температурної чутливості в ділянці 1,5 пальців на долонній поверхні і 2,5 пальців на тильній поверхні зі сторони мізинця. Який нерв пошкоджено внаслідок травми?

- A. Ліктювий
- B. Променевий
- C. Серединний
- D. М'язово-шкірний
- E. Присередній шкірний нерв передпліччя

- ЛіКТЬОВИЙ

До лікаря звернувся хворий зі скаргами на неможливість **відведення правої руки** після раніше перенесеної травми. При обстеженні пасивні рухи не обмежені. Виявлена **атрофія дельтоподібного м'яза**.

Який нерв пошкоджено?

А. Пахвовий  
В. Променевий  
С. Ліктьовий  
D. Серединний  
Е. Надлопатковий

- Пахвовий

При запаленні глибоких лімфатичних вузлів пахвової ділянки хірург вимушений був розкрити глибоко розміщений гнійник. Однак, після операції у хворого виникло ускладнення: втратилась здатність згинати предпліччя в ліктьовому суглобі і порушилась шкірна чутливість передньо-латеральної поверхні предпліччя. Поранення якого нерва плечового сплетення виникло при оперативному втручанні?

- A. М'язово-шкірного нерва
- B. Ліктювого нерв
- C. Променевого нерв
- D. Серединний нерв
- E. Присереднього шкірний нерв плеча

- М'язово-шкірного нерва

Після перенесеної травми в ділянці плеча хворий не може **розігнути кисть**. При огляді відмічено також зниження больової і температурної **чутливості в ділянці 2,5 пальців тильної сторони кисті з боку великого пальця**. Який нерв пошкоджено внаслідок травми?

- А. Променевий
- В. Серединний
- С. Ліктьовий
- Д. Пахвовий
- Е. М'язово-шкірний

- Променевий

При обстеженні хворого невропатолог виявив підвищену больову чутливість шкіри на долонній поверхні I, II, III і променевої сторони IV-го пальців, середньої частини долоні та підвищення I-го пальця.

Функція якого нерва пошкоджена ?

- A. Серединний нерв.
- B. Присередній шкірний нерв передпліччя.
- C. Ліктювий нерв.
- D. Променевий нерв.
- E. М'язово-шкірний нерв.

- Серединний нерв.

У хворого “кігтеподібна” кисть. Який нерв уражений?

- A. Ліктювий нерв.
- B. Променевий.
- C. Серединний.
- D. М'язово-шкірний.
- E. Пахвовий.

- Ліктювий нерв

У пацієнта спостерігається обмеження згинання у ліктьовому суглобі, зниження тонусу двоголового м'язу плеча та втрата чутливості шкіри на передньо-латеральній поверхні передпліччя.

Функція якого нерва постраждала ?

A. N. musculocutaneus

B. N. axillaris

C. N. medianus

D. N. ulnaris

E. N. Radialis

- N. musculocutaneus

The patient with chronic disease of liver has a **positive phrenic symptom**. What muscle a diaphragmatic nerve has been compressed to for verification of the symptom?

- A. To the middle scalene muscle.
- B. To the subclavian muscle.
- C. To the posterior scalene muscle.
- D. To the sternocleidomastoid muscle.
- E. To the anterior scalene muscle.

To the anterior scalene muscle.

Regular **excursions of a diaphragm** were broken because of an operational trauma of soft tissues of a **neck on right hand side**. What nerve has suffered?

- A. N. intercostales.
- B. N. vagus
- C. N. phrenicus dexter.
- D. N. accessorius
- E. Rr. dorsales nervi spinalis

**N. phrenicus dexter.**

Loss **sensation of IV and V fingers** is revealed in patient after **trauma of medial humeral epicondyle**. What nerve is injured?

- A. Ulnar
- B. Radial
- C. Median
- D. Medial cutaneous nerve of forearm
- E. Musculocutaneous

# Ulnar

## CUTANEOUS NERVES OF THE HAND

Palmar view

Dorsal view

