


- ▶ Хворий 32 років звернувся до лікаря зі скаргою на ускладнене носове дихання, головні болі, частий нежить. Обстеживши хворого лікар визначив викривлення носової перегородки і запропонував операцію. Які частини має **НОВОА** **перегородка**?

- ▶ А. Шкірну, хрящову, перетинкову.
 - ▶ В. Шкірну, хрящову, кісткову.
 - ▶ С. Хрящову, перетинкову, кісткову.
 - ▶ D. Слизову оболонку, шкірну, перетинкову.
 - ▶ Е. Перетинкову, слизову оболонку, кісткову.
- 


► **Хрящову, перетинкову, кісткову**

- ▶ Мати п'ятирічного хлопчика звернулася в лікарню зі скаргами на ускладнене носове дихання її дитини. При обстеженні – розростання **глоткового мигдалика**, який і ускладнює вихід повітря з носової порожнини. Які **отвори носової порожнини** перекриваються при цьому захворюванні?

- ▶ А. Ніздрі.
- ▶ В. Хоани.
- ▶ С. Нососльозовий канал.
- ▶ D. Клино–піднебінні.
- ▶ Е. Гайморова щілина.

Хоани

- ▶ До ЛОР-лікаря звернулася жінка 55 років, яка скаржиться на порушення нюху. Під час огляду виявлено атрофічні зміни **regio olfactoria** слизової оболонки носової порожнини. Де вона знаходиться?

- ▶ А. У ділянці носоглоткового ходу.
 - ▶ В. У ділянці середнього носового ходу і відповідній частині перегородки носа.
 - ▶ С. У ділянці нижнього носового ходу і відповідній частині перегородки носа.
 - ▶ D. У ділянці загального носового ходу.
 - ▶ Е. У ділянці верхнього носового ходу і відповідній частині перегородки носа.
- 

У ділянці верхнього носового
ходу і відповідній частині
перегородки носа.



- ▶ У хворого запалення **НОСО-СЛЬОЗОВОГО каналу**. В яку частину носової порожнини може потрапити інфекція?

- ▶ А. Верхній носовий хід.
- ▶ В. Нижній носовий хід.
- ▶ С. Середній носовий хід.
- ▶ D. Присінок носової порожнини.
- ▶ Е. Клино–решітчастий закуток.

Нижній носовий хід.



- ▶ Дитина 1,5 місяців відмовляється від грудей. При огляді: дитина неспокійна, ускладнене носове дихання, є незначні слизисті виділення з носа. Температура тіла нормальна. Які анатомічні особливості **будови носової порожнини дітей раннього віку** можуть сприяти ускладненню носового дихання?

- ▶ А. Недостатній розвиток приносових пазух.
- ▶ В. Відсутність нижнього носового ходу.
- ▶ С. Вузькість носових ходів.
- ▶ D. Звивисті носові ходи.
- ▶ Е. Недостатній розвиток хоан.

► **Вузькість носових ходів.**

- ▶ У хворого на гостру респіраторну вірусну інфекцію діагностовано лівосторонній **гайморит**. З якого анатомічного утворення поширилася інфекція?

- ▶ А. Загального носового ходу
- ▶ В. Лівого верхнього носового ходу
- ▶ С. Лівого нижнього носового ходу
- ▶ D. Лівого середнього носового ходу
- ▶ Е. Дірчаста пластинка решітчастої кістки

Лівого середнього носового ходу

- ▶ У жінки виявлено травму щитоподібного і перснеподібного хрящів гортані. У результаті цього порушився акт ковтання. Який з перерахованих м'язів постраждав?

- ▶ А. Піднебінно–глотковий м'яз.
- ▶ В. Середній м'яз–стискач глотки.
- ▶ С. Верхній м'яз–стискач глотки.
- ▶ D. Шило–глотковий м'яз.
- ▶ Е. Нижній м'яз–стискач глотки.

Нижній м'яз–стискач глотки




- ▶ При огляді порожнини гортані лікар-фоніатр виявив вузлуваті утворення на **ГОЛОСОВИХ зв'язках**. Між якими утвореннями розташовуються голосові зв'язки?

- ▶ А. Між черпакуватими і щитоподібними хрящами.
 - ▶ В. Між черпакуватими хрящами.
 - ▶ С. Між щитоподібним хрящем і надгортанником.
 - ▶ D. Між черпакуватими хрящами і надгортанником.
 - ▶ Е. Між голосовим і м'язовим відростками черпакуватих хрящів
- 

- ▶ Між черпакуватими і щитоподібними хрящами.

- ▶ . Під час обстеження пацієнта лор-лікар діагностував запалення **верхньощелепних пазух**. У якому носовому ході під час риноскопії було виявлено гній?

- ▶ А. Середньому.
 - ▶ В. Верхньому.
 - ▶ С. Нижньому.
 - ▶ D. Загальному.
 - ▶ Е. Найвищому.
- 

Середньому




- ▶ У дитини 3х років ГРВІ ускладнилась лівобічним **ОТИТОМ**. Через яке анатомічне утворення поширилась інфекція?

- ▶ А. Лівий середній носовий хід
- ▶ В. Ліву хоану
- ▶ С. Носову частину глотки
- ▶ D. Ліву слухову трубу
- ▶ Е. Лівий верхній носовий хід

Ліву слухову трубу




- ▶ До ЛОР-лікаря звернувся хворий зі скаргами на зміну голосу. При обстеженні виявлено пухлину у межах заднього відділу **rima vocalis**. Між якими з хрящів гортані розташований цей відділ?

- ▶ A. Cartilago thyroidea.
 - ▶ B. Cartilago cricoidea.
 - ▶ C. Cartilago arytenoidea.
 - ▶ D. Cartilago corniculata.
 - ▶ E. Cartilago cuneiformis.
- 

Cartilago arytenoidea.



- ▶ До ЛОР-лікаря звернувся хворий зі скаргами на порушення голосоутворення. При обстеженні виявлено зміни в підслизовій структурі гортані. Які похідні вона утворює?

- ▶ A. Lig. cricotracheale
 - ▶ B. Cartilago crycoidea
 - ▶ C. Ventriculus laryngis
 - ▶ D. Rima vocalis
 - ▶ E. Membrana fibroelastica laryngis
- 

Rima vocalis



- ▶ Хронічний нежить ускладнився запаленням **гайморової порожнини**. Через який шлях інфекція потрапила в цей синус?

- ▶ А. Верхній
- ▶ В. Загальний
- ▶ С. Середній
- ▶ D. Нижній
- ▶ Е. Носоглотковий

Середній

- ▶ У ЛОР-відділення поступила хвора з діагнозом запального процесу у **лобовій та верхньощелепній пазухах**. В якій із зазначених ділянок буде виділятися ексудат із цих пазух?

- ▶ A У верхній носовий хід
- ▶ B У середній носовий хід
- ▶ C У нижній носовий хід
- ▶ D У присінок носа
- ▶ E У хоани

У середній носовий хід

- ▶ Хворий скаржиться на головний біль, утруднене дихання. Рентгенологічно діагноз підтвердився — фронтит (запалення лобової пазухи). У якому носовому ході при огляді порожнини носа можуть спостерігатися гнійні виділення?

- ▶ А. Загальному.
- ▶ В. Верхньому.
- ▶ С. Нижньому.
- ▶ D. Середньому.
- ▶ Е. Над верхньою носовою раковиною.

Середньому

- ▶ Хворий, 35 років, звернувся до лікаря зі скаргами на сильний нежить і втрату нюху протягом тижня. При обстеженні в носовій порожнині — велика кількість слизу, що вкриває слизову оболонку та блокує рецептори нюху. Назвіть ділянку носової порожнини, у якій розташовані ці рецептори?

- ▶ А. Верхня носова раковина.
- ▶ В. Середня носова раковина.
- ▶ С. Нижня носова раковина.
- ▶ D. Загальний носовий хід.
- ▶ Е. Присінок носа.

Верхня носова раковина




- ▶ У хворого, 28 років, діагностовано гострий запальний процес слизової оболонки **носо-сльозової протоки**. З анамнезу стало відомо, що після перенесеного грипу протягом 10 днів були виділення з носа. З якого відділу носової порожнини інфекція могла проникнути в носо-сльозову протоку?

- ▶ А. Присінка носа.
- ▶ В. Середнього носового ходу.
- ▶ С. Верхнього носового ходу.
- ▶ D. Нижнього носового ходу.
- ▶ Е. Лобової пазухи.

Нижнього носового ходу



- ▶ У хворого — ускладнення нежитю. Рентгенологічно встановлено скупчення гною у **верхньощелепній пазусі зліва**. У який носовий хід виділяється гній?

- ▶ А. Правий носо–глотковий.
 - ▶ В. Правий нижній носовий.
 - ▶ С. Правий верхній носовий.
 - ▶ D. Правий загальний носовий.
 - ▶ Е. Лівий середній носовий.
- 


Лівий середній носовий

- ▶ У хворого — пухлина в ділянці **верхнього носового ходу**. Порухення яких функцій можна очікувати?

- ▶ А. Нюху.
- ▶ В. Слиновиділення.
- ▶ С. Смаку.
- ▶ D. Слуху.
- ▶ Е. Ковтання.


Нюху

- ▶ У хворого гнійне **запалення клиноподібної пазухи**. В яку частину носової порожнини витікає гній?

- ▶ A Meatus nasi superior
 - ▶ B Meatus nasi communis
 - ▶ C Meatus nasi medius
 - ▶ D Meatus nasi inferior
 - ▶ E foramina ethmoidalia
- 

Meatus nasi superior


- ▶ При аускультації (вислуховуванні) легенів у хворого 37 років було відмічено везикулярне дихання. Це нормальний шум, який вислуховується над грудною кліткою здорових людей. Цей шум виникає в бронхіальному дереві і передається через нормально функціонуюче альвеолярне дерево. Які анатомічні структури **не належать до елементів бронхіального дерева?**

- ▶ А. Кінцеві бронхіоли.
 - ▶ В. Дихальні бронхіоли.
 - ▶ С. Часточкові бронхи.
 - ▶ D. Часткові бронхи.
 - ▶ Е. Сегментні бронхи.
- 

Дихальні бронхіоли



- ▶ При виконанні столярних робіт працівник випадково **вдихнув предмет кулястої форми** близько 0,5 см у діаметрі, що спричинило реакцію у вигляді сильного кашлю. Який відділ дихальних шляхів зазнав подразливого впливу?

- ▶ А. Трахея.
 - ▶ В. Гортань нижче від голосових зв'язок.
 - ▶ С. Гортань вище від голосових зв'язок.
 - ▶ D. Правий головний бронх.
 - ▶ Е. Лівий головний бронх.
- 

Гортань вище від голосових
зв'язок

