

Який **нерв** можна пошкодити при проведенні оперативного втручання з приводу варикозного розширення **великої підшкірної вени**?

A. Підшкірний

B. Поверхневий малогомілковий

C. Присередній шкірний нерв литки

D. Бічний шкірний нерв литки

E. Великомілковий

- Підшкірний

Хвора 40 років звернулась до дільничого лікаря зі скаргою на те, що шкіра на медіальній поверхні правої гомілки мало чутлива і мерзне більше, ніж на лівій нозі. При обстеженні встановлено ураження:

А. Підшкірного нерва.

В. Великомілкового нерва.

С. Малоюмілкового загального нерва.

Д. Литкового нерва.

Е. Поверхневої гілки малоюмілкового нерва.

- Підшкірного нерва.

Внаслідок травми гребеня клубової кістки у постраждалого відсутня чутливість шкіри в ділянці пупкового кільця й нижче. Який з названих нервів вірогідно ушкоджений?

A. N. iliohypogastricus

B. N. ilioinguinalis

C. N. cutaneus femoris lateralis

D. N. obturatorius

E. N. genitofemoralis

- N. iliohypogastricus

Внаслідок поранення пахвинної ділянки хворий втратив чутливість шкіри в нижньому відділі присередньої поверхні стегна і можливість приведення стегна. Який з нервів при цьому ушкоджений?

A. N. obturatorius

B. N. femoralis

C. N. genitofemoralis

D. N. ilioinguinalis

E. Ramus femoralis n.genitofemoralis

- N. obturatorius

Хвора 40 років звернулась до дільничого лікаря зі скаргою на те, що шкіра на **медіальній поверхні правої гомілки** мало чутлива і мерзне більше, ніж на лівій нозі. При обстеженні встановлено пошкодження якого нерва?

А. Підшкірного нерва.

В. Великомілкового нерва.

С. Малоюмілкового загального нерва.

Д. Литкового нерва.

Е. Поверхневої гілки малоюмілкового нерва.

Підшкірного нерва.

При обстеженні хворого невропатолог виявив наступний
симптомокомплекс: згасання кремастерного рефлекса
(скорочення m. cremaster), пошкодження чутливості шкіри на
передній і внутрішній поверхні верхньої третини стегна та
калитки. Про пошкодження якого нерва йде мова?

- A. Стегново-статевий нерв
- B. Клубово-пахвинний нерв
- C. Сідничний нерв
- D. Стегновий нерв
- E. Затульний нерв

- Стегново-статевий нерв

У хворого спостерігається характерні зміни ходи, так звана “**качина**” **хода**: під час ходьби хворий хитається в боки. Крім того, неможливе **приведення стегна**. Ураження якого нерва має місце?

A. Затульного

B. Нижнього сідничного

C. Стегнового

D. Великогомільного

E. Верхнього сідничного

- Затульного

В дорожньо-транспортній пригоді у потерпілого пошкоджена нижня кінцівка, на рівні **верхньої третини гомілки**. Після чого на травмованій кінцівці стало неможливим **тильне розгинання стопи**. Який нерв пошкоджений?

- А. Глибокий малогомілковий нерв.
- В. Загальний малогомілковий нерв.
- С. Великогомілковий нерв.
- Д. Поверхневий малогомілковий нерв.
- Е. Сідничний нерв

Глибокий малогомілковий нерв.

Хворий після поранення лівої гомілки втратив здатність утримувати стопу в пронованому положенні. Який нерв пошкоджено?

А. Поверхневий малогомілковий

В. Глибокий малогомілковий

С. Великомілковий

Д. Сідничний

Е. Загальний малогомілковий

Поверхневий малогомілковий

Хворий 30 років звернувся до лікаря-невропатолога зі скаргою на втрату справа чутливості шкіри задньої ділянки гомілки в середній і нижній її третині. Ураження якого нерва встановив лікар?

А. Литкового нерва

В. Задньої шкірної гілки крижового сплетення

С. Підшкірного нерву

Д. Гілки затульного нерва

Е. Великомілкового нерва

Литкового нерва

При обстеженні хворого з різаною раною в нижній третині передньої ділянки правої гомілки встановлено відсутність розгинальних рухів в правому гомілковостопному суглобі. М'язи не пошкоджені. Цілісність якого нерва порушена?

А. Глибокого малогомілкового

В. Загального малогомілкового

С. Поверхневого малогомілкового

Д. Підшкірного

Е. Великомілкового

Глибокого малогомілкового

Після ін'єкції в зовнішній верхній квадрант сідничної ділянки у хворого з'явилась болючість при відведенні стегна. Який нерв пошкоджений при введенні голки в сідничну ділянку?

A. Верхній сідничний нерв

B. Внутрішній затульний нерв

C. Нижній сідничний нерв

D. Статевий нерв

E. Сідничний нерв

верхній сідничний нерв

Юнак з ножовим пораненням зовнішньої поверхні правого колінного суглоба нижче голівки маломілкової кістки скаржить на неможливість підняти праву ногу, не зачепивши підлогу. Під час огляду: стопа звисає, пальці зігнуті, тильне згинання неможливо, ступає спочатку кінчиками пальців, потім зовнішнім краєм стопи і потім підошвою. Виявлено порушення чутливості на латеральній поверхні гомілки і стопи. Який нерв пошкоджено?

- A. Nervus peroneus communis
- B. Nervus tibialis
- C. Nervus cutaneus surae lateralis
- D. Nervus peroneus superficialis
- E. Nervus peroneus profundus

Nervus peroneus communis

У хворого “п’яткова стопа”. Який нерв уражений?

А. Великогомільковий.

В. Глибокий малогомільковий.

С. Поверхневий малогомільковий.

Д. Сідничний.

Е. Нижній сідничний.

Великогомілковий.

Хворий 18 років звернувся до невропатолога зі скаргами на неможливість ставати на пальці. При обстеженні була виявлена атрофія литкового м'яза, порушення чутливості шкіри в ділянці підошви. Функції якого нерва ноги порушені?

A. n. tibialis

B. n. fibularis

C. n. femoralis

D. n. cutaneus femoris lateralis

E. n. saphenus

n. tibialis

The patient has femoral nerves' neuritis. What movement cannot be carried out?


- A. Plantar flexion of foot.
- B. Flexion of a knee joint.
- C. Dorsal flexion of foot.
- D. Extension of a knee joint.
- E. Pronation of foot.

Extension of a knee joint.

Patient can not flex foot and toes, abduct foot. He complains of loss of sensation of sole and lateral edge of foot. What nerve is damaged?

- A. Common fibular nerve.
- B. Femoral nerve.
- C. Tibial nerve.
- D. Obturator nerve.
- E. Inferior gluteal nerve.

Tibial nerve



The infringements of skin sensitivity on a posterior surface of lower leg are revealed in a patient. What nerve damages this infringement is connected?

- A. Posterior cutaneous nerve of thigh.
- B. Femoral nerve.
- C. Sciatic nerve.
- D. Obturator nerve.
- E. Inferior gluteal nerve.

- Sciatic nerve

