

* 1. Хворий 24-х років звернувся до лікаря зі скаргою на біль **під нижньою щелепою** з правого боку. Хірург-стоматолог виявив **камінь у піднижньощелепній слинній** залозі. Видаляючи його, він запобігав кровотечі з артерії:

A. A. facialis

B. A. submental

C. A. alveolaris inferior

D. A. labialis inferior

E. A. lingualis

A. A. facialis

*2. У потерпілого
артеріальна кровотеча з
різаної рани в ділянці
переднього краю жувального
м'яза. Яку судину потрібно
перев'язати?

A. *A.facialis*

B. *A.maxillaris*

C. *Aa.labiales inferiores*

D. *A.mentalis*

E. *A.lingualis*

A. A. facialis

*3. Чоловік 28-ми років з різаною раною шкіри **лобової ділянки** був доставлений до лікарні. Для зупинки кровотечі перев'язана **судина, яка кровопостачає** цю ділянку. Яка судина була перев'язана?

A. A.supraorbitalis

B. A.infraorbitalis

C. A.angularis

D. A.dorsalis nasi

E. A.temporalis superficialis

A. A. supraorbitalis

*4. У хворого на рак спинки
язика виникла сильна кровотеча
внаслідок ураження пухлиною
дорзальної артерії язика. Яку
судину перев'язує лікар для
зупинки кровотечі?

А. Язикову артерію

В. Дорзальну артерію языка

С. Глибокої артерії языка

Д. Лицевої артерії

Е. Висхідної артерії глотки

А. Язикову артерію

*5. Хворий, 43 років, звернувся зі скаргою на пухлину на **корені язика**. Хірург стоматолог виявив, що це злоякісна пухлина. Плануючи операцію, він вирішив перев'язати **артерію**, що проходить в **трикутнику Пирогова**. Це:

A. a. palatina ascendens

B. a. lingualis

C. a. profunda linguae

D. a. sublingualis

E. a. suprahyoideum

B. a. lingualis

*6. До хірурга стоматолога привели хворого з вуличною травмою в ділянці **піднижньощелепного трикутника**. Обробляючи рану, лікар побачив, що травмована **артерія, яка іде до м'якого піднебіння**. Яку артерію пошкоджено?

A. A. palatina descendens

B. A. pharyngea ascendens

C. A. facialis

D. A. palatina ascendens

E. A. sphenopalatina

D. A. palatina ascendens

*7. При видаленні ліпоми у хворого біля **крила носу** хірург-стоматолог пошкодив **судину**, що привело до утворення підшкірної гематоми. Яка судина пошкоджена?

A. a. supraorbitalis

B. a. maxillaris

C. a. facialis

D. a. infraraorbitalis

E. a. angularis

C. a. facialis

*8. У травмпункт доставлено пацієнта із кровотечею із рваної рани в ділянці **кута рота.** Цілісність якої **артерії** порушена?

А. передньої верхньої коміркової

В. підочноямкової

С. верхньощелепної

Д. язикової

Е. лицевої

Е. лицевої

*9. В зв'язку з наявністю злоякісної пухлини на язиці, хворому слід його видалити. В якому місці легко знайти **язикову артерію** і перев'язати її?

- A. Трикутнику Пирогова.
- B. В сонному трикутнику.
- C. В лопаточно-підключичному трикутнику.
- D. В лопаточно-трапецієвидному трикутнику.
- E. В лопаточно-трахейному трикутнику.

А. Трикутнику Пирогова.

*10. У потерпілого
спостерігається кровотеча
в ділянці **верхньої губи**.
Яка **артерія** пошкоджена
внаслідок травми?

А. Лицева

В. Язикова

С. Кутова

Д. Поверхнева скронева

Е. Верхньощелепна

А. Лицева

*11. В щелепно-лицеву хірургію доставлено дитину з раною лиця, яка знаходиться вздовж переднього краю жувального м'яза. З рани джерельцем витікає кров. Визначте пошкоджену судину.

A. A. temporalis superficialis

B. A. carotis externa

C. A. facialis

D. A. maxillaris

E. A. lingualis

C. A. *facialis*

*12. Учень першого класу
отримав травму обличчя в
спортивному залі.
Виникла кровотеча з
нижньої губи. Гілки якої
артерії ушкоджені?

A. A. facialis

B. A. infraorbitalis

C. A. maxillaris

D. A. alveolaris superior

E. A. lingualis

A. A. *facialis*

*13. У лікарню після автокатастрофи поступив юнак 18 років. У травматологічному відділенні виявлені численні травми м'яких тканин обличчя в ділянці **медіального кута ока**, які супроводились масивною кровотечею. Який **артеріальний анастомоз** формується у цьому регіоні?

A. A. carotis externa et a. carotis interna

B. A. carotis externa et a. subclavia

C. A. carotis interna et a. subclavia

D. A. subclavia et a. ophthalmica

E. A. carotis interna et a. ophthalmica

A. A. carotis externa et
a. carotis interna

*14. Пацієнт отримав ножове поранення шиї з пошкодженням зовнішньої сонної артерії. Для тимчасової зупинки кровотечі ефективним методом є пальцьове притиснення загальної сонної артерії до поперечного відростка шостого шийного хребця. В якому трикутнику шиї потрібно здійснити пальцьове притиснення сонної артерії для зупинки кровотечі?

- А. сонному трикутнику
- В. піднижньощелепному трикутнику
- С. трикутнику Пирогова
- Д. лопатково-трахеальному трикутнику
- Е. лопатково-ключичному

А. сонному трикутнику

*15. При проведенні оперативного втручання на шії хірургові потрібно виділити зовнішню сонну артерію. Що є анатомічним орієнтиром для встановлення місця початку зазначеної судини на шії?

А. верхній край щитоподібного хряща

В. яремна вирізка

С. кут нижньої щелепи

Д. нижній край щитоподібного хряща

Е. місце початку груднино-ключично-соскоподібного м'яза

А. верхній край щитоподібного
хряща

*16. Хворій Т. проводиться операція на щитоподібній залозі. Гілки яких артерій повинен перев'язати хірург під час операції?

- A. Верхньої та нижньої щитоподібної
- B. Верхньої і нижньої гортанних
- C. Верхню щитоподібну і щитошийний стовбур
- D. Верхню щитоподібну і висхідну артерію шиї
- E. Висхідну і глибоку артерії шиї

А. Верхньої і нижньої щитоподібної

* 17. У хворого під час
трахеотомії виникла
виражена кровотеча. Яка
артерія була травмована під
час операції?

- A. Найнижча щитоподібна артерія
- B. Нижня щитоподібна артерія
- C. Верхня щитоподібна артерія
- D. Верхня гортанна артерія
- E. Нижня гортанна артерія

А. Найнижча щитоподібна артерія