


- ▶ Хворий потрапив до лікарні зі скаргами на раптовий кашель і виникнення задухи. При рентгенологічному обстеженні органів дихання виявлено стороннє тіло в ділянці **bifurcatio tracheae**. На якому рівні розташовано стороннє тіло?


- ▶ A.C7–Th1.
 - ▶ B. Th4–Th5.
 - ▶ C. Th1–Th2.
 - ▶ D.C6–C7.
 - ▶ E. Th6–Th8.
- 

Th4-Th5

- ▶ У клініку доставлено хворого 10 років, який напередодні проковтнув арахісовий горішок, після чого з'явився **безперервний кашель і симптоми ускладненого дихання**. Функцію голосоутворення не порушено. Де може знаходитися це стороннє тіло?

- ▶ А. Лівий головний бронх.
- ▶ В. Правий головний бронх.
- ▶ С. Трахея.
- ▶ D. Присінкова щілина.
- ▶ Е. Голосова щілина.

Правий головний бронх




- ▶ Під час обстеження легенів лікар ввів хворому бронхоскоп у один з часткових бронхів і виявив, що він розділяється на **два сегментарні бронхи**. В якій частці легені лікар проводив маніпуляцію?

- ▶ А. У верхній частці правої легені.
- ▶ В. У середній частці правої легені.
- ▶ С. У нижній частці правої легені.
- ▶ В. У верхній частці лівої легені.
- ▶ Е. У нижній частці лівої легені.

У середній частці правої легені




- ▶ Мати 3-річної дитини звернулася у клініку за швидкою допомогою. Під час бесіди лікар з'ясував, що дитина гралася невеликим металевим предметом (запонкою) і взяла її в рот. Проковтнула або вдихнула дитина цей предмет з'ясувати не вдалося. При рентгеноскопії **стороннє тіло** було виявлене на рівні **5-го грудного хребця** по серединній лінії. Де найімовірніше знаходиться це стороннє тіло?


- ▶ А. У глотці.
 - ▶ В. У трахеї.
 - ▶ С. У стравоході.
 - ▶ D. У лівому головному бронху.
 - ▶ Е. У правому головному бронху.
- 

У трахеї


- ▶ Хворому, госпіталізованому в торакальне відділення лікарні, поставлено діагноз – рак лівої легені. Було проведено операцію пульмонектомія (видалення легені). Одним з етапів операції є перев'язка і перерізування кореня легені, до складу якого входять артерії, вени і бронхи. В якому порядку зверху вниз розташовуються ці структури в **корені лівої легені?**

- ▶ А. Легенева артерія, легеневі вени, головний бронх.
 - ▶ В. Легенева артерія, головний бронх, легеневі вени.
 - ▶ С. Головний бронх, легенева артерія, легеневі вени.
 - ▶ D. Головний бронх, легеневі вени, легенева артерія.
 - ▶ Е. Легеневі вени, головний бронх, легенева артерія.
- 

Легенева артерія, головний бронх,
легеневі вени



- ▶ У хворого 60 років проведено лобектомію **правої верхньої частки легені**. Які сегменти були пошкоджені?

- ▶ А. Бічний, середній, верхній.
 - ▶ В. Верхівковий, задній, передній.
 - ▶ С. Середній основний і бічний основний.
 - ▶ D. Задній основний, верхній і нижній язичковий.
 - ▶ Е. Верхівково–задній.
- 

Верхівковий, задній, передній

- ▶ У клініку госпіталізовано пацієнтку з пухлиною, розташованою в **середній частці правої легені**. Показано операцію. Яку найбільшу кількість сегментів можна видалити у складі цієї частки?

- ▶ A. 3.
- ▶ B. 2.
- ▶ C. 4.
- ▶ D. 5.
- ▶ E. 1.

2.


- ▶ Пацієнтові 50 років з приводу раку легенів проведено **правосторонню** лобектомію (видалення) **верхньої частки легені**. Яку кількість сегментів вилучено при такій операції?

- ▶ А. Чотири сегменти.
- ▶ В. П'ять сегментів.
- ▶ С. Два сегменти.
- ▶ D. Три сегменти.
- ▶ Е. Жодного сегменту.

Три сегменти




- ▶ У хворого діагностовано лівосторонню сегментарну пневмонію. В якому сегменті легені локалізується патологічний процес, якщо додаткові дихальні шуми (крепітація) вислухуються зліва, з боку спини, на рівні VII–X ребер?

- ▶ А. Нижньому язичковому.
 - ▶ В. Медіальному базальному.
 - ▶ С. Латеральному базальному.
 - ▶ D. Передньому базальному.
 - ▶ Е. Задньому базальному.
- 

Задньому базальному



- ▶ Хворому в 3 роки проведено лобектомію **правої середньої частки легені**. Які сегменти були уражені?

- ▶ А. Медіальний і передній.
 - ▶ В. Верхівковий, задній, передній.
 - ▶ С. Бічний і медіальний.
 - ▶ D. Задній і бічний основні.
 - ▶ Е. Верхівково–задній.
- 

Бічний і медіальний



- ▶ У клініку госпіталізовано пацієнтку зі скаргами на кровохаркання, пітливість. Рентгенологічно виявлено вогнище туберкульозу у **верхній частці лівої легені**. Рекомендовано операцію. Яку найбільшу кількість сегментів можна видалити у складі верхньої частки лівої легені?

- ▶ A. 4.
- ▶ B. 5.
- ▶ C. 3.
- ▶ D. 2.
- ▶ E. 1.

5

- ▶ Під час операції на легенях хірург видалив згусток крові з **горизонтальної щілини**. Які частки легені відокремлює ця щілина?

- ▶ А. Нижню і середню частки правої легені.
- ▶ В. Верхню і нижню частки правої легені.
- ▶ С. Верхню і нижню частки лівої легені.
- ▶ D. Верхню і середню частки правої легені.
- ▶ Е. Нижні частки правої і лівої легені.

- ▶ Верхню і середню частки правої легені.

- ▶ Під час операції у пацієнта була видалена частина легені, яка вентилується **бронхом третього порядку**, що супроводжується гілками легеневої артерії та інших судин. Яка частина легені була видалена?

- ▶ А. Верхня частка.
- ▶ В. Сегмент легені.
- ▶ С. Легенева часточка.
- ▶ D. Середня частка.
- ▶ Е. Нижня частка.

Сегмент легені



- ▶ У хірургічне відділення госпіталізовано хворого з ножовим пораненням грудної клітки справа і пневмотораксом (проникнення повітря в плевральну порожнину). Перкуторно **нижня межа правої легені** по середньоключичній лінії піднялася на рівень III ребра. Де в нормі вона повинна знаходитися?

- ▶ A. V ребро.
- ▶ B. VII ребро.
- ▶ C. VIII ребро.
- ▶ D. IX ребро.
- ▶ E. VI ребро.

VI ребро


- ▶ При аускультації (вислуховуванні) легень у хворого 46 років було виявлено сегмент легені з "бронхіальним диханням". Такий дихальний шум не вислуховується у здорових людей. Лікар зробив висновок, що в цьому сегменті сталося порушення структур альвеолярного дерева. Які анатомічні структури **не належать до елементів альвеолярного дерева?**

- ▶ А. Внутрішньосегментні бронхи.
- ▶ В. Альвеолярні ходи.
- ▶ С. Альвеолярні мішечки.
- ▶ D. Альвеоли.
- ▶ Е. Дихальні бронхіоли.


Внутрішньосегментні бронхи




- ▶ У хворого діагностована лівобічна сегментна пневмонія. У якому сегменті легені локалізується патологічний процес, якщо додаткові дихальні шуми (крепітація) вислуховуються зліва, зі сторони спини, **на рівні VII–X ребер?**

- ▶ А Нижньому язичковому
 - ▶ В Присередньому базальному
 - ▶ С Латеральному базальному
 - ▶ D Передньому базальному
 - ▶ Е Задньому базальному
- 

Задньому базальному



- ▶ Хворого госпіталізовано із запаленням легенів. При обстеженні, лікар встановив, що нижня межа правої легені по середньоключичній лінії знаходиться на рівні VIII ребра. На якому рівні, в нормі, розташований **нижній край правої легені** по середньоключичній лінії?


- ▶ A VI ребро
 - ▶ B VII ребро
 - ▶ C VIII ребро
 - ▶ D IX ребро
 - ▶ E X ребро
- 

VI ребро


- ▶ Емфізема легень є хронічним неспецифічним захворюванням, яке характеризується розширенням повітряних просторів **дистальніше термінальних бронхіол.** Які анатомічні структури при цьому патологічно змінені?

- ▶ А. Альвеолярне дерево
- ▶ В. Бронхіальне дерево
- ▶ С. Сегментні бронхи
- ▶ D. Часточкові бронхи
- ▶ Е. Часткові бронхи


Альвеолярне дерево



- ▶ Хворому в 3 роки проведено лобектомію **правої середньої частки легені**. Які сегменти були ураженні?

- ▶ А. Бічний та присередній
 - ▶ В. Верхівковий, задній, передній
 - ▶ С. Присередній і передній основні
 - ▶ D. Задній і бічний основні
 - ▶ Е. Верхівково–задній
- 

Бічний та присередній




У поліклініку звернувся хворий зі скаргами на утруднення при проходженні їжі по стравоходу. При рентгенологічному обстеженні встановлено, що затримка має місце на **рівні 5 грудного хребця**. Пухлина якого органу може стримувати проходження їжі в цьому відділі стравоходу?


- ▶ А. Лівого головного бронху
- ▶ В. Дуги аорти
- ▶ С. Правого головного бронху
- ▶ D. Щитоподібної залози
- ▶ Е. Правої легені

Лівого головного бронху

- ▶ У хворого виражена задишка; рентгенологічно виявлено ексудат у плевральній порожнині. Щоб не пошкодити міжреброві артерії, **пункцію плевральної порожнини** виконують, ураховуючи рівень випоту:

- ▶ А. У місці переходу кісткової частини ребра в хрящову.
 - ▶ В. По нижньому краю вище розміщеного ребра.
 - ▶ С. Посередині між ребрами.
 - ▶ D. У голівки ребра.
 - ▶ Е. По верхньому краю ребра, що лежить нижче.
- 

По верхньому краю ребра, що
лежить нижче.



- ▶ У хірургічне відділення звернувся хворий з **пухлиною в нижній третині стравоходу**. Яка серозна оболонка грудної порожнини може бути пошкоджена при проведенні операції в цій ділянці?

- ▶ А. Діафрагмова плевра.
- ▶ В. Ліва медіастинальна плевра.
- ▶ С. Права реброва плевра.
- ▶ D. Права медіастинальна плевра.
- ▶ Е. Ліва реброва плевра.


Права медіастинальна плевра



- ▶ Хворий 37 років потрапив до пульмонологічного відділення з діагнозом лівобічний ексудативний плеврит. В якому анатомічному утворенні плеври найімовірніше скупиться запальний випіт?

- ▶ А. Реброво – діафрагмовому синусі.
- ▶ В. Реброво – середостінному синусі.
- ▶ С. Діафрагмово – середостінному синусі.
- ▶ D. Усіх вище перерахованих.
- ▶ Е. Куполі плеври.

Риброво – діафрагмовому синусі



- ▶ У чоловіка діагностовано лівобічний **плеврит**, як ускладнення пневмонії. В якому анатомічному утворенні накопичився **ексудат**?

- ▶ А Лівий хребтово–середостінний закуток
- ▶ В Лівий реброво–середостінний закуток
- ▶ С Лівий діафрагмово–середостінний закуток
- ▶ D Лівий реброво–діафрагмовий закуток
- ▶ Е Правий реброво–діафрагмовий закуток

Лівий реброво-діафрагмовий закуток



- ▶ Хворого, 45 років, госпіталізовано до лікарні зі скаргами на високу температуру тіла, біль при диханні, задишку та кашель. Після обстеження, лабораторної та рентгенодіагностики було встановлено діагноз: плеврит. Для евакуації ексудату призначили **плевральну пункцію**. У якому місці плевральної порожнини міститься найбільша кількість ексудату?

- ▶ А. Під коренем легень.
- ▶ В. У діафрагмово-середостінному заутку.
- ▶ С. У реброво-середостінному заутку.
- ▶ D. Під куполом плеври.
- ▶ Е. У реброво-діафрагмовому заутку.

У реброво-діафрагмовому
закутку



- ▶ Хвора 44 років поступила в терапевтичне відділення з діагнозом: правосторонній плеврит. Обстеження хворої підтвердило наявність рідини в плевральній порожнині. В якому **заутку** **плеври** накопичилося найбільше серозної рідини?

- ▶ А. Правий реброво-діафрагмовий
- ▶ В. Правий реброво-середостінний
- ▶ С. Лівий середостінно-діафрагмовий
- ▶ D. Лівий реброво-середостінний
- ▶ Е. Правий середостінно-діафрагмовий

Правий реброво-діафрагмовий

