



Рентгенологічно у пацієнта діагностовано перелом плечової кістки в ділянці міжгорбкової борозни. Сухожилок якого м'яза може бути травмований уламками кістки в першу чергу?



- 
- 
- A. Двоголового м'яза плеча
 - B. Дельтоподібного м'яза
 - C. Великого круглого м'яза
 - D. Широкого м'яза спини
 - E. Великого грудного м'яза




А. Двоголового м'яза плеча



У постраждалого в автокатастрофі посттравматичний
вивих **плечового суглоба**. Яку **зв'язку** було
пошкоджено?


- 
- 
- A. Дзьобо-плечова
 - B. Конусоподібна
 - C. Дзьобо-ключична
 - D. Поперечна зв'язка лопатки
 - E. Дзьобо-плечова та дзьобо-ключична





А. Дзьобо-плечова



Під час підготовки до змагань гімнаст отримав травму з вивихом у **плечовому суглобі**. **Сухожилок** якого м'яза плеча **проходить** всередині порожнини вищезазначеного суглоба і може бути пошкодженим?




- 
- A. Двоголового м'яза плеча
 - B. Триголового м'яза плеча
 - C. Дзьобоплечового м'яза
 - D. Плечового м'яза
 - E. Правильної відповіді немає



А. Двоголового м'яза плеча



Хворий хлопчик 10 років доставлений в травмпункт лікарні з переломом кісток передпліччя. Дитина не може здійснити **супінацію і пронацію передпліччя**. У яких суглобах можливі ці рухи?




A. art. cubiti

B. art. radiocarpea

C. art. radioulnaris distalis

D. art. humeroulnaris

E. art. humeroradialis



C. art. radioulnaris distalis



У постраждалої вивих плечового суглоба. Зрушення (зсув)
яких суглобових поверхонь вийде за межі фізіологічної
норми?




А. Голівка плечової кістки і суглобова западина лопатки

В. Голівка плечової кістки і акроміальний відросток лопатки

С. Голівка плечової кістки і акроміальний кінець ключиці

Д. Суглобова западина лопатки і акроміальний кінець ключиці

Е. Суглобова западина лопатки і грудинний кінець ключиці



А. Голівка плечової кістки і суглобова западина лопатки



➔ У потерпілого перелом у ділянці бічної поверхні **променево-зап'ясткового суглоба**. Де найімовірніше відбувся **перелом**?

- 
- 
- А. Шилоподібний відросток променевої кістки
 - В. Гачкоподібна кістка
 - С. Головчаста кістка
 - D. Шилоподібний відросток ліктьової кістки
 - Е. Нижня третина плечової кістки



■ А. Шилоподібний відросток променевої кістки

- 
- 
- При переломі променевої кістки гіпс повинен фіксувати **обидва променеволіктьові суглоби**, тому, що вони є:




A. Комбінованими

B. Комплексними

C. Складними

D. Простими


E. Багатоосьовими



А. Комбінованими

- 
- 
- У хворого рентгенологічно виявлено осколковий перелом головки плечової кістки з розривом капсули **плечового суглоба**. Де на плечовій кістці прикріплюється **суглобова капсула**?

- 
- 
- A. Шийка лопатки.
 - B. Надплечовий кінець ключиці.
 - C. Анатомічна шийка плечової кістки.
 - D. Хірургічна шийка плечової кістки.
 - E. Дельтоподібна горбистість



С. Анатомічна шийка плечової кістки.

- 
- За даними статистики, найчастіше переломи кісток трапляються як у юнаків, так і у людей похилого віку в ділянці **хірургічної шийки**. На якій кістці знаходиться даний утвір?




A. Talus.

B. Radius.

C. Femur.

D. Fibula.

E. Humerus



E. Humerus



У підлітка ушкоджена проксимальна суглобова
поверхня **променево-зап'ясткового суглоба**. Чим
вона утворена?



- 
- 
- A. Facies artieularis carpalia radii et circumferentia articularis ulnae.
 - B. Facies articularis carpalis radii.
 - C. Facias articularis carpalis radii, discus articularis.
 - D. Os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum,
 - E. Os scaphoideum, os lunatum, os pisiforme.



C. Facias articularis carpalis radii, discus articularis.



Після перелому дистальних відділів кісток передпліччя і іммобілізації, у хворого обмежилися **рухи в променево-зап'ястному суглобі**. Які рухи, властиві цьому суглобу, слід відновити шляхом тривалих тренувань?



А. Згинання-розгинання, обертання.

В.Згинання-розгинання, відведення-приведення, колове обертання.


С.Згинання-розгинання, відведення-приведення.

Д. Згинання-розгинання, кругові рухи.

Е. Згинання-розгинання, кругові рухи, обертання.



В. Згинання-розгинання, відведення-приведення, колове
обертання.





У пацієнта діагностовано патологічну рухливість у плечовому суглобі. На яку відстань можуть віддалятися в нормі суглобові поверхні лопатки та плечової кістки під час рухів у плечовому суглобі?




А. До 1 см.

В. До 2 см.

С. До 3 см.

Д. До 4 см.

Е. До 5 см.



С. До 3 см.




Циркулярною пилкою випадково було пошкоджено м'які тканини кисті між горохоподібною і човноподібною кістками. Які зв'язки при цьому пошкоджено?

- 
- 
- A. Променева колатеральна зв'язка зап'ястка.
 - B. Долонна променезап'ясткова і поперечна зв'язки.
 - C. Ліктьова колатеральна зв'язка зап'ястка.
 - D. Тильна міжзап'ястна зв'язка.
 - E. -



В. Долонна променезап'ясткова і поперечна зв'язки



- 
- 
- У результаті вогнепального поранення **повністю** **разрушена** **головка** **променевої кістки**. Хірург змушений був видалити осколки головки променевої кістки і обривки зв'язок. **Які зв'язки** при цьому були видалені?



А. Променева зв'язка головки стегна.

В. Кругла зв'язка променевої кістки і бічна променева зв'язка.

С. Бічна ліктьова зв'язка і бічна променева зв'язка.

Д. Бічна ліктьова зв'язка.

Е. -





В. Кругла зв'язка променевої кістки і бічна променева зв'язка.



What type of connection is the shoulder joint according to classification is based on the number of articulating surfaces?



- 
- 
- A. Compound
 - B. Synostosis
 - C. Synchrondrosis
 - D. Symphysis
 - E. Simple



E. Simple