


- ▶ При оперативному втручанні з приводу каменів жовчних ходів хірург повинен знайти **загальну печінкову протоку**. Між листками якої зв'язки вона знаходиться?

- ▶ А. Печінково-дванадцятипалокишкової.
- ▶ В. Печінково-шлункової.
- ▶ С. Печінково-ниркової.
- ▶ D. Круглої зв'язки печінки.
- ▶ Е. Венозної зв'язки.


- ▶ Печінково-дванадцятипалокишкової.

- ▶ При дослідженні **жовчний міхур** переповнений жовчю. Яка ділянка **позапечінкових жовчних ходів** патологічно змінена?

- ▶ А. Ліва часткова протока.
 - ▶ В. Міхурова протока.
 - ▶ С. Загальна печінкова протока.
 - ▶ D. Загальна жовчна протока.
 - ▶ Е. -
- 


► Міхурова протока.

- ▶ Під час холецистектомії (видалення жовчного міхура), конкременти (жовчні камінчики) можуть переміститися по широкій **міхуровій протоці в наступні відділи жовчовивідних шляхів**. В якому місці хірург повинен провести огляд?

- ▶ A. Ductus hepaticus communis.
 - ▶ B. Ductus choledochus.
 - ▶ C. Ductus hepaticus dexter.
 - ▶ D. Ductus hepaticus sinister.
 - ▶ E. Ductulus billiferi.
- 


▶ Ductus choledochus.

- ▶ Хворий потрапив в клініку зі скаргами на болі в ділянці живота, нудоту. При пальпації живота лікар-хірург виявив болючу точку на перетині правої ребрової дуги і зовнішнього краю правого прямого м'яза живота (**точка Кера**). Який попередній діагноз найімовірніше поставить лікар?

- ▶ А. Нефрит.
 - ▶ В. Панкреатит.
 - ▶ С. Холецистит.
 - ▶ D. Гастрит.
 - ▶ Е. Дуоденіт.
- 


▶ Холецистит.

- ▶ У хворого з **пухлиною підшлункової залози** розвинулася механічна жовтуха, внаслідок здавлення **жовчновивідної протоки**. Яка протока здавлена?

- ▶ A. ductus choledochus;
 - ▶ B. ductus cysticus;
 - ▶ C. ductus hepaticus communis;
 - ▶ D. ductus hepaticus dexter;
 - ▶ E. ductus hepaticus sinister
- 

- ▶ Ductus choledochus.

- ▶ У хворого з жовчнокам'яною хворобою розвилася механічна жовтуха. При обстеженні встановлено, що камінь знаходиться в загальній жовчній протоці. Які жовчовивідні протоки утворюють обтуровану протоку?

- ▶ A. Ductus hepaticus communis et ductus cysticus;
 - ▶ B. Ductus hepaticus dexter et sinister;
 - ▶ C. Ductus hepaticus dexter et ductus cysticus;
 - ▶ D. Ductus hepaticus sinister et ductus cysticus;
 - ▶ E. Ductus hepaticus communis et ductus choledochus.
- 


- ▶ Ductus hepaticus communis et ductus cysticus.

- ▶ Лікар пальпує у хворого 43 р. **нижній край печінки**. На якому рівні у здорової людини розташована нижня межа печінки ?

- ▶ А. По краю ребрової дуги
- ▶ В. На 2 см нижче краю ребрової дуги
- ▶ С. На 4 см нижче краю ребрової дуги
- ▶ D. На 4 см вище краю ребрової дуги
- ▶ Е. На 3 см нижче краю ребрової дуги


► По краю ребровой дуги

- ▶ Хворому поставлено діагноз: **панкреатит**.
В якій області передньої стінки живота
можна пропальпувати запалений орган?

- ▶ А. Надчеревній і лівому підребер'ї
 - ▶ В. Надчеревній і правому підребер'ї
 - ▶ С. Лівій бічній
 - ▶ D. Пупковій
 - ▶ Е. Правій бічній
- 


▶ Надчеревній і лівому підребер'ї

- ▶ Визначення розмірів печінки дозволило встановити, що по правій середньоключичній лінії верхня її межа знаходиться на рівні IV міжребрового простору, нижній її край виступає з під ребрової дуги на 4 см. Оцініть розміри печінки.

- ▶ А. Печінка збільшена - нижня її межа зміщена донизу.
 - ▶ В. Печінка зменшена - нижня її межа зміщена донизу.
 - ▶ С. Печінка зменшена - нижня її межа зміщена догори.
 - ▶ D. Печінка збільшена - верхня її межа зміщена догори
 - ▶ Е. Розміри печінки нормальні.
- 

- ▶ Печінка збільшена - нижня її межа зміщена донизу.


- ▶ Під час операції, маніпулюючи в ділянці між шлунком та печінкою, хірург остерігався пошкодити **печінково-дванадцятипалу зв'язку**, тому що там знаходиться:

- ▶ А. Спільна жовчна протока, власна печінкова артерія, ворітна вена
 - ▶ В. Спільна жовчна протока, спільна печінкова артерія, ворітна вена печінки.
 - ▶ С. Власна печінкова артерія, шлунково-дванадцятипалокишкова артерія.
 - ▶ D. Ворітна вена печінки, печінкові вени
 - ▶ Е. Нижня порожниста вена, міхурова протока.
- 

- ▶ Спільна жовчна протока, власна печінкова артерія, ворітна вена


Проводячи хірургічне втручання на жовчному міхурі, лікарю необхідно визначити **загальну міхурову протоку**. В якому анатомічному утворенні очеревини вона знаходиться?



- ▶ A. Lig. Hepatoduodenale.
 - ▶ B. Lig. Hepatorenale.
 - ▶ C. Lig. Gastrocolicum.
 - ▶ D. Lig. Duodenorenale.
 - ▶ E. Lig. Hepatogastricum.
- 


▶ Lig. Hepatoduodenale.

- ▶ У хворого 62 років, який звернувся до лікаря зі скаргами на підвищену спрагу, схуднення, прискорене сечовиділення. Був поставлений діагноз: цукровий діабет. Яка залоза уражена?

- ▶ А. Підшлункова залоза
 - ▶ В. Острівці підшлункової залози
 - ▶ С. Гіпофіз
 - ▶ D. Надниркова залоза
 - ▶ Е. Щитоподібна залоза
- 

► Підшлункова залоза

- ▶ Чоловіка госпіталізовано в хірургічне відділення з діагнозом – **розрив селезінки**. В якому анатомічному утворенні буде накопичуватися кров?

- ▶ А. Передшлункова сумка.
 - ▶ В. Печінкова сумка.
 - ▶ С. Чепцева сумка.
 - ▶ D. Ректально–міхурове заглиблення.
 - ▶ Е. Правий бічний канал.
- 

► Передшлункова сумка.

- ▶ У хворого діагностовано виразку **передньої стінки шлунка**. Запалення якого відділу очеревини найімовірніше?

- ▶ А. Печінкової сумки.
- ▶ В. Передшлункової сумки.
- ▶ С. Чепцевої сумки.
- ▶ D. Правого брижового синусу.
- ▶ Е. Лівого брижового синусу.

- ▶ **Передшлункової сумки**

- ▶ У пацієнта перфорація виразки **задньої стінки шлунка**. В яке анатомічне утворення потрапить кров і вміст шлунка?

- ▶ А. Правий бічний канал.
- ▶ В. Передшлункову сумку.
- ▶ С. Чепцеву сумку.
- ▶ D. Лівий бічний канал.
- ▶ Е. Печінкову сумку.


▶ Чепцеву сумку

- ▶ У хворого з деструктивним апендицитом, як ускладнення утворився піддіафрагмовий абсцес. В якому утворенні очеревини він локалізується?

- ▶ А. Лівий бічний канал.
- ▶ В. Передшлункова сумка.
- ▶ С. Чепцева сумка.
- ▶ D. Лівий бічний канал.
- ▶ Е. Печінкова сумка.


► Печінкова сумка

- ▶ У пацієнта після операції (ушивання проникної рани тонкої кишки) сформувався міжкишковий абсцес, який прорвався в праву брижову пазуху. Куди далі може поширитися гнійний ексудат?

- ▶ А. Залишитися у межах пазухи.
 - ▶ В. Потрапити у порожнину малого тазу.
 - ▶ С. Проникнути в засліпокишкову кишеню.
 - ▶ D. Поширитися у праву бічну борозну.
 - ▶ Е. Опуститися в міжсигмоподібну кишеню.
- 

- ▶ **Залишитися у межах пазухи.**

- ▶ У хірургічне відділення після аварії потрапив постраждалий з травматичним **розривом селезінки**, який потребує негайної операції. В якому утворенні очеревини вона розташована?

- ▶ A. Bursa hepatica.
 - ▶ B. Bursa pregastrica.
 - ▶ C. Bursa omentalis.
 - ▶ D. Sinus mesentericus sinister.
 - ▶ E. Sulcus paracolicus sinister.
- 

► Bursa pregastrica

- ▶ У постраждалого ножове поранення в поперекову ділянку справа. Має місце ушкодження **правої нирки**. Які органи заочеревинного простору можуть бути ушкоджені при цьому?

- ▶ А. 12-пала кишка.
- ▶ В. Попереково-ободова кишка.
- ▶ С. Лівий вигин попереково-ободової кишки.
- ▶ D. Низхідний відділ ободової кишки.
- ▶ Е. Початковий відділ порожньої кишки.

12-пала кишка




- ▶ При ревізії порожнини очеревини у хворого з приводу перитоніту виявлено обмежений гнійник біля **кореня брижі сигмоподібної кишки.** В якому утворенні очеревини знаходиться гнійник?

- ▶ А. Лівий бічний канал.
- ▶ В. Правий брижовий синус.
- ▶ С. Правий бічний канал.
- ▶ D. Міжсигмоподібна ямка.
- ▶ Е. Лівий брижовий синус.


▶ Міжсигмоподібна ямка

- ▶ У хворої людини виявлено прорив виразки **горизонтальної частини 12-палої кишки**. У межах якої ділянки локалізуватиметься запальний процес?

- ▶ А. Чепцева сумка.
 - ▶ В. Лівий брижовий синус.
 - ▶ С. Правий бічний канал.
 - ▶ D. Лівий бічний канал.
 - ▶ Е. Правий брижовий синус.
- 

▶ Чепцева сумка

- ▶ У чоловіка 69 років діагностовано пухлину **низхідної ободової кишки**. Перитоніт якої ділянки очеревини спостерігатиметься в разі розпаду пухлини?

- ▶ А. Чепцевої сумки.
 - ▶ В. Правого брижового синуса.
 - ▶ С. Лівого брижового синуса.
 - ▶ D. Передшлункової сумки.
 - ▶ Е. Печінкової сумки.
- 


▶ Лівого брижового синусу

- ▶ У жінки 65 років діагностовано пухлину **висхідної ободової кишки**. Перитоніт якої ділянки очеревини спостерігатиметься в разі розпаду пухлини?

- ▶ А. Правого брижового синуса
- ▶ В. Лівого брижового синуса
- ▶ С. Печінкової сумки
- ▶ D. Передшлункової сумки
- ▶ Е. Чепцевої сумки

Правого брижового синуса


- ▶ A 45-year-old patient was admitted to the surgical department with complaints of abrupt sharp pain in the epigastric region. After examination it was diagnosed: perforated ulcer of the **posterior wall of the stomach**. Where did content of the stomach flow out while perforation?

- ▶ A. To the proventriculus sack
 - ▶ B. To the liver bursa
 - ▶ C. To the omental bursa
 - ▶ D. To the left mesenteric sinus
 - ▶ E. To the right mesenteric sinus
- 

To the omental bursa



- ▶ A surgeon should reach the **omental bursa** to perform an operation on abdominal cavity. How can he reach this part of peritoneal cavity without affecting the integrity of lesser omentum?


- ▶ A. Through the right paracolic sulcus
 - ▶ B. Through the epiploic foramen
 - ▶ C. Through the left paracolic sulcus
 - ▶ D. Through the right mesenteric sinus
 - ▶ E. Through the left mesenteric sinus
- 

Through the epiploic foramen



1. A patient with cholelithiasis fell ill with mechanic jaundice. Examination revealed that the stone was in the **common bile duct**. What bile-excreting ducts make up the obturated duct?


.

- ▶ A. Ductus hepaticus sinister et ductus cysticus
 - ▶ B. Ductus hepaticus dexter et sinister
 - ▶ C. Ductus hepaticus dexter et ductus cysticus
 - ▶ D. Ductus hepaticus communis et ductus cysticus
 - ▶ E. Ductus hepaticus communis et ductus choledochus
- 

Ductus hepaticus communis et ductus cysticus

A surgeon has to find the **common hepatic duct** during the operative intervention on account of concrements in the gall ducts. The common hepatic duct is located between the leaves of:



- ▶ A. Venous ligament
 - ▶ B. Hepatogastric ligament
 - ▶ C. Hepatorenal ligament
 - ▶ D. Round ligament of liver
 - ▶ E. Hepatoduodenal ligament
- 

Hepatoduodenal ligamen

