


Після травми ока виникло нагноєння м'яких тканин **орбіти**. Через який анатомічний утвір гнійний процес може поширитися у **середню черепну ямку**?




- 
- A. Через верхню очноямкову щілину
 - B. Через передній решітчастий отвір
 - C. Через задній решітчастий отвір
 - D. Через нижню очноямкову щілину
 - E. Через вилично-очноямковий отвір




Відповідь А. Через верхню очноямкову щілину

У хворого виявлене руйнування стінки барабанної порожнини з розповсюдженням гною до задньої черепної ямки. Яка із стінок зруйнована?



- 
- 
- A .Paries mastoideus
 - B. Paries membranaceus
 - C. Paries labyrinthicus
 - D .Paries tegmentalis
 - E .Paries jugularis



Відповідь А .Paries mastoideus

Дитина 3-х років поступила в клініку з діагнозом: отит. Є вірогідність розповсюдження гною із барабанної порожнини через **верхню стінку**. Куди може потрапити гній?






A.В середню черепну ямку.

В.У внутрішнє вухо

С.В слухову трубу


D.В зовнішній слуховий прохід

Е.В задню черепну ямку






Відповідь А.В середню черепну ямку


- 
- 
- В лікарню надійшов пацієнт з травмою голови. Діагностовано перелом клиноподібної кістки у ділянці основи **крилоподібного відростка**. Вміст якого з названих каналів може бути пошкоджено?

- 
- 
- А.Лицевий
 - В.М'язово-трубний
 - С.Крилоподібний
 - Д.Сонний
 - Е. Барабанний



■ С.Крилоподібний

- 
- 
- *Під час обстеження пацієнта у відділенні щелепно-лицевої хірургії лікар вивчає **контрфорси верхньої щелепи**. Скільки основних контрфорсів вона має?




➤ A.4

➤ B.6

➤ C.3


➤ D.5


➤ E.2



➡ A.4


- 
- 
- *У пацієнта травма черепа. На рентгенограмі спостерігається лінія перелому основи черепа, що проходить між **овальним та круглим отворами**. Яка кістка черепа ушкоджена?

- 
- 
- А. Потилична
 - В. Решітчаста
 - С. Сконева
 - D. Клиноподібна
 - Е. Вилична



■ D. Клиноподібна

- 
- 
- *При обстеженні пацієнта в відділенні щелепно-лицевої хірургії лікар вивчає **контрфорси нижньої щелепи**.
Скільки основних контрфорсів вона має?




➤ A.4

➤ B.2

➤ C.3


➤ D.5


➤ E.1



➡ B.2

- 
- Хворий 35 років, звернувся до лікаря зі скаргами на сильний нежить і втрату відчуття запахів на протязі тижня. При обстеженні, в носовій порожнині велика кількість слизу, що покриває слизову оболонку і блокує **рецептори нюху**. Де в носовій порожнині розташовані ці рецептори?

- 
- 
- A. Верхня носова раковина
 - B. Середня носова раковина
 - C. Нижня носова раковина
 - D. Загальний носовий хід
 - E. Присінок носа




■ А. Верхня носова раковина



У хворого при гнійному запаленні **носової порожнини** це запалення поширилось у **передню черепну ямку**. Через який анатомічний утвір розповсюдилось запалення?



- 
- 
- Foramina cribrosa
 - Recessus sphenothmoidalis
 - Fissura orbitalis inferior
 - Canalis infraorbitalis
 - Fissura orbitalis superior




Foramina cribrosa



У хворого із гнійним середнім отитом інфекція із барабанної порожнини поширилась на цибулину яремної вени. Анатомічною передумовою цього ускладнення є витончення однієї із стінок барабанної порожнини. Аномалія якої стінки має місце?

- 
- 
- Верхньої
 - Нижньої
 - Бічної
 - Передньої
 - Задньої




Нижньої



*Внаслідок пухлини гіпофізу при рентгенографії виявлено збільшення і руйнування ямки турецького сідла. Стінка якої кісткової порожнини руйнується?

- 
- 
- Пазуха клиноподібної кістки
 - Барабанної порожнини
 - Носової порожнини
 - Пазуха лобової кістки
 - Пазуха верхньої щелепи



Пазуха клиноподібної кістки