

* Під час ДТП водій отримав численні ушкодження бічної поверхні голови, серед яких був **перелом виличної дуги**. Функція якого з м'язів вірогідно буде страждати?

A.M. masseter

B. M. orbicularis oris

C. M. buccinator

Д. M. procerus

E. M. risorius

A. M. masseter

*Хворий не може підняти **опущену вниз** нижню щелепу. Які м'язи не можуть виконати свою функцію?

А. Жувальні

В. Мімічні

С. Коловий мяз рота

Д. Надчерепний

Е. Мяз- підіймач кута рота

А. Жувальні

*Хворий скаржиться на неможливість **бічних рухів** нижньої щелепи.

Який з м'язів найвірогідніше ушкоджено?

A. M. pterygoideus lateralis

B. M. pterygoideus medialis

C. M. buccinators

Д. M. masseter

E. M. risorius

A. M. pterygoideus lateralis

При обстеженні міміки хворого виявлено, що він не може скласти губи трубочкою, не може свистіти, під час сміху кутки рота не піднімаються догори, ротова щілина розтягується в боки (поперечна посмішка). Пацієнт страждає на міопатію – спадкове захворювання із дистрофічним ураженням м'язів. На атрофію якого м'язу вказують дані симптоми?

А. Колового м'яза рота

В. Великого виличного м'язу

С. Шийного м'язу

Д. М'язу сміху

Е. Жувального м'язу

А. Колового м'язу рота

*Чоловік 30 років звернувся до стоматолога зі скаргою на розлади жування, у нього виникає **біль при відтягуванні щелепи назад**.
Запалення якого з жувальних м'язів найвірогідніше встановить лікар.

A. M. temporalis /задні волокна/.

B. M. masseter.

C. M. temporalis /передні волокна/.

Д. M. pterygoideus medialis.

Е. M. pterygoideus lateralis.

A. M. temporalis задні волокна.

При обстеженні міміки хлопчика 8 років виявлено, що він **не може скласти губи трубочкою**, не може **задути свічку**, під час сміху кутки рота не піднімаються догори, а ротова щілина розтягується в боки (поперечна посмішка). На атрофію якого м'язу вказують дані симптоми?

А. Колового м'яза рота

В. Великого виличного м'язу

С. Щічного м'язу

Д. М'язу сміху

Е. Жувального м'язу

А. Колового м'язу рота

При дослідженні хворого лікар визначив, що його язик **не рухається вперед** (не висувається з рота). Який м'яз пошкоджений?

Підборідно-язиковий

Поздовжній м'яз язика

Під'язиково-язиковий

Шило-під'язиковий

Поперечний м'яз язика

Підборідно-язиковий

У дитини травмована **нижня губа**. Який м'яз при цьому ушкоджений?

M. levator labii superioris

M. orbicularis oris

M. buccinator

M. risorius

M. levator anguli oris

M. orbicularis oris

Під час стану емоційного напруження у людини з'явилися
поперечні зморшки на лобі посередині. Скорочення якого
м'яза відбулося?

M. occipitofrontalis

M. temporoparietalis

M. procerus

M. auricularis anterior

M. corrugator supercilii

M. occipitofrontalis

Нормальну оклюзію зубних дуг можна посилити,
відтягнувши нижню щелепу назад. Який м'яз виконує цю
функцію?

А. Скроневий

В. Медіальний крилоподібний

С. Латеральний крилоподібний

Д. Жувальний

Е. Груднинно-ключично-соскоподібний

А. Скроневий

У постраждалого з травмою основи черепа встановлене пошкодження гачкоподібного відростка присередньої пластинки крилоподібного відростка клиноподібної кістки. Функція якого м'яза м'якого піднебіння буде порушена?

A. Напрягача піднебінної завіски

B. Піднебінно-язикового

C. Піднебінно-глоткового

D. М'яза язичка

E. Підіймача піднебінної завіски

А. Напругача піднебінної завіски

У хворого ножове проникне поранення **діафрагми рота**. Який м'яз треба ушити при цьому пораненні, щоб відновити цілісність дна ротової порожнини?

A. M. stylohyoideus

B. M. platysma

C. M. mylohyoideus

D. M. omohyoideus

E. M. sternocleidomastoideus

A. M. stylohyoideus

A man, 30 years old, appealed to a dentist complaining of **mastication disorder**: painful backward movement of the mandible. The doctor detected the inflammation of a masticatory muscle. Which muscle exactly is it?

A. Temporal (posterior fibres)

B. Temporal (anterior fibres).

C. Medial pterygoid

D. Lateral pterygoid

E. Masticatory

A. Temporal (posterior fibres)

A man, 30 years old, appealed to a dentist complaining of **mastication disorder**: painful **backward movement** of the mandible. The doctor detected the inflammation of a masticatory muscle. Which muscle exactly is it?

A. Risorius

B. Greater zygomatic

C. Buccinator

D. Orbicular muscle of mouth

E. Masseter

D. Masseter

During a traffic accident a got multiple injuries of the later; area including jugal bridge fracture. Which muscle function is affected?

A. Masseter

B. Orbicular muscle of mouth

C. Buccinator

D. Procerus

E. Risorius

A. Masseter

5. Right palpebral fissure of a patient is noticeably bigger than the left one. Which facial muscle function is damaged?

- A. Orbicular muscle of eye (orbicularis oculi)
- B. Procerus
- C. Corrugator
- D. Occipitofrontal (frontal belly)
- E. Greater zygomatic

A. Orbicular muscle of eye (orbicularis oculi)