


Жінка похилого віку, госпіталізована з скаргами на різкий біль, набряк в ділянці правого кульшового суглобу, що з'явилася після падіння. При огляді: стегно приведенне всередину, рухи в **кульшовому суглобі** порушені. Перелом, якої **кістки** або її **частини** визначив лікар?




A. шийка стегнової кістки

B. тіло стегнової кістки

C. виростки стегнової кістки

D. лобкова кістка

E. сіднича кістка



А. шийка стегнової кістки



У хворої 70 р. діагностовано перелом шийки лівої стегнової кістки з розривом зв'язки **голівки стегнової кістки**. Гілка якої **артерії** пошкоджена?






A. Затульної


B. Стегнкової

C. Зовнішньої клубової

D. Нижньої клубової

E. Внутрішньої соромітної








A. Затульної



У вагітної жінки 29 р., лікар-акушер визначив розміри таза. За допомогою циркуля була виміряна **відстань** між двома **верхніми передніми клубовими остями**. Який розмір великого таза був визначений?




- 
- 
- A. distantia spinarum
 - B. distantia cristarum
 - C. distantia trochanterica
 - D. conjugata vera
 - E. conjugata anatomica



A. distantia spinarum



На рентгенограмі тазу видно всі **три частини тазової кістки**, відокремлені широкими проміжками, що відповідають невидимому на рентгенограмах хрящу. Про який **вік** суб'єкта можна говорити?




A. До 16 років

B. До 36 років

C. До 46 років

D. До 40 років

E. До 50 років




А. До 16 років



При патологічних пологах у жінки виникло розходження лобкових кісток. Який вид з'єднання кісток постраждав?






A. Симфіз

B. Синдесмоз

C. Синхондроз

D. Синостоз

E. Діартроз



А. Симфіз

Чоловік 45 років, впавши на праве коліно, відчув різкий біль в суглобі. При огляді: сильний набряк на **передній поверхні колінного суглоба**, при рухах чути **хрускіт**. Яка кістка пошкоджена?






A. Наколінок.

B. Шийка стегнової кістки

C. Лівий надвиросток стегнової кістки

D. Правий надвиросток стегнової кістки


E. Головка маломілкової кістки



A. Наколінок



При медичному обстеженні у військкоматі у хлопця 18 років виявлено опускання голівки таранної кістки, що призвело до **плоскостопості**. Із слабкістю якої **зв'язки** стопи це пов'язано?




- 
- 
- А. Підшовної клино-кубоподібної зв'язки
 - В. Таранно-човноподібної зв'язки
 - С. Підшовної п'ятково-човноподібної зв'язки
 - Д. Міжкісткової клино-кубоподібної зв'язки
 - Е. Роздвоєної зв'язки




С. Подошовної п'ятково-човноподібної зв'язки



У хворого на цукровий діабет розвинулася волога гангрена стопи. Йому показана ампутація в ділянці поперечного суглоба заплесна (суглоба Шопара). Яку ключову зв'язку повинні пересікти хірурги для вичленення в даному суглобі?

- 
- 
- A. Lig. talocalcaneum laterale
 - B. Lig. cuneocuboideum dorsale
 - C. Lig. bifurcatum
 - D. Lig. mediale
 - E. Lig. talocalcaneum interosseum




C. Lig.bifurcatum



Дитина 6-ти років внаслідок падіння на гострий предмет
отримала травму м'яких тканин між **мало- і**
великоомілковою кістками. Який вид **з'єднання**
пошкоджений?






А. Зв'язка

В. Шво

С. Мембрана

Д. Джерельце

Е. Вклинення



С. Мембрана



У спортсменів нерідко спостерігається пошкодження менісків колінного суглоба. При якому механізмі травми може відбутися розрив медіального і латерального менісків?

- 
- A. При розриві колатеральних зв'язок
 - B. При розриві хрестоподібних зв'язок
 - C. При пошкодженні зв'язок підколінної ямки
 - D. При вивихах гомілки
 - E. Розрив медіального меніска при ротації гомілки назовні, а латерального – досередини





Е. Розрив медіального меніска при ротації гомілки
назовні, а латерального – досередини






Після травми в ділянці колінного суглоба у хворого спостерігається симптом **«висувної шухляди»**, передньо-заднє зміщення гомілки відносно стегна. Які **зв'язки** пошкоджені?



- 
- 
- А. Хрестоподібні зв'язки
 - В. Дугоподібна підколінна зв'язка
 - С. Коса підколінна зв'язка
 - D. Міжкісткова мембрана
 - Е. Колатеральні зв'язки




■ А .Хрестоподібні зв'язки



Футболіст звернувся до лікаря зі скаргами на раптовий біль в правому колінному суглобі під час гри. При обстеженні встановлено **зміщення латерального меніска**. Які з перерахованих **зв'язок**, найімовірніше, могли бути пошкоджені?


- 
- 
- А. Хрестоподібні і коса
 - В. Хрестоподібні і дугоподібна
 - С. Хрестоподібні і зв'язка надколінка
 - D. Поперечна
 - Е. Хрестоподібні і бічні



■ D. Поперечна



Хірургу необхідно провести видалення частини травмованої стопи по лінії **суглоба Лісфранка**. Яку зв'язку необхідно перетнути?



- 
- 
- А. Надп'яtkовo-чoвнoпoдiбнy
 - В. П'яtkовo-чoвнoпoдiбнaу
 - С. Надп'яtkовo-п'яtkoвy
 - D. Мeдiальнy мiжкiсткoвa зaплeснo-плeснoвy
 - Е. Рoздвoєнy




■ D. Медіальну міжкісткову заплесно-плеснову



У хворого - травма коліна. Коліно в зігнутому під прямим кутом положенні можна переміщувати вперед і назад подібно **висувної шухляди**. Які **зв'язки** розірвані?




- 
- 
- А. Поперечна зв'язка коліна
 - В. Коса і дугоподібна підколінні зв'язки
 - С. Хрестоподібні зв'язки коліна
 - D. Великогомілкова колатеральна, бічний утримувач надколінка
 - Е. Велико- та малогомілкові колатеральні зв'язки




■ С. Хрестоподібні зв'язки коліна



Під час футбольного матчу гравець отримав травму колінного суглоба. На рентгенівській плівці помітний виражений перелом кістки, яка лежить в товщі сухожилля чотириголового м'яза стегна. До якої з перерахованих груп кісток належить ця кістка?

- 
- 
- А. Плоскі
 - В. Сесамоподібні
 - С. Трубчасті
 - D. Повітроносні
 - Е. Змішані




■ В. Сесамоподібні



У потерпілого визначається перелом в ділянці внутрішньої поверхні **лівого надп'яtkово-гомiлкового суглоба**. Де найiмовiрнiше стався **перелом**?



- 
- 
- А. Медіальна кісточка
 - В. Нижня третина малогомілкової кістки
 - С. Надп'яткова кістка
 - D. Латеральна кісточка
 - Е. П'яткова кістка




■ А. Медіальна кісточка



A gynecologist dimensioned the pelvis of a 20-year-old pregnant woman. The **distance** between the **greater trochanters** of the femurs was measured with the help of a pelvimeter. What size of the large pelvis was dimensioned?






A. Anatomical conjugate

B. Intercristal distance

C. True conjugate


D. Interspinous distance

E. Intertrochanteric distance



E. Intertrochanteric distance

A 25-year-old man appealed to a doctor with complaints of movements damage in the knee joint - anteroposterior displacement of the crus about the femur (so-called drawer sign), that appeared after a trauma. What ligaments of the knee joint are injured?




A. Oblique popliteal

B. Cruciate

C. Arcuate popliteal

D. Collateral

E. Interosseous membrane of leg



B. Cruciate