




Хворий страждає з дитинства
симптоматичною епілепсією, при якій
судомний напад є одним із симптомів гліоми
мозку. У хворого судоми супроводжуються
зоровими галюцинаціями, що дозволило
лікаря визначити локалізацію пухлини. В якій
частці великого мозку локалізований процес?


- 
- A. Lobus temporalis.
 - B. Lobus occipitalis.
 - C. Uncus.
 - D. Gyrus supramarginalis.
 - E. Lobus frontalis.




B. Lobus occipitalis.




У хворого, 60 років, після інсульту крім рухових і чутливих порушень, спостерігаються порушення візуально-просторової орієнтації, яка супроводжується емоційними проявами (ейфорією або депресією). Яка ділянка великого мозку уражена у хворого'?

- 
- A. Права півкуля великого мозку.
 - B. Ліва півкуля великого мозку.
 - C. Мозочок.
 - D. Спинний мозок.
 - E. Мозолисте тіло.



А.Права півкуля великого мозку.

У новонародженої дитини **відсутній великий мозок**, кістки склепіння черепа, м'які тканини, ушкоджений задній мозок. Яка вада розвитку кінцевого мозку у дитини?




A. Аненцефалія.

B. Екзенцефалія


C. Ініоненцефалія

D. Агенезія


E. Поренцефалія



А. Аненцефалія.



У хворого, 30 років, після інсульту крім рухових і чутливих порушень, спостерігаються мовні порушення, нездатність рахувати, писати, читати, розуміти написане. Яка ділянка мозку уражена у хворого?




A. Права півкуля мозку.

B. Ліва півкуля мозку.

C. Мозочок.


D. Спинний мозок.

E. Мозолисте тіло.



В. Ліва півкуля мозку.

Лікар-патологоанатом проводив розтин 85-річного чоловіка, померлого після тривалого порушення мозкового кровообігу. При дослідженні головного мозку лікар визначив наявність крововиливу в ділянці кори, що знаходиться між шпорною і тім'яно-потиличною борознами. Як називається ця ділянка кори?




А.Передklinня

В.Гачок.

С.Клин.


Д.Пояс

Е.Парацентральна часточка.



А.Передklinня

У хворого, 40 років, симптоматична епілепсія, при якій судомний напад є проявом обмеженого процесу у корі великого мозку - туберкуломи. У хворого виникають клоніко-тонічні **судоми у ділянці обличчя**, що дозволили безпомилково визначити локалізацію пухлини. В якій ділянці кори великого мозку розташована туберкулома?




A. Нижні ділянки gyrus precentralis.

B. Середні ділянки gyrus precentralis.


C. Gyrus supramarginalis.

D. Gyrus frontalis superior.


E. Верхні ділянки gyrus precentralis.




А.Нижні ділянки gyrus precentralis.




Первинні поля кіркових аналізаторів
представляють собою:


- 
- A. Проекційні зони, де закінчуються чутливі провідні шляхи
 - B. Периферичні зони, які не пов'язані з провідними шляхами, але там відбувається обробка інформації
 - C. Асоціативні зони – перекриття аналізаторів
 - D. Суміжні звивини
 - E. Не має правильної відповіді




А.Проекційні зони, де закінчуються чутливі
провідні шляхи




Вторинні поля кіркових аналізаторів
представляють собою:


- 
- A. Периферичні зони, які не пов'язані з провідними шляхами, але там відбувається обробка інформації
 - B. Проекційні зони, де закінчуються чутливі провідні шляхи
 - C. Асоціативні зони – перекриття аналізаторів
 - D. Суміжні звивини
 - E. Не має правильної відповіді



А. Периферичні зони, які не пов'язані з провідними шляхами, але там відбувається обробка інформації



При вивченні **цитоархітектоніки нової кори**
визначене, що нейрони розташовані шарами.
Визначте їх кількість:




A.6

B.5

C.4


D.3

E.7



A.6

При вивченні цитоархітекτονіки нової кори визначене, що нейрони розташовані шарами. Назвіть **поверхневий шар**:




А.Молекулярна пластинка

В.Зовнішня зерниста пластинка

С.Внутрішня зерниста пластинка


Д.Пірамідна пластинка

Е.Багатоформна пластинка



А.Молекулярна пластинка

При вивченні цитоархітекτονіки нової кори визначене, що нейрони розташовані шарами. Назвіть шар, в якому розташовані великі пірамідні клітини Беца:




А.Пірамідна пластинка

В.Молекулярна пластинка


С.Зовнішня зерниста пластинка

Д.Внутрішня зерниста пластинка


Е.Багатоформна пластинка



А. Пірамідна пластинка



Чим обумовлено розвиток другої сигнальної
системи людини?




А.Розвитком усної та письмової мови

В.Набуттям складних цілеспрямованих рухів

С.Ускладненням рухів


Д.Сприйняттям більш складних подразників

Е.Не має правильної відповіді



А. Розвитком усної та письмової мови

- У хворого органічне ураження частини кінцевого мозку. До кінцевого мозку відносяться:




A. Таламус

B. Півкулі головного мозку

C. Ніжки мозку


D. Міст

E. Мозочок



А. Півкулі головного мозку

У хворого органічне ураження
стародавньої частини кінцевого мозку -
paleocortex . Яка частина півкуль уражена
у хворого?




A. Нюховий мозок

B. Базальні ядра


C. Кора

D. Таламус


E. -




А. НЮХОВИЙ МОЗОК



Третинні поля кори півкуль представляють собою:

- 
- A. Периферичні зони, які не пов'язані з провідними шляхами, але там відбувається обробка інформації
 - B. Проекційні зони, де закінчуються чутливі провідні шляхи
 - C. Асоціативні зони – перекриття аналізаторів, вищий синтез
 - D. Суміжні звивини
 - E. Не має правильної відповіді



А.Асоціативні зони – перекриття аналізаторів,
вищий синтез