

При огляді лікарем у хворого виявлена **стегнова кила**. Через яке анатомічне утворення вона виходить **під шкіру**?

- A. Hiatus saphenus
- B. Anulus femoralis
- C. Canalis adductorius
- D. Lacuna musculorum
- E. Anulus inguinalis superficialis

- Hiatus saphenus

Під час операції з приводу стегнової кили була зачеплена **бічна стінка внутрішнього стегнового кільця**. Який анатомічний утвір зазнав пошкодження?

- A. Стегнова вена
- B. Стегнова артерія
- C. Пахвинна зв'язка
- D. Лакунарна зв'язка
- E. Гребінчаста зв'язка

- **Стегнова вена**

У спортсмена виник біль по ходу сідничого нерва внаслідок стискання його м'язом, що проходить через великий сідничий отвір. Який м'яз був травмований під час фізичних вправ?

- A. Грушоподібний
- B. Внутрішній затульний
- C. Великий поперековий
- D. Клубовий
- E. Зовнішній затульний

- Грушоподібний

Травмований отримав різану рану нижньої третини лівого стегна.
При обстеженні встановлено утруднення **розгинання гомілки в колінному суглобі**. Який м'яз був пошкоджений?

- А. Чотириголовий
- В. Кравецький
- С. Великий привідний
- Д. Клубово-поперековий
- Е. Тонкий

Чотириголовий

У хворого різана рана задньої поверхні
стегна, він не може **зігнути гомілку**. Які
м'язи пошкоджені?

- A. Півсухожилковий, півперетинчастий, двоголовий
- B. Двоголовий, привідний, тонкий
- C. Півсухожилковий, привідний, тонкий
- D. Півсухожилковий, півперетинчастий, тонкий
- E. Двоголовий, привідний, кравецький

Півсухожилковий, півперетинчастий,
двоголовий

У хірургічну клініку доставлений чоловік 29 років з рваною раною правої сідничної ділянки. При обстеженні виявлена глибока рана з пошкодженням м'язів. У положенні, лежачи на животі, хворий не може підвести праву ногу, тобто затруднене **розгинання стегна**. Функція якого м'яза ймовірно усього порушена?

- A. m. gluteus maximus
- B. m. tibialis anterior
- C. m. quadriceps femoris
- D. m. triceps surae
- E. m. peroneus longus

- m. gluteus maximus

До травматологічного відділення був доставлений хворий з пошкодженням нижньої третини передньої поверхні лівого стегна. При обстеженні виявлена рана розміром 1,5 х 3 см, яка розташована поперечно відносно стегна, на 2 см вище наколінка. У рані добре визначався пошкоджений сухожилок м'яза. У хворого сильно **обмежене розгинання гомілки**. Функція якого м'яза, ймовірноше усього, порушена?

- A. m. quadriceps femoris
- B. m. tibialis anterior
- C. m. extensor digitorum longus
- D. m. triceps surae
- E. m. peroneus longus

- m. quadriceps femoris

Після травми хворий не може утримувати тіло у вертикальному положенні, не може **піднятись навшпиньки**.
Функція якого м'яза порушена ?

- A. M. triceps surae
- B. M. tibialis anterior
- C. M. extensor digitorum longus
- D. M. fibularis longus
- E. M. extensor hallucis longus

M. triceps surae

До травмпункту міської клінічної лікарні звернувся пацієнт зі скаргами на те, що після стрибка з висоти **гомілка** **закидається вперед** і не повертається у вихідне положення. Який діагноз можна виставити?

- A. Розрив ахіллового сухожилка.
- B. Відсутність латеральної голівки m. gastrocnemius.
- C. Перелом великогомілкової кістки.
- D. Перелом малогомілкової кістки.
- E. Розрив підшовного м'яза.

- Розрив ахіллового сухожилка

Внаслідок аварії у постраждалого сильний біль і набряк передньої поверхні гомілки, **тильне згинання стопи утруднене**. Функція якого з названих м'язів гомілки вірогідно постраждала?

- A. M. peroneus brevis
- B. B. M. flexor digitorum longus
- C. M. flexor hallucis longus
- D. M. peroneus longus
- E. M. tibialis anterior

- M. tibialis anterior

Спортсмен-баскетболіст скаржиться на **біль вище п'яти**,
що підсилюється під час ходіння. Сухожилок якого з м'язів
вірогідно ушкоджено?

- A. M. fibularis longus
- B. M. tibialis posterior
- C. M. flexor digitorum longus
- D. M. triceps surae
- E. M. fibularis brevis

- M. triceps surae

В санпропускник доставили чоловіка з різаною раною підшви правої стопи. У потерпілого **обмежене підняття латерального края стопи**. При обробці в рані пошкоджений сухожилок м'яза. Який м'яз пошкоджений?

- А. Довгий малогомілковий
- В. Передній великогомілковий
- С. Довгий розгинач пальців
- Д. Триголовий м'яз гомілки
- Е. Короткий малогомілковий

Довгий малогомілковий

Під час фінальної гри баскетболіст пошкодив праву гомілку, внаслідок чого стало неможливо **згинати праву стопу**. Лікар команди встановив, що пошкоджено сухожилок. Сухожилок якого м'язу пошкоджено?

- А. Триголового м'язу литки (ахіллового сухожилку)
- В. Довгого м'язу-розгинача великого пальця
- С. Переднього великогомілкового м'яза
- Д. Двоголового м'язу стегна
- Е. Кравецького м'язу

Триголового м'язу литки (ахіллового сухожилку)

У спортсмена разрив **ахіллового сухожилка**. Визначте, який м'яз пошкоджений?

- A. Довгий малогомілковий
- B. Передній великогомілковий
- C. Довгий м'яз-згинач пальців
- D. Триголовий м'яз литки
- E. Задній великогомілковий

Триголовий м'яз литки

У чоловіка глибока рублена рана стопи в ділянці **тильної
поверхні першої плеснової кістки**. Які м'язи пошкоджені
при травмі?

- A. Короткий і довгий м'язи-згиначі великого пальця
- B. Передній великогомілковий м'яз і м'язи-згиначі великого пальця
- C. Довгий м'яз-розгинач і м'яз-згинач великого пальця
- D. Довгий і короткий м'яз-розгинач великого пальця
- E. Короткий м'яз-розгинач пальців і відвідний м'яз великого пальця

Довгий і короткий м'яз-розгинач великого пальця

У травмованого глибоке поперече поранення нижньої третини задньої поверхні гомілки. **Тил стопи піднятий доверху.** Який сухожолок пошкоджений?

А. Пятковий

В. Довгого м'яза-згинача пальців

С. Довгого малогомілкового м'язу

Д. Довгого м'яза-розгинача пальців

Е. Заднього великогомілкового м'язу

П'ятковий

В травматологічне відділення звернувся чоловік 30 р. з різаною раною підошовної ділянки лівої стопи. У хворого **обмежене піднімання латерального краю стопи**. Функція якого м'яза імовірноше всього порушена?

- A. Довгого малогомілкового м'язу
- B. Переднього великогомілкового м'язу
- C. Довгого м'яза-згинача великого пальця стопи
- D. Триголового м'язу литки
- E. Камбалоподібного м'язу

- Довгого малогомілкового м'язу

У клініку доставлена дитина 8 років з різаною раною підошви правої ноги. При хірургічній обробці виявлена глибока рана з розтином сухожика м'яза на підошвовій поверхні, ближче до бічного краю стопи. У хворого **обмежене підняття бічного краю стопи.**

Функція якого м'яза, ймовірно, порушена?

- A. m. peroneus longus
- B. m. tibialis anterior
- C. m. extensor digitorum longus
- D. m. quadriceps femoris
- E. m. triceps surae

m. peroneus longus

During a game a basketball-player injured his right leg in consequence of which he **couldn't bend the right foot**. A doctor detected that tendons were injured. The tendon of what muscle was injured?

- A. Triceps surae
- B. Extensor hallucis longus
- C. Tibialis anterior
- D. Biceps femoris
- E. Sartorius

A. Triceps surae

A man, 30 years old, appealed to a traumatologist with an incised wound of the left foot plantar region. The injured had problems with lifting the lateral border of the foot. What muscle function was affected?

- A. Triceps surae
- B. Tibialis anterior
- C. Flexor hallucis longus
- D. Peroneus longus
- E. Soleus

D. Peroneus longus