*Хворий 30 років, із запаленням пульпи 2-го верхнього моляра, звернувся до лікаря зі скаргами на головний біль та слизові виділення з носа.Після огляду йому встановили діагноз – пульпіт, ускладнений синуситом. До якої з пазух потрапила інфекція від кореня зуба?

A. А.Лобової
B. В.Верхньощелепної
C. С.Клиноподібної
D. D.Решітчастої
E. Е.Соскоподібних комірок

- В.Верхньощелепної



- *Після перенесеного ГРЗ у хворої спостерігається затруднене носове дихання, підвищена температура, головні болі, сльозовиділення болючість при пальпації в ділянці fossa canina справа. Запаленням якої пазухи ускладнилось захворювання?

A. Sinus maxillaris dexter
B. Sinus frontalis dexter
C. Sinus shenoidalis dexter
D. Cellulae ethmoidales anteriores
E. Cellulae ethmoidales posteriores

A.Sinus maxillaris dexter

*Лікар прогнозує можливість запалення клітковини орбіти при гнійному запаленні в ділянці підочноямкового отвору. Через яке з утворення можливе поширення інфекції?

A.Canalis pterigoideus

B.Canalis nasolacrimalis

C.Canalis incisivus

D.Canalis infraorbitalis

E.Fissura orbitalis inferior

- D.Canalis infraorbitalis



*Під час обстеження пацієнта у відділенні щелепно-лицевої хірургії лікар вивчає контрфорси верхньої щелепи. Скільки основних контрфорсів вона має?

- A.4
- B.6
- C.3
- D.5
- E.2

A.4



*У хворого травматолог діагностував перелом кістки ділянці іклової ямки. На якій кістці розташована дана ямка?

- A.Нижня щелепа
- B. Верхня щелепа
- C. Лобова кістка
- D. Піднебінна кістка
- E. Вилична кістка

В. Верхня щелепа



*У потерпілого травмована верхня щелепа - вибитий перший малий корінний зуб. Який відросток верхньої щелепи пошкоджено?

- A.Альвеолярний
- B.Виличний
- C.Очноямковий
- D.Піднебінний
- E.Лобовий

- А.Альвеолярний

- *У пацієнта після екстракція 7 верхнього зуба в лунці з'явилося повітря. Стінка якої приносової пазухи найімовірніше пошкоджена у цьому разі?

- A.Гайморової пазухи
- B.Клиноподібної пазухи
- C.Середні комірки решітчастої пазухи
- D.Задні комірки решітчастої пазухи
- E.Лобової пазухи

- А.Гайморової пазухи



*Машина швидкої медичної допомоги доставила в лікарню чоловіка з черепно-мозковою травмою. Після рентгенологічного дослідження лікар встановив перелом кістки черепа. Лінія перелому проходить через вінцевий відросток. Яка кістка травмована?

A.Верхня щелепа
B.Нижня щелепа
C.Лобова кістка
D.Піднебінна кістка
E.Вилична кістка

В.Нижня щелепа



*У потерпілого з вогнепальним пораненням куля пройшла крізь кістку черепа біля підборідного отвору. Яка кістка пошкоджена?

A. Нижня щелепа

B. Верхня щелепа

C. Лобова

D. Піднебінна

E. Вилична

- А. Нижня щелепа

- *У постраждалого травма верхньої щелепи з пошкодженням підочноямкового отвору. Яка поверхня щелепи ушкоджена?

A.Передня
B.Носова
C. Очна
D. Підскронева
-

А.Передня



- *У потерпілого правосторонній перелом середньої третини нижньої щелепи. Який канал може бути ушкоджений?

?

A. Нижньощелепний
B.Нижній очноямковий
C.Малий піднебінний
D. Великий піднебінний
E.Крилоподібний

- А. Нижньощелепний



- * На рентгенограмі діагностовано перелом кістки, лінія перелому проходить вздовж щелепно-під’язикової лінії. Яка кістка пошкоджена?

A.Нижня щелепа
B. Скронева
C. Верхня щелепа
D.Тім’яна
E. Потилична

А.Нижня щелепа



*Лікарю-стоматологу для знеболення необхідно ввести анестетик у крило-піднебінну ямку із ротової порожнини. В ділянці якої анатомічної структури потрібно робити ін’єкцію?

A.Великий піднебінний отвір
B.Піднижньоочноямковий отвір
C. Різцевий канал
D.Нижньощелепний отвір
E.Підборідний отвір

А.Великий піднебінний отвір



- *Хворого госпіталізовано з остеомієлітом верхньої щелепи, внаслідок чого відбулося розплавлення стінки орбіти. Яка стінка очної ямки пошкоджена?

A.Нижня
B.Медіальна
C.Верхня
D.Латеральна
-

А.Нижня


Fissura orbitalis superior
Верхня очноямкова щілина
Os frontale Лобова кістка
Os sphenoidale
Клиноподібна кістка
Incisura supraorbitalis
Надочноямкова щілина
Canalis opticus Зоровий канал
Os palatinum
Піднебінна кістка
Os nasalis
Носова кістка
Os maxilla
Верхня щелепа
Os zygomaticum
Виличні кістка
Fissura orbitalis inferior
Нижня очноямкова щілина
Sulcus infraorbitalis
Підочноямкова борозна
Foramen infraorbitalis
Підочноямковий отвір
Os ethmoidale
Решетчаста кістка
Os lacrimale
Сльозова кістка
Sulcus lacrimalis
Сльозова борозна

- *Під час рентгенівського дослідження була виявлена деформація нижньої стінки правої очниці. Який параназальний синус найімовірніше уражений?

A.Права верхньощелепна пазуха
B.Клиноподібна пазуха
C. Лобна пазуха
D.Правий решітчастий лабіринт
E. Лівий решітчастий лабіринт

- А.Права верхньощелепна пазуха

- *У хворого ускладнення нежиті.Рентгенологічно встановлено скупчення гною у верхньощелепній пазусі зліва. У який носовий хід виділяється гній?

A.У лівий середній носовий хід
B.У правий нижній носовий хід
C.У правий верхній носовий хід
D. У правий загальний носовий хід
E. У правий носоглотковий хід

- А.У лівий середній носовий хід



- *При обстеженні пацієнта в відділенні щелепно-лицевої хірургії, лікар вивчає контрфорси нижньої щелепи. Скільки основних контрфорсів вона має?

A.2
B. 1
C.3
D.4
E. 5

A.2



*У хворого відкритий рот, він не може його закрити і членороздільно говорити. Яке ураження у хворого?

A.Вивих нижньої щелепи
B.Стрес
C.Перелом нижньої щелепи
D.Параліч жувальних м’язів
E.Ураження рухового центру мови

А.Вивих нижньої щелепи



- * У хворої дитини 10 днів від народження провели операцію з приводу розщеплення верхньої губи (“заяча губа”). Розщеплення верхньої губи є наслідком:

- A .Незрощення лобового і верхньощелепних відростків І-ої зябрової дуги
- B. Незрощення піднебінних валиків верхньощелепних відростків І-ої зябрової дуги
- C. Незрощення другої зябрової дуги
- D. Незрощення третьої зябрової дуги
- E. Незрощення верхньо- і нижньощелепних відростків І-ої зябрової дуги

- А. Незрощення лобового і верхньощелепних відростків І-ої зябрової дуги

*У відділення хірургічної стоматології поступила новонароджена дівчинка, яка при смоктанні починала поперхатися. При обстеженні виявлена розщілина твердого піднебіння, яка була наслідком незрощення середнього лобового відростка з верхньощелепним відростком І-ої зябрової дуги. В якій ділянці піднебіння знаходилась розщілина? Між:

- A.Os incisivum et processus palatinus maxillae
- B. Processus palatinus maxillae dextrae et sinistrae
- C. Lamina horizontalis os palatinum dextrum et sinistrum
- D. Processus palatinus maxillae et lamina horizontalis os palatinum
- E. В ділянці canalis incisivus

- A.Os incisivum et processus palatinus maxillae



- *Хворий поступив у ЛОР-відділення з діагнозом гайморит (запалення верхньощелепної пазухи). Яким чином інфекція могла проникнути в гайморову пазуху?

- A. Через середній носовий хід
- B. Через передню черепну ямку
- C. Через верхній носовий хід
- D. Через середню черепну ямку
- E. Через нижній носовий хід

- А. Через середній носовий хід



- *У дитини встановлена вроджена розщілина верхньої губи (“заяча губа”) та переднього відділу піднебіння (“вовча паща”). Незрощення яких відростків викликаний цей дефект?

- A. Носового, піднебінного
- B. Верхньощелепного, лобового
- C. Піднебінного, нижньощелепного
- D. Нижньощелепного, носового
- E. Носового, лобового

- А. Носового, піднебінного

- *У хворого рідка їжа через верхню стінку ротової порожнини потрапляє у носову порожнину внаслідок ушкодження кісткового утвору. Який анатомічний утвір ушкоджений?

- A. Глотковий отвір слухової труби (трубний валик).
- B. Тверде піднебіння.
- C. М’яке піднебіння.
- D. Корінь язика.
- E. Коловий м’яз рота.

- В. Тверде піднебіння



* У новонародженого є дефект у вигляді серединної розщілини нижньої щелепи. Незрощення яких відростків призводить до таких аномалій розвитку?

- A. Нижньощелепних
- B. Верхньощелепних
- C. Піднебінних
- D. Лобових
- E. Виличних

А. Нижньощелепних

- * У хворого гайморитом порушено сполучення верхньощелепної пазухи з середнім носовим ходом. Яке утворення в нормі забезпечує надходження повітря з носового ходу до гайморової пазухи?

- A. Hiatus semilunaris
- B. Infundibulum ethmoidale
- C. Foramina ethmoidalia
- D. Recessus sphenopalatinus
- E. Canalis nasolacrimalis

- A. Hiatus semilunaris



- * У хірургічне відділення доставлено чоловіка, 22 років, з вогнепальним пораненням голови. Встановлено ушкодження шийки нижньої щелепи (collum mandibulae). Який відросток нижньої щелепи ушкоджений?

- A. Виростковий відросток (processus condylaris).
- B. Вінцевий відросток (processus coronoideus).
- C. Верхня підборідна ость (spina mentalis superior)
- D. Язичок нижньої щелепи (lingula mandlbulae).
- E. Нижня підборідна ость (spina mentalis inferior)

- А. Виростковий відросток (processus condylaris).



- * До хірурга звернулась жінка з гнійним запаленням шкіри в ділянці підочноямкового отвору. Лікар прогнозує можливість поширення запалення в очну ямку. Через який анатомічний утвір можливо поширення інфекції в даному випадку?

- A. Canalis incisivus.
- B. Canalis pterygoideus.
- C. Canalis nasolacrimalis.
- D. Canalis infraorbitalis.
- E. Fissura orbitalis inferior

- D. Canalis infraorbitalis.



- * Після пластичної операції на піднебінні у хлопчика виникло ускладнення у вигляді запалення кістки в ділянці розташування малих піднебінних отворів (foramina palatine minora). Яка кістка уражена запаленням?

- A. Верхня щелепа (maxilla).
- B. Решітчаста кістка (os ethmoidaie).
- C. Лобова кістка (os frontale).
- D. Клиноподібна кістка (os sphenoidale).
- E. Піднебінна кістка (os palatinum)

- Е. Піднебінна кістка (os palatinum)