

- Хворий скаржиться на **болі у правій клубовій ділянці**. При пальпації визначається рухлива, м'яка, хвороблива кишка. Яку кишку пальпує лікар?

- А. Порожню.
- В. Сигмоподібну.
- С. Поперечну ободову.
- D. Висхідну ободову.
- Е. Сліпу.

- Сліпу.

- Хворий скаржиться на болі у **верхньому відділі пупкової ділянки**. Пальпаторно визначається рухлива хвороблива кишка. Яку кишку пальпує лікар?

- А. Поперечно-ободову.
- В. Порожню.
- С. Дванадцятипалу.
- D. Клубову.
- Е. Сигмоподібну ободову.

- Поперечно-ободову.

- Під час оперативного втручання з приводу ущемленої пупкової грижі в гризовому мішку була виявлена **кишка з відростками серозної оболонки, які містять жирову тканину**. Який відділ кишки був ущемлений?

- А. Дванадцятипала кишка.
- В. Поперечна ободова кишка.
- С. Порожня кишка.
- В. Клубова кишка.
- Е. Сліпа кишка.

- Поперечна ободова кишка.

- У хворого гострий **апендицит**, що за своєю клінічною картиною схожий з **печінковою колькою**. При якому положенні червоподібного відростка це можливо?

- А. Низхідному.
- В. Медіальному.
- С. Висхідному.
- D. Бічному.
- Е. Ретроцекальному.

- Висхідному.

- У хворого об'єктивно клінічна картина гострого апендициту: гострий ниючий біль у **правій поперековій ділянці**. Який тип розміщення апендикса можна припустити:

- А. Латеральний.
- В. Низхідний.
- С. Висхідний.
- D. Медіальний.
- Е. Ретроцекальний ретроперитонеальний.

- Ретроцекальний ретроперитонеальний.

- У хворого виявлено пухлину **початкового відділу товстої кишки**. Визначте локалізацію пухлини.

- A. caecum
- B. colon ascendens
- C. colon sigmoideum
- D. colon descendens
- E. rectum

- caecum

- Захворювання печінки і жовчного міхура може симулювати апендицит при наступному положенні червоподібного відростка:

- А. Висхідне
- В. Низхідне
- С. Медіальне
- D. Латеральне
- Е. Ретроцекальне

- Висхідне

- Постраждалий доставлений до хірургічного відділення із проникаючим пораненням у **лівій бічній ділянці живота**. Який відділ кишки, найімовірніше, ушкоджений?

- A. Colon descendens
- B. Colon ascendens
- C. Colon transversus
- D. Cecum
- E. -

Colon descendens

- Під час оперативного втручання з приводу защемленої пупкової грижі в грижовому мішку було виявлено **кишку з відростками серозної оболонки, які містять жирову тканину.** Який відділ кишки був защемлений?

- А. Поперечна ободова кишка
- В. Дванадцятипала кишка
- С. Порожня кишка
- D. Клубова кишка
- Е. Сліпа кишка

- Поперечна ободова кишка

- У хворого чоловіка пухлина **задньої стінки сечового міхура**. Який комплект органів, вірогідніше всього, може бути залучений в процес?

- А. Пряма кишка, сім'яні міхурці, ампула сім'явиносної протоки
- В. Передміхурова залоза
- С. Пряма кишка, передміхурова залоза
- D. Чоловічий сечівник
- Е. Ампула сім'явиносної протоки

- Пряма кишка, сім'яні міхурці, ампула сім'явиносної протоки

- До лікарні звернувся хворий 52 років. При обстеженні виявлено пухлину **початкового відділу товстої кишки**. Визначте локалізацію пухлини.

- A. colon descendens
- B. colon ascendens
- C. colon sigmoideum
- D. caecum
- E. rectum

- caecum

У хворого **правостороння** защемлена пахвинна кила (грижа). У грижовому мішку петля **кишки, яка має поздовжні стрічки**. Відрізок якої кишки защемлене?

А.Сліпої

В.Сигмоподібної

С.Прямої.

Д.Клубової.

Е.Порожньої

А.Сліпої

Хворий, 27 років, страждає від нестерпного болю в животі. Для уточнення діагнозу хворому призначена лапаротомія, під час проведення якої хірург розтинає передню черевну стінку і бачить тонку і товсту кишки. Лікар **відрізняє товсту кишку від тонкої**, тому що вона має все, **крім:**

- A. Жирової оболонки.
- B. Випинів.
- C. Стрічок.
- D. Чепцевих привісків.
- E. Великого діаметру.

А. Жирової оболонки.

Під час оперативного втручання з приводу резекції частини поперечної ободової кишки хірург розтинає послідовно:

- A. Серозну оболонку, підсерозний прошарок, м'язову оболонку, підслизовий прошарок, слизову оболонку.
- B. Підсерозний прошарок, м'язову оболонку, слизову оболонку.
- C. Серозну оболонку, м'язову оболонку, підслизовий прошарок.
- D. Підсерозний прошарок, м'язову пластинку слизової оболонки, слизову оболонку.
- E. Серозну оболонку, слизову оболонку, м'язову пластинку слизової оболонки

А. Серозну оболонку, підсерозний прошарок,
м'язову оболонку, підслизовий прошарок,
слизову оболонку.

Класичним симптомом гострого апендициту є пальпаторна чутливість у точці Мак-Бернея, яка розташована у присередній третині лінії, що з'єднує:

- А.Верхню передню клубову ость з пупком
- В.Верхню передню клубову ость та лобковий симфіз
- С.Нижню передню клубову ость з пупком
- Д.Нижню передню клубову ость та лобковий симфіз
- Е.Праву та ліву передні клубові ості

А.Верхнюю переднюю клубовую ость з
пупком