

1. Інфекційний **мононуклеоз**, виявлений у чоловіка 27 років, супроводжується симптомами апендициту, що пов'язано зі збільшенням **лімфатичних вузлів черевної порожнини**. Вкажіть групу **лімфатичних вузлів**, ураження якої призвело до виникнення **больового синдрому**.

- A. Клубово-ободові вузли
- B. Сигмоподібні вузли
- C. Ліві ободові вузли
- D. Ліві поперекові вузли
- E. Нижні діафрагмові вузли

А. Клубово-ободові вузли

2. У чоловіка з'явився біль, набряк та почервоніння шкіри у передньо-верхній частині стегна та великого пальця стопи. Які лімфатичні вузли нижньої кінцівки відреагували на запальний процес ?

А. Поверхневі пахвинні

В. Глибокі пахвинні

С. Внутрішні клубові

Д. Поверхневі клубові

Е. Загальні клубові

А. Поверхневі пахвинні

3. Хворий скаржиться на постійну припухлість і біль пахвинних лімфатичних вузлів. Які утворення лімфатичних вузлів є причиною цього явища ?

А. фолікули лімфатичних вузлів

В. оболонка лімфатичних вузлів

С. мозкова речовина лімфатичних вузлів

Д. ретикулярна строма лімфатичних вузлів

Е. крайові піхви лімфатичних вузлів

А. фолікули лімфатичних вузлів

4. У хворого запальний гнійний процес шкіри першого міжпальцевого проміжку ноги. Які лімфатичні вузли є регіональними для вказаної ділянки і прореагують болем та припухлістю?

- А. Поверхневі пахвинні
- В. Поверхневі та глибокі пахвинні
- С. Передні великогомілкові
- Д. Задні великогомілкові та підколінні
- Е. Зовнішні клубові

А. Поверхневі пахвинні

5. У хворого панарицій
1 пальця стопи. Які
лімфатичні вузли
будуть страждати в
першу чергу ?

- A. Nodi lymphatici poplitei
- B. Nodi lymphatici inguinales
profundi
- C. Nodi lymphatici iliaci externi
- D. Nodi lymphatici iliaci interni
- E. Nodi lymphatici inguinales
superficiales

E. Nodi lymphatici inguinales superficiales

6. Хворому Д. 75 років,
поставлений діагноз **рак**
прямої кишки.

В які **регіональні**
лімфатичні вузли можливе
поширення метастазів?

А. У нижні брижові вузли

В. У поперекові

С. У грудну лімфатичну
протоку

Д. У верхні брижові вузли

Е. У приміхурові

А. У нижні брижові вузли

7. Хворий звернувся в поліклініку на третій день після травми. У потерпілого виявлено рану шкіри **медіального краю стопи** з ознаками запального процесу. Є підозра на поширення інфекції з рани по **лімфатичних** судинах. Які лімфатичні судини є **регіонарними** для вказаної ділянки шкіри?

А. глибокі пахвинні

В. задні великогомілкові

С. підколінні

Д. передні великогомілкові

Е. поверхневі пахвинні

А. глибокі пахвинні

8. У потерпілого виявлено рану шкіри **латерального краю стопи** з ознаками запального процесу. Підозрюється поширення інфекції лімфатичним шляхом. Які **лімфатичні вузли** потрібно обстежити в першу чергу?

- А. глибокі підколінні
- В. поверхневі підколінні
- С. задні великогомілкові
- Д. передні великогомілкові
- Е. пахвинні

А. глибокі підколінні

9. У чоловіка з'явився біль, набряклість і почервоніння шкіри в медіально-верхній частині стегна і великого пальця стопи. Які лімфатичні вузли нижньої кінцівки відреагували на запальний процес?

- А. глибокі пахвинні
- В. поверхневі пахвинні
- С. внутрішні клубові
- Д. поверхневі клубові
- Е. загальні клубові

В. поверхневі пахвинні

10. У важкоатлета під час підйому штанги виник **розрив грудної лімфатичної протоки.**

Вкажіть найбільш ймовірне місце пошкодження.

- А. аортальний розтвір діафрагми
- В. заднє середостіння
- С. попереково-крижове з'єднання
- Д. місце впадіння в венозний кут
- Е. ділянка шиї

А. аортальний розтвір діафрагми

11. У хворого діагностовано злоякісну пухлину **черевної частини стравоходу**. Яка група лімфатичних вузлів є **регіонарною** для зазначеного відділу стравоходу?

A. anulus lymphaticus cardiae

B. немає відповіді

C. nodi lymphatici paratrachealis

D. nodi lymphatici prevertebralis

E. nodi lymphatici pericardiales

A. anulus lymphaticus cardiae

12. Жінці, 50 років, планується провести забір лімфи з **грудної протоки в місці впадіння її в венозне русло.** Де воно розташоване?

- A. у лівому венозному куті
- B. у правому венозному куті
- C. у місці формування нижньої порожнистої вени
- D. у місці формування верхньої порожнистої вени
- E. у місці формування ворітної вени

А. у лівому венозному куті

13. Куди треба провести
катетер для забору лімфи з
грудної лімфатичної
протоки?

- A. У правий венозний кут
- B. У лівий венозний кут
- C. У верхню порожнисту вену
- D. У нижню порожнисту вену
- E. У ліву пахвову вену

В. У лівий венозний кут

14.Хворому 40 років для аналізу діагностичних тестів, необхідно взяти лімфу з грудної протоки у ділянці її впадіння у венозне русло. Де знаходиться місце впадіння грудної протоки в венозне русло?

- ▶ Лівий венозний кут
- ▶ Місце утворення нижньої порожнистої вени
- ▶ Місце утворення верхньої порожнистої вени
- ▶ Місце утворення плечоголовної вени
- ▶ Правий венозний кут

► Лівий венозний кут

15. У хворого має місце
запальний гнійний процес
шкіри першого
міжпальцевого проміжку
стопи. Які лімфатичні вузли
є регіонарними для вказаної
ділянки і прореагують
болем?

- ▶ поверхневі пахвинні
- ▶ підколінні
- ▶ передні
великогомілкові
- ▶ задні великогомілкові
- ▶ зовнішні клубові

поверхневі пахвинні