



У пацієнта діагностовано компресійний **перелом поперекового хребця**. При цьому різко збільшилась кривизна лордозу поперекового відділу хребта. З ушкодженням якої зв'язки може супроводжуватись така зміна **кривизни** хребтового стовпа?



- 
- A. Передня поздовжня зв'язка
 - B. Задня поздовжня зв'язка
 - C. Жовта зв'язка
 - D. Клубово-поперекова зв'язка
 - E. Міжостиста зв'язка



А. Передня поздовжня зв'язка






Під час проходження медкомісії у пацієнта 25 років виявлено патологічний тип грудної клітки. При цьому поперечні розміри зменшені, а **груднина виступає вперед**. Визначте **тип** грудної клітки.

- 
- 
- A. Кілеподібна грудна клітка
 - B. Лійкоподібна грудна клітка
 - C. Плоска грудна клітка
 - D. Циліндрична грудна клітка
 - E. Бочкоподібна грудна клітка



A. Кілеподібна грудна клітка



Хворому необхідно зробити пункцію плевральної порожнини. В якій частині міжреберного простору слід провести голку?




В нижній частині міжреберного простору, по верхньому краю ребра.

- В.** Посередині міжреберного простору на рівній віддалі від країв сусідніх ребер.
- С.** У верхній частині міжреберного простору, по нижньому краю ребра.
- Д.** У задній частині міжреберного простору, по нижньому краю ребра.
- Е.** В передній частині міжреберного простору, посередині віддалі між краями сусідніх ребер.



А. В нижній частині міжреберного простору, по
верхньому краю ребра





У хворого **вивих плечового суглоба**. Яка **зв'язка** була пошкоджена в даному випадку?






А. Дзьобо-плечова

В. Поперечна зв'язка лопатки

С. Дзьобо-акроміальна

Д. Акроміально-лопаткова


Е. Дзьобо-лопаткова



А. Дзьобо-плечова



У пацієнта при огляді в клініці був виявлений патологічний тип грудної клітки. При цій аномалії **мечоподібний відросток** був сильно зміщений **назад**, утворюючи поглиблення в нижній частині передньої грудної стінки. Визначите **тип** аномалії.



A. Воронкоподібна грудна клітка (шевця)

B. Бочкоподібна грудна клітка

C. Кілеподібна грудна клітка

D. Конічна грудна клітка


E. Циліндрична грудна клітка




А. Воронкоподібна грудна клітка (шевця)



У хворого діагноз вивих **акроміального кінця ключиці**. При цьому виявлений розрив зв'язок акроміально-ключичного суглоба. Які **зв'язки** пошкоджені?





- 
- 
- A. Ligg.coracoclaviculare et acromioclaviculare
 - B. Ligg.collaterale ulnare et radiale
 - C. Ligg.sacrotuberale et sacrospinale
 - D. Ligg.cruciatum anterius et posterius
 - E. Ligg.collaterale tibiale et fibulare



A. Ligg.coracoclaviculare et acromioclaviculare

- 
- Важливим топографічним орієнтиром тіла людини є **реберна дуга**. Хрящами яких ребер вона **утворена**?


- 
- 
- А.3 1 по 7
 - В.3 7 по 10
 - С.3 1 по 12
 - D.3 11 по 12
 - Е.Тільки 12




■ В.3 7 по 10




X-ray examination of a patient has shown a
thoracic spine disk herniation. What kind of
vertebrae conjugation has undergone
pathological changes?



- 
- 
- A. Diarthrosis
 - B. Articulation
 - C. Synchondrosis
 - D. Syndesmosis
 - E. Synostosis




C. Synchronosis





The patient was observed: severe headache, stiff neck muscles, repeated vomiting, pain on percussion of the skull, increased sensitivity to light stimuli. The diagnosis - meningitis. A victim needed in lumbar puncture. Name regions are used for the punctures of the vertebral canal.

- 
- 
- A. Between the L2 and L3
 - B. Between the Th12 and L1
 - C. Between the Th11 and L2
 - D. Between the Th10 and L1
 - E. Between the Th11 and Th12



A. Between the L2 and L3

