




Під час пірнання хлопець вдарився головою об дно озера. При огляді виявляється різка **болючість шиї**, слабкість у верхніх кінцівках, повертання голови здійснити не може. Які **кістки** можуть бути пошкоджені?


- 
- 
- A. Шийні хребці
 - B. Лобна кістка
 - C. Під'язикова кістка
 - D. Лопатка
 - E. Ключиця



Відповідь. А.Шийні хребці



У пораненого кровотеча із гілок сонної артерії. Для тимчасового припинення кровотечі, сонну артерію треба притиснути до горбика поперечного відростка шийного хребця . Якого саме?




A. II

B. V


C. IV

D. III


E. VI




Відповідь E.VI



Для встановлення границі між шийним та грудними відділами хребта, лікар повинен пальпаторно знайти відросток **VII шийного хребця**. Що це за відросток?

- 
- 
- A. Соскоподібний
 - B. Поперечний
 - C. Верхній суглобовий
 - D. Нижній суглобовий
 - E. Остистий



Відповідь Е.Остистий




У травмованого кровотеча з рани в ділянці голови. В якому місці слід притиснути **сонну артерію** для тимчасової зупинки кровотечі?



- A. До переднього горбка на поперечному відростку 6-го шийного хребця.
- B. До хребта у верхній частині шиї.
- C. До переднього горбка на поперечному відростку 4-го шийного хребця.
- D. До переднього горбка на поперечному відростку 5-го шийного хребця.
- E. До переднього горбка на поперечному відростку 7-го шийного хребця.



Відповідь А. До переднього горбка на поперечному відростку 6-го шийного хребця.



Дівчина під час виконання гімнастичних вправ, глибоко присівши, вдарилася об тверду поверхню ділянки крижі. Наступного дня вона стала відчувати різкий біль у місці удару, особливо при спробі сісти та ходінні. При огляді **крижової ділянки** під шкірою у її нижній третині лікарем виявлений кровопідтік. Які **кістки** можуть бути пошкоджені?




А.Куприкова кістка

В.Стегнова кістка

С.Лобкова кістка

Д.Сіднична кістка

С.Груднина





Відповідь. А.Куприкова кістка



У хворої дитини 10-ти років визначається спинномозкова **грижа** ділянці XII грудного хребця. **Незрощення** (щілина) якої анатомічної структури призвело до випинання спинного мозку?




A.Тіла хребця

В.Міжхребцевого диска


С.Суглобових відростків


Д.Остистих відростків


Е.Дуги хребця



Відповідь Е.Дуги хребця

- 
- 
- Під час дослідження кровотоку в судинах головного мозку лікар встановлює **датчик над артерією**, що проходить у поперечних отворах **шийних хребців**. Яку артерію обстежує лікар?

- 
- 
- A.A. vertebralis
 - B.A. basilaris
 - C.A. carotis interna
 - D.A. cerebri anterior
 - E.A. carotis externa



➡ A.A. vertebralis



1. To establish the border between cervical and thoracic spines a doctor palpate the process C_{VII} . What process is this?



A. Transverse


B. Spinous

C. Superior articular


D. Inferior articular

E. Mastoid





➡ B. Spinous



Зуб осьового хребця має:



Верхівку та основу


Головку та тіло

Відростки

Верхній та нижній кінець

Праву та ліву половини





Верхівку та основу



До якого виду кісток належать хребці?




Змішані

Довгі


Короткі

Плоскі

Повітроносні




Змішані




Під час огляду дитини 10 років педіатр виявив у грудному відділі виражений вигин хребетного стовпа вліво. Який діагноз можна поставити пацієнтові?

- 
- 
- Грудний сколіоз
 - Грудний лордоз
 - Грудний кіфоз
 - Грудний кіфосколіоз
 - Грудний лордосколіоз




Грудний сколіоз



Під час травми хребта порушено
кровопостачання задньої частки
головного мозку. Який з відділів
хребетного стовпа було
травмовано?

- 
- 
- Шийний відділ
 - Грудний відділ
 - Поперековий відділ
 - Крижовий відділ
 - Куприковий відділ



Шийний відділ

- 
- 
- Хворий після аварії отримав травму хребця, який не має тіла. Визначте локалізацію пошкодження:



C I

C II

C III

C IV

C VI




CI



Вкажіть шийний хребець, який має
найбільш довгий остистий відросток:

-




➤ Перший

➤ Третій


➤ Сьомий

➤ П'ятий

➤ Шостий




Сьомий



■ Через яке анатомічне утворення крижової кістки можна зробити епідуральну анестезію?

- 
- 
- Os coccygis
 - Hiatus sacralis
 - Pars lateralis
 - Cornua coccygea
 - Canalis sacralis



Hiatus sacralis