







*Хворий 30 років, із запаленням пульпи **2-го верхнього моляра**, звернувся до лікаря зі скаргами на головний біль та слизові виділення з носа. Після огляду йому встановили діагноз – **пульпіт, ускладнений синуситом**. До якої з пазух потрапила інфекція від кореня зуба?

- 
- 
- A. А.Лобової
 - В. В.Верхньощелепної
 - С. С.Клиноподібної
 - D. D.Решітчастої
 - Е. Е.Соскоподібних комірок

■ В.Верхньощелепної



- 
- 
- *Після перенесеного ГРЗ у хворої спостерігається затруднене носове дихання, підвищена температура, головні болі, слюзовиділення болючість при пальпації в ділянці **fossa canina справа**. Запаленням якої пазухи ускладнилось захворювання?


- 
- 
- A. Sinus maxillaris dexter
 - B. Sinus frontalis dexter
 - C. Sinus shenoidalis dexter
 - D. Cellulae ethmoidales anteriores
 - E. Cellulae ethmoidales posteriores

A.Sinus maxillaris dexter






*Лікар прогнозує можливість запалення клітковини орбіти при гнійному запаленні в ділянці **підочноямкового отвору**. Через яке з утворення можливе поширення інфекції?


- 
- 
- A. Canalis pterigoideus
 - B. Canalis nasolacrimalis
 - C. Canalis incisivus
 - D. Canalis infraorbitalis
 - E. Fissura orbitalis inferior


➡ D.Canalis infraorbitalis





*Під час обстеження пацієнта у відділенні щелепно-лицевої хірургії лікар вивчає **контрфорси верхньої щелепи**. Скільки основних контрфорсів вона має?





➤ A.4


➤ B.6

➤ C.3

➤ D.5


➤ E.2


A.4






*У хворого травматолог діагностував перелом кістки ділянці **іклової ямки**. На якій **кістці** розташована дана ямка?




- 
- 
- А. Нижня щелепа
 - В. Верхня щелепа
 - С. Лобова кістка
 - D. Піднебінна кістка
 - Е. Вилична кістка

В. Верхня щелепа





*У потерпілого травмована верхня щелепа - вибитий перший малий корінний зуб. Який відросток верхньої щелепи пошкоджено?


- 
- 
- А.Альвеолярний
 - В.Виличний
 - С.Очноямковий
 - D.Піднебінний
 - Е.Лобовий

➤ А.Альвеолярний






➡ *У пацієнта після екстракція 7 верхнього зуба в лунці з'явилося повітря. Стінка якої приносової пазухи найімовірніше пошкоджена у цьому разі?

- 
- 
- А.Гайморової пазухи
 - В.Клиноподібної пазухи
 - С.Середні комірки решітчастої пазухи
 - D.Задні комірки решітчастої пазухи
 - Е.Лобової пазухи


■ А.Гайморової пазухи






*Машина швидкої медичної допомоги доставила в лікарню чоловіка з черепно-мозковою травмою. Після рентгенологічного дослідження лікар встановив **перелом кістки черепа**. Лінія перелому проходить через **вінцевий відросток**. Яка кістка травмована?






A.Верхня щелепа
В.Нижня щелепа
С.Лобова кістка
D.Піднебінна кістка
Е.Вилична кістка

В.Нижня щелепа





*У потерпілого з вогнепальним пораненням куля пройшла крізь кістку черепа біля підборідного отвору. Яка кістка пошкоджена?



А. Нижня щелепа

В. Верхня щелепа

С. Лобова

Д. Піднебінна

Е. Вилична


➡ А. Нижня щелепа





➡ *У постраждалого травма верхньої щелепи з пошкодженням підчонамкового отвору. Яка поверхня щелепи ушкоджена?






А.Передня
В.Носова
С. Очна
D. Підскронева

-

А.Передня




- 
- 
- *У потерпілого правосторонній перелом **середньої третини нижньої щелепи**. Який канал може бути ушкоджений?




?

- A. Нижньощелепний
- B. Нижній очноямковий
- C. Малий піднебінний
- D. Великий піднебінний
- E. Крилоподібний

■ А. Нижньющелепный




- 
- 
- * На рентгенограмі діагностовано перелом кістки, лінія перелому проходить вздовж **щелепно-під'язикової лінії**. Яка кістка пошкоджена?




А. Нижня щелепа
В. Сконева
С. Верхня щелепа
D. Тім'яна
Е. Потилічна

А. Нижня щелепа






➡ *Лікарю-стоматологу для знеболення необхідно ввести анестетик у крило-піднебінну ямку із ротової порожнини. В ділянці якої анатомічної структури потрібно робити ін'єкцію?


- 
- A. Великий піднебінний отвір
 - B. Піднижньоочноюмковий отвір
 - C. Різцевий канал
 - D. Нижньощелепний отвір
 - E. Підборідний отвір


А. Великий піднебінний отвір





➡ *Хворого госпіталізовано з **остеомієлітом** верхньої щелепи, внаслідок чого відбулося розплавлення **стінки орбіти**. Яка стінка очної ямки пошкоджена?






А.Нижня
В.Медіальна
С.Верхня
D.Латеральна


-

А.Нижня





➡ *Під час рентгенівського дослідження була виявлена деформація нижньої стінки правої очниці. Який параназальний синус найімовірніше уражений?

- 
- 
- A. Права верхньощелепна пазуха
 - B. Клиноподібна пазуха
 - C. Лобна пазуха
 - D. Правий решітчастий лабіринт
 - E. Лівий решітчастий лабіринт


■ А. Права верхньощелепна пазуха






■ *У хворого ускладнення нежиті. Рентгенологічно встановлено скупчення гною у **верхньощелепній пазусі зліва**. У який носовий хід виділяється **гній**?



- 
- 
- A. У лівий середній носовий хід
 - B. У правий нижній носовий хід
 - C. У правий верхній носовий хід
 - D. У правий загальний носовий хід
 - E. У правий носоглотковий хід

■ А.У лівий середній носовий хід



- 
- 
- *При обстеженні пацієнта в відділенні щелепно-лицевої хірургії, лікар вивчає **контрфорси нижньої щелепи**. Скільки основних контрфорсів вона має?



A.2


B. 1

C.3

D.4


E. 5


A.2







➡ *У хворого відкритий рот, він не може його закрити і **членороздільно говорити**. Яке ураження у хворого?



- 
- А.Вивих нижньої щелепи
 - В.Стрес
 - С.Перелом нижньої щелепи
 - Д.Параліч жувальних м'язів
 - Е.Ураження рухового центру мови

А. Вивих нижньої щелепи



- 
- 
- * У хворої дитини 10 днів від народження провели операцію з приводу **розщеплення верхньої губи** (“заяча губа”). Розщеплення верхньої губи є наслідком:

- 
- 
- А. Незрощення лобового і верхньощелепних відростків І-ої зябрової дуги
 - В. Незрощення піднебінних валиків верхньощелепних відростків І-ої зябрової дуги
 - С. Незрощення другої зябрової дуги
 - D. Незрощення третьої зябрової дуги
 - Е. Незрощення верхньо- і нижньощелепних відростків І-ої зябрової дуги


- А. Незрощення лобового і верхньощелепних відростків І-ої зябрової дуги




*У відділення хірургічної стоматології поступила новонароджена дівчинка, яка при смоктанні починала поперхатися. При обстеженні виявлена **розщілина твердого піднебіння**, яка була наслідком незрощення середнього лобового відростка з верхньощелепним відростком І-ої зябрової дуги. В якій ділянці піднебіння знаходилась розщілина? Між:

- 
- 
- A. Os incisivum et processus palatinus maxillae
 - B. Processus palatinus maxillae dextrae et sinistrae
 - C. Lamina horizontalis os palatinum dextrum et sinistrum
 - D. Processus palatinus maxillae et lamina horizontalis os palatinum
 - E. В ділянці canalis incisivus


► A. Os incisivum et processus palatinus maxillae



- 
- *Хворий поступив у ЛОР-відділення з діагнозом гайморит (запалення верхньощелепної пазухи). Яким чином інфекція могла проникнути в гайморову пазуху?


- 
- 
- A. Через середній носовий хід
 - B. Через передню черепну ямку
 - C. Через верхній носовий хід
 - D. Через середню черепну ямку
 - E. Через нижній носовий хід

➤ А. Через середній носовий хід





➡ *У дитини встановлена вроджена розщілина верхньої губи (“заяча губа”) та переднього відділу піднебіння (“вовча паща”). Незрошення яких відростків викликаний цей дефект?

- 
- 
- А. Носового, піднебінного
 - В. Верхньощелепного, лобового
 - С. Піднебінного, нижньощелепного
 - D. Нижньощелепного, носового
 - Е. Носового, лобового


➤ А. Носового, піднебінного






➡ *У хворого рідка їжа через **верхню стінку ротової порожнини** потрапляє у носову порожнину внаслідок ушкодження кісткового утвору. Який анатомічний утвір ушкоджений?




- 
- 
- А. Глотковий отвір слухової труби (трубний валик).
 - В. Тверде піднебіння.
 - С. М'яке піднебіння.
 - D. Корінь язика.
 - Е. Коловий м'яз рота.


В. Тверде піднебіння





➤ * У новонародженого є дефект у вигляді **серединної розщілини нижньої щелепи**. Незрощення яких відростків призводить до таких аномалій розвитку?



- 
- 
- А. Нижньощелепних
 - В. Верхньощелепних
 - С. Піднебінних
 - D. Лобових
 - Е. Виличних

➤ А. Нижньощелепних

ВАДИ РОЗВИТКУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ



Серединна розщілина нижньої
губи і нижньої щелепи



Серединна розщелина
верхньої губи



Макростомія




Вовча паща




Роздвоєння язика




Аглосія


- 
- 
- * У хворого гайморитом порушено **сполучення верхньощелепної пазухи з середнім носовим ходом**. Яке утворення в нормі забезпечує надходження повітря з носового ходу до гайморової пазухи?

- 
- 
- A. Hiatus semilunaris
 - B. Infundibulum ethmoidale
 - C. Foramina ethmoidalia
 - D. Recessus sphenopalatinus
 - E. Canalis nasolacrimalis


► A. Hiatus semilunaris




- 
- * У хірургічне відділення доставлено чоловіка, 22 років, з вогнепальним пораненням голови. Встановлено ушкодження **шийки нижньої щелепи** (collum mandibulae). Який відросток нижньої щелепи ушкоджений?

- 
- 
- А. Виростковий відросток (processus condylaris).
 - В. Вінцевий відросток (processus coronoideus).
 - С. Верхня підборідна ость (spina mentalis superior)
 - D. Язичок нижньої щелепи (lingula mandibulae).
 - Е. Нижня підборідна ость (spina mentalis inferior)


➤ А. Виростковий відросток (processus condylaris).





- 
- * До хірурга звернулась жінка з гнійним запаленням шкіри в ділянці підочноямкового отвору. Лікар прогнозує можливість поширення запалення в очну ямку. Через який анатомічний утвір можливо поширення інфекції в даному випадку?

- 
- 
- A. Canalis incisivus.
 - B. Canalis pterygoideus.
 - C. Canalis nasolacrimalis.
 - D. Canalis infraorbitalis.
 - E. Fissura orbitalis inferior

► D. Canalis infraorbitalis.



- 
- 
- * Після пластичної операції на піднебінні у хлопчика виникло ускладнення у вигляді запалення кістки **в ділянці розташування малих піднебінних отворів** (foramina palatine minora). Яка кістка уражена запаленням?

- 
- 
- А. Верхня щелепа (maxilla).
 - В. Решітчаста кістка (os ethmoidale).
 - С. Лобова кістка (os frontale).
 - D. Клиноподібна кістка (os sphenoidale).
 - Е. Піднебінна кістка (os palatinum)

■ Е. Піднебінна кістка (os palatinum)

