

Рентгенологічно у пацієнта діагностовано перелом плечової кістки в ділянці міжгорбкової борозни. Сухожилок якого м'яза може бути травмований уламками кістки в першу чергу?






A. Двоголового м'яза плеча


B. Дельтоподібного м'яза

C. Великого круглого м'яза

D. Широкого м'яза спини

E. Великого грудного м'яза






А. Двоголового м'яза плеча



У постраждалого в автокатастрофі посттравматичний
вивих **плечового суглоба**. Яку **зв'язку** було
пошкоджено?



- 
- 
- A. Дзьобо-плечова
 - B. Конусоподібна
 - C. Дзьобо-ключична
 - D. Поперечна зв'язка лопатки
 - E. Дзьобо-плечова та дзьобо-ключична





А. Дзьобо-плечова



Під час підготовки до змагань гімнаст отримав травму з вивихом у **плечовому суглобі**. **Сухожилок** якого м'яза плеча **проходить** всередині порожнини вищезазначеного суглоба і може бути пошкодженим?



- 
- A. Двоголового м'яза плеча
 - B. Триголового м'яза плеча
 - C. Дзьобоплечового м'яза
 - D. Плечового м'яза
 - E. Правильної відповіді немає




А. Двоголового м'яза плеча



Хворий хлопчик 10 років доставлений в травмпункт лікарні з переломом кісток передпліччя. Дитина не може здійснити **супінацію і пронацію передпліччя**. У яких суглобах можливі ці рухи?






A. art. cubiti

B. art. radiocarpea

C. art. radioulnaris distalis

D. art. humeroulnaris

E. art. humeroradialis



C. art. radioulnaris distalis



У постраждалої вивих **плечового суглоба**. Зрушення (зсув)
яких **суглобових поверхонь** вийде за межі фізіологічної
норми?






А. Голівка плечової кістки і суглобова западина лопатки

В. Голівка плечової кістки і акроміальний відросток лопатки

С. Голівка плечової кістки і акроміальний кінець ключиці

Д. Суглобова западина лопатки і акроміальний кінець ключиці

Е. Суглобова западина лопатки і грудинний кінець



А. Голівка плечової кістки і суглобова западина лопатки



➔ У потерпілого перелом у ділянці бічної поверхні **променево-зап'ясткового суглоба**. Де найімовірніше відбувся **перелом**?

- 
- 
- А. Шилоподібний відросток променевої кістки
 - В. Гачкоподібна кістка
 - С. Головчаста кістка
 - D. Шилоподібний відросток ліктьової кістки
 - Е. Нижня третина плечової кістки



■ А. Шилоподібний відросток променевої кістки

- 
- 
- При переломі променевої кістки гіпс повинен фіксувати **обидва променеволіктьові суглоби**, тому, що вони є:




A. Комбінованими

B. Комплексними

C. Складними

D. Простими

E. Багатоосьовими



А. Комбінованими

- 
- 
- У хворого діагноз вивих акроміального кінця ключиці. При цьому виявлений розрив зв'язок акроміально-ключичного суглоба. Які зв'язки пошкоджені?


- 
- 
- A. Ligg.coracoclaviculare et acromioclaviculare
 - B. B. Ligg.collaterale ulnare et radiale
 - C. C. Ligg.sacro tuberale et sacrospinale
 - D. D. Ligg.cruciatum anterius et posterius
 - E. E. Ligg.collaterale tibiale et ibulare



A. Ligg.coracoclaviculare et acromioclaviculare

- 
- 
- ➔ У хворого рентгенологічно виявлено осколковий перелом головки плечової кістки з розривом капсули **плечового суглоба**. Де на плечовій кістці прикріплюється **суглобова капсула**?


- 
- 
- A. Шийка лопатки.
 - B. Надплечовий кінець ключиці.
 - C. Анатомічна шийка плечової кістки.
 - D. Хірургічна шийка плечової кістки.
 - E. Дельтоподібна горбистість



С. Анатомічна шийка плечової кістки.

- 
- 
- У підлітка - травматичний вивих плечового суглоба з розривом зв'язки, що утворює склепіння плеча. Яка зв'язка травмована?

- 
- 
- A. Lig. coracoacromiale.
 - B. Lig. coracoclaviculare.
 - C. Lig. coracohumerale.
 - D. Lig. acromioclaviculare.
 - E. Lig. conoideum.



A. Lig. coracoacromiale.

- 
- За даними статистики, найчастіше переломи кісток трапляються як у юнаків, так і у людей похилого віку в ділянці **хірургічної шийки**. На якій кістці знаходиться даний утвір?




A. Talus.

B. Radius.

C. Femur.

D. Fibula.

E. Humerus



E. Humerus



У підлітка ушкоджена проксимальна суглобова поверхня променево-зап'ясткового суглоба. Чим вона утворена?

- 
- 
- A. Facies artieularis carpalia radii et circumferentia articularis ulnae.
 - B. Facies articularis carpalis radii.
 - C. Facias articularis carpalis radii, discus articularis.
 - D. Os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum,
 - E. Os scaphoideum, os lunatum, os pisiforme.




C. Facias articularis carpalis radii, discus articularis.


- 
- 
- Внаслідок травми (падіння) виник повний вивих надплечового кінця ключиці, він виступає над плечем. Пальпація ділянки **надплечово-ключичного суглоба** дуже болюча. Які зв'язки були розірвані під час травми?

- 
- 
- A. Ligg. acromioclaviculare, trapesoideum, conoideum.
 - B. Ligg. sternoclavicularia anterius et posterius.
 - C. Ligg. costoclaviculare, interclaviculare.
 - D. -
 - E. Ligg. Coracohumerale, coracoclaviculare.




A. Ligg. acromioclaviculare, trapesoideum, conoideum.



- 
- 
- На рентгенограмі лікар помилково прийняв *tuberculum conoideum* на нижній поверхні ключиці за запальний процес окістя. Яка зв'язка фіксується до *tuberculum conoideum clavicales*?

- 
- 
- A. Lig. acromioclaviculare.
 - B. Lig. sternoclaviculare anteriorus
 - C. Lig. sternoclaviculare posterius.
 - D. Lig. coracoacromiale.
 - E. Lig. interclaviculare.





A. Lig. acromioclaviculare.



What type of connection is the shoulder joint according to classification is based on the number of articulating surfaces?



- 
- 
- A. Compound
 - B. Synostosis
 - C. Synchondrosis
 - D. Symphysis
 - E. Simple



E. Simple