

- У приймальний покій лікарні доставлено хворого К. 65 років з **гострою затримкою сечі**. При огляді лікар встановив, що у хворого обструкція сечівника, пов'язана з патологією органа, який його охоплює. Про який орган йдеться?

- А. Сім'яний канатик.
- В. Яєчко.
- С. Сім'яна бульбашка.
- D. Передміхурова залоза.
- Е. Придаток яєчка.

Передміхурова залоза

- У новонародженого хлопчика при огляді зовнішніх статевих органів виявлено щілину сечівника, яка відкривається на **нижній поверхні статевого члена**. Про яку аномалію розвитку йдеться?

- А. Гіпоспадію.
- В. Гермафродитизм.
- С. Епіспадію.
- В. Монорхізм.
- Е. Крипторхізм.

- Гіпоспадію

- Молодий чоловік звернувся до лікарні зі скаргами на порушення сечовипускання. При обстеженні зовнішніх статевих органів виявлено, що **сечівник розщеплений зверху** і сеча витікає через цей отвір. Який вид аномалії розвитку зовнішніх статевих органів спостерігається в цьому випадку?

- А. Парафімоз.
- В. Фімоз.
- С. Гермафродитизм.
- D. Епіспадія.
- Е. Гіпоспадія.

- Епіспадія

- Хворому 20 років, звернувся у поліклініку зі скаргами на печіння і гнійні виділення при сечовиділенні. Для підтвердження діагнозу йому призначено бактерійний посів з сечівника. Лікар, виконуючи цей посів, бере слиз з **човноподібної ямки**. В якій частині сечівника розташована ця ямка?

- А. Печериста.
- В. Губчаста.
- С. Передміхурова.
- D. Перетинкова.
- Е. Цибулинна

- Губчаста

- При **катетеризації сечівника** чоловіка було травмовано слизову оболонку. В якій частині найбільш вірогідне пошкодження слизової оболонки сечівника?

- A. Pars cavernosa.
- B. Pars spongiosa.
- C. Pars membranacea.
- D. Pars prostatica.
- E. Pars bulbaris.

- Pars membranacea

- Чоловік 75 років потрапив в урологічне відділення зі скаргами на виражені болі внизу живота, відсутність сечі, неможливість самотійного сечовипускання. При огляді урологом встановлено діагноз: **аденома** (доброякісна пухлина) передміхурової залози. Показано **катетеризацію** сечового міхура. Яка послідовність проходження катетера через відділи сечівника?

- А. Перетинчаста, передміхурова, губчаста.
- В. Губчаста, передміхурова, перетинчаста.
- С. Перетинчаста, губчаста, передміхурова.
- D. Передміхурова, перетинчаста, губчаста.
- Е. Губчаста, перетинчаста, передміхурова.

- Губчаста, перетинчаста, передміхурова

- При огляді новонародженого хлопчика лікарем-неонатологом виявлено вроджену ваду розвитку, що проявилась наявністю на нижній (задній) поверхні статевого члена щілини довжиною 7 мм, через яку виділяється сеча. Така аномалія називається:

- А. Монорхізм
- В. Епіспадія
- С. Фімо́з
- D.Крипторхізм
- Е. Гіпоспадія

- Гіпоспадія

- Під час катетеризації сечового міхура при швидкому введенні катетера виникла кровотеча внаслідок травми слизової оболонки **сечівника в ділянці зовнішнього м'яза-замикача**. У якій зоні сечівника лікар повинен бути обережним і відчувати опір м'яких тканин при проходженні катетера?

- A. В pars membranacea urethrae.
- B. В ділянці fossa navicularis urethrae.
- C. В bulbus urethrae.
- D. В pars spongiosa urethrae.
- E. В part prostatica urethrae.

- B pars membranacea urethrae

- Хворому 35 років призначено проведення цистоскопії, лікар повинен пам'ятати, що **межею між фіксованою та рухомою частиною чоловічого сечівника є:**

- A. lig. Suspensorium penis
- B. Pars. prostatica uretras.
- C. Radix penis.
- Д. Fascia penis profunda.
- E. Lig. Fundiforme.

- lig. suspensorium penis

- Хворого госпіталізовано з підозрою на пухлину простати. Під час операції виявлено що пухлина “проросла” до середнього відділу сечівника. Який це відділ?

- A. Перетинчастий
- B. Простатичний
- C. Губчастий
- D. Внутрішньоорганний
- E. Лакунарний

- Перетинчастий

- До лікаря - педіатра звернулись батьки новонародженої дитини зі скаргами на виділення рідини (сечі) в ділянці пупка. Яка вроджена вада у дитини?

- *A.* Незарощена сечова протока
- *B.* Дивертикул Меккеля
- *C.* Розвір сечівника
- *D.* Пупкова кила
- *E.* Пахвинна кила

- Незарощена сечова протока

- У чоловіка літнього віку **ускладнений акт сечовипускання**. Яка частина сечівника каналу з віком найчастіше звужується?

- A. Pars spongiosa.
- B. Glandulae urethrales.
- C. M. sphincter urethrae externum.
- D. Pars membranacea.
- E. Pars prostatica.

- Pars prostatica.

- Хворого 65 років прооперували з приводу **пухлини сечоводу**. Під час операції виявлено, що пухлина проросла в **брижу тонкої кишки**. Який відділ сечоводу уражений пухлиною?

- А. Внутрішньоорганний.
- В. Тазовий.
- С. Черевний.
- D. Внутрішньонирковий.
- Е. Грудний.

- Черевний.

- Під час видалення правого яєчника хірург замість яєчникової артерії перев'язав орган розміщений поруч. Який?

- А. Сечовід.
- В. Грудна лімфатична протока.
- С. Аорту.
- D. Загальну клубову артерію.
- Е. Внутрішню клубову артерію.

Сечовід

In course of a small pelvis operation, it became necessary to **ligate an ovarian artery**. What formation may be accidentally ligated together with it?

- A. Round ligament of uterus
- B. Uterine tube
- C. Ureter
- D. Internal iliac vein
- E. Urethra

Ureter

- A 58-year-old woman had her uterus and all appendages completely removed. It resulted in stoppage of urine excretion. Cystoscopy results: bladder doesn't contain any urine, urine doesn't come also from ureteric orifices. What **part of urinary excretion system** was damaged during the operation?

- A. Pelvis renalis
- B. Uretra
- C. Vesica urinaria
- D. Ureter
- E. Ren

Ureter