

Яка анатомічна особливість новонародженого сприяє утворенню **гематом голови** при пологових травмах?

- А. Рихле з'єднання сухожильного шолому з окістям кісток склепіння черепа
- В. Недостатня міцність судинної стінки
- С. Слабкий розвиток підшкірно-жирового шару шкіри голови
- Д. Наявність тім'ячок
- Е. Підвищена рухомість кісток, що формують склепіння черепа

Рихле з'єднання сухожильного шолому з окістям кісток
склепіння черепа

Під час ДТП водій отримав численні ушкодження бічної поверхні голови, серед яких був **перелом виличної дуги**. Функція якого з м'язів вірогідно буде страждати?

A.M. masseter

B. M. orbicularis oris

C. M. buccinator

Д. M. procerus

E. M. risorius

A. M. masseter

Хворий не може підняти опущену вниз нижню щелепу. Які м'язи не можуть виконати свою функцію?

- А. Жувальні
- В. Мімічні
- С. Коловий мяз рота
- Д. Надчерепний
- Е. Мяз- підіймач кута рота

А. Жувальні

Хворий скаржиться на неможливість **бічних рухів нижньої щелепи.**
Який з м'язів найвірогідніше ушкоджено?

- A. M. pterygoideus lateralis
- B. M. pterygoideus medialis
- C. M. buccinators
- Д. M. masseter
- E. M. risorius

A. M. pterygoideus lateralis

При обстеженні міміки хворого виявлено, що він не може **скласти губи трубочкою, не може свистіти**, під час сміху кути рота не піднімаються догори, ротова щілина розтягується в боки (поперечна посмішка). Пацієнт страждає на міопатію – спадкове захворювання із дистрофічним ураженням м'язів. На атрофію якого м'язу вказують дані симптоми?

- А. Колового м'яза рота
- В. Великого виличного м'язу
- С. Шийного м'язу
- Д. М'язу сміху
- Е. Жувального м'язу

А. Колового м'язу рота

Чоловік 30 років звернувся до стоматолога зі скаргою на розлади жування, у нього виникає біль при відтягуванні щелепи назад. Запалення якого з жувальних м'язів найвірогідніше встановить лікар?

- A. M. temporalis /задні волокна/.
- B. M. masseter.
- C. M. temporalis /передні волокна/.
- Д. M. pterygoideus medialis.
- Е. M. pterygoideus lateralis.

A. M. temporalis /задні волокна/

При обстеженні міміки хлопчика 8 років виявлено, що він не може скласти губи трубочкою, не може задутися свічку, під час сміху кутки рота не піднімаються догори, а ротова щілина розтягується в боки (поперечна посмішка). На атрофію якого м'язу вказують дані симптоми?

- А. Колового м'яза рота
- В. Великого виличного м'язу
- С. Щічного м'язу
- Д. М'язу сміху
- Е. Жувального м'язу

А. Колового м'язу рота

У хворого 67 років внаслідок негативних емоцій на обличчі відмічається **міміка суму**. Скорочення яких м'язів забезпечують такий вираз обличчя?

- A. Коловий м'яз ока, малий виличний.
- B. Коловий м'яз рота, великий виличний.
- C. Потилічно-лобовий, підборідний.
- D. Передній вушний, м'яз-опускач кута рота.
- E. М'яз-зморщувач брови, лобове черевце потилічно-лобового.

Е. М'яз-зморщувач брови, лобове черевце
потилично-лобового

У хворого очна щілина праворуч помітно більша ніж ліва. Функція якого з мімічних м'язів порушена?

- A. M. orbicularis oculi
- B. M. procerus
- C. M. corrugator supercilli
- D. M. occipitofrontalis (venter frontalis)
- E. M. zygomaticus major

A. M. orbicularis oculi

У юнака 18 років після вуличної бійки травмована бічна ділянка лиця. При огляді лікар встановив, що шкіра травмована, рана відкрита, гілка нижньої щелепи зламана, з жувальних м'язів залишився цілим тільки **той, що не підіймає щелепу**. Який це м'яз?

- A. Жувальний.
- B. Передні пучки скроневого.
- C. Середні пучки скроневого.
- D. Бічний крилоподібний.
- E. Присередній крилоподібний.

Бічний крилоподібний.

При обстеженні пацієнта виявлено, що після перенесеної щелепно-лицьової травми він не може **висунути нижню щелепу вперед і змістити її в правий бік**. Параліч якого м'язу є причиною вказаної патології?

- A. Правого жувального.
- B. Лівого жувального.
- C. Правого скроневого.
- D. Лівого скроневого.
- E. Присереднього крилоподібного правого.

Е. Присереднього крилоподібного правого.

Унаслідок травми виник запальний процес м'яких тканин між медіальним і латеральним крилоподібними м'язами. У який простір пошириться гній при ускладненні **флегмони міжкрилоподібної ділянки?**

- A.У щелепно-крилоподібний простір
- B.У жувально-нижньощелепний простір
- C.У черепно-крилоподібний простір
- D.У привушний простір
- E.У міжапоневротичний простір

А.У щелепно-крилоподібний простір

При обстеженні обличчя хворого відзначається, що правий кут рота зміщений у ліву сторону, **права щока і губи притиснуті до зубів** і ясен щелеп. Порушенням функції якого м'яза це викликано?

- A. Щічного м'яза
- B. М'яза сміху
- C. Колового м'яза рота
- D. М'яза, що опускає кут рота
- E. Виличних м'язів

А. Щічного м'яза

При втручанні з метою лікування вивиха нижньої щелепи лікар повинен пам'ятати про м'яз, що при скороченні відтягує капсулу і суглобовий диск скронево-нижньощелепного суглоба. Що це за м'яз?

- A. M. mylohyoideus
- B. M. pterygoideus lateralis
- C. M. masseter
- D. M. pterygoideus medialis
- E. M. temporalis

A. M. pterygoideus lateralis

У дитини травмована **нижня губа**. Який м'яз при цьому ушкоджений?

- A. M. levator labii superioris
- B. M. orbicularis oris
- C. M. buccinator
- D. M. risorius
- E. M. levator anguli oris

A. M. orbicularis oris

A man, 30 years old, appealed to a dentist complaining of mastication disorder: **painful backward movement of the mandible.** The doctor detected the inflammation of a masticatory muscle. Which muscle exactly is it?

- A. Temporal (posterior fibres)
- B. Temporal (anterior fibres).
- C. Medial pterygoid
- D. Lateral pterygoid
- E. Masticatory

A. Temporal (posterior fibres)

A man, 30 years old, appealed to a dentist complaining of mastication disorder: **painful backward movement of the mandible.** The doctor detected the inflammation of a masticatory muscle. Which muscle exactly is it?

A. Risorius

B. Greater zygomatic

C. Buccinator

D. Orbicular muscle of mouth

E. Masseter

D. Masseter