



До клініки звернувся чоловік, 45 років, зі скаргами на втрату чутливості в ділянці задньої 1/3 язика. Функція якої пари черепних нервів порушена?

- A. IX
- B. X
- C. VII
- D. V
- E. VI


IX



В нейрохірургічне відділення госпіталізовано жінку, 55 років, на пухлину головного мозку. Після додаткового обстеження нейрохірург виявив порушення функції IX і X пари черепних нервів, що обумовлено ушкодженням пухлиною ядер цих нервів. Який відділ головного мозку уражений пухлиною?

- А. Середній мозок.
- В. Мост
- С. Проміжний мозок
- D. Довгастий мозок
- Е. Мозочок

• Довгастий мозок




В неврологічне відділення прийнято жінку, 60 років, з порушенням функції **ganglion oticum**. Невролог діагностував, що хвороба обумовлена паталогічним процесом **парасимпатичного корінця** цього вузла. Який нерв ушкоджений?

- A. N. auricularis major
- B. N. petrosus major
- C. N. petrosus profundus
- D. N. auricularis minor
- E. N. petrosus minor

До невролога звернулася жінка, 50 років, зі скаргами на втрату чутливості **слизової оболонки** в ділянці **задньої третини язика**, що пов'язано з порушенням функції IX пари черепних нервів. Де знаходиться місце виходу з мозку язикоглоткового нерву?

- A. Olive
- B. Sulcus anterolateralis
- C. Sulcus posterolateralis
- D. Sulcus bulbopontinus
- E. Angulus pontocerebellaris



Sulcus posterolateralis



Внаслідок порушення кровообігу в басейні хребтової артерії у хворої виявили бульбарний параліч, в результаті якого ушкоджені **ядра IX, X, XI** пар черепних нервів. У пацієнта порушено **ковтання** та **фонація**, їжа потрапляє в носову порожнину, виникає **дисфонія**, **дисфагія**, **дизартрія**. Яке ядро черепних нервів ушкоджене?

- A. Nucleus salivatorius superior
- B. Nucleus salivatorius inferior
- C. Nucleus accessorius
- D. Nucleus ambiguus
- E. Nucleus pontinus


Nucleus ambiguus



У хворого спостерігається порушення функції **привушної слинної залози**. Який нерв підсилює її секрецію?

- А. Малий кам'янистий
- Б. Верхньощелепний
- В. Лицевий
- Г. Блукаючий
- Д. Додатковий



Малий кам'янистий



Виконуючи неврологічне обстеження пацієнта, 22 роки, лікар попросив його відкрити рот і вимовити звук «Аааа», при цьому оцінював, чи симетрично піднімається м'яке піднебіння. Потім лікар доторкнувся ватним тампоном до м'якого піднебіння і у відповідь виник **блювотний рефлекс**, що супроводжується **рухом піднебіння та глотки**. Які черепні нерви досліджував лікар?

- A. 10,11 i 12
- B. 9 i 10
- C. 5,7 i 9
- D. 7,8 i 9
- E. 9 i 12



9 i 10



У хворого спостерігається зниження тактильного та смакового відчуття слизової оболонки задньої третини спинки **язика**. З патологією якого нерву це пов'язано?

- А. ІІ гілки трійчатого нерву
- В. Лицевого
- С. Язикоглоткового
- D. Під'язикового
- Е. ІІ гілки трійчатого нерву


• ЯЗЫКОГЛОТКОВОГО



Хворий скаржиться на біль в ділянці кореня
язика і піднебінних мигдаликів. Який нерв іннервує ці
ділянки?

- Язикоглотковий нерв
- Під'язиковий
- Додатковий нерв
- Трійчастий
- Блоковий




Языкоглотковый нерв



У пацієнта має місце пошкодження волокон дев'ятої пари черепних нервів (язикоглотковий). Формування якого відчуття буде порушено?

- *Гірке*
- Солодке
- Солоне
- Усіх смакових відчуттів
- Кисле



Гірке



У жінки, 55 років, з однобічним розладом функції **привушної** та **сльозової залоз** лікар діагностував **пухлину**, що розташована на **передній поверхні кам'янистої частини скроневої кістки**. Пухлина стискує нерви, які впливають на функції цих залоз, в місці їх виходу на передній поверхні кам'янистої частини os temporale. Біля яких отворів пухлина стискує нерви?

- А. Внутрішнього та зовнішнього отворів сонного каналу
- В. Внутрішнього та зовнішнього слухових отворів
- С. Отворів каналців завитки і присінка
- D. Шило-соскоподібного та соскоподібного отворів
- Е. Розтворів каналів великого і малого кам'янистих нервів



Розтворів каналів великого і малого кам'янистих нервів



В приймальне відділення звернулася жінка, 50 років, з гнійним запаленням глибоких лімфатичних вузлів шиї. Запалення поширилось на **кам'янисту ямочку** (fossula petrosa) скроневої кістки і на **нерв**, який **потрапляє в барабанну порожнину** через отвір цієї ямочки. Який нерв уражений?

- A. N. auricularis posterior
- B. N. tympanicus
- C. N. petrosus profundus
- D. Chorda tympani
- E. R. auriculotemporalis

N. tympanicus



В нейрохірургічне відділення потрапила хвора з тромбозом внутрішньої яремної вени у ділянці *foramen jugulare*. При цьому встановлено стиснення черепних нервів, що проходять через цей отвір. Які черепні нерви ушкоджені в яремному отворі?

A.IX, X, XI



B.III, IV, VI

C.V, VI

D.VII, VIII

E. VIII, IX



IX, X, XI



Хвора, 50 років, поступила у нейрохірургічне відділення з внутрішньочерепною пухлиною в ділянці задньої черепної ямки. Після додаткового обстеження діагностовано, що пухлина здавлює IX, X, XI черепні нерви біля отвору черепа, через який ці нерви виходять з порожнини черепа. Біля якого отвору черепа ушкоджені нерви?

- А. Внутрішній отвір сонного каналу
- В. Внутрішній слуховий отвір
- С. Рваний отвір
- D. Яремний отвір
- Е. Круглий отвір


Яремний отвір



У відділення щелепно-лицевої хірургії прийнято жінку, 70 років, з гнійним запаленням лімфатичних вузлів, що оточують ротову частину глотки. Запалення ускладнилося ураженням язикових гілок **язико-глоткового нерва**, що призвело до порушенням **іннервації язика**. Який вид іннервації та якої частини язика порушився?

- А. Смакова іннервація слизової оболонки передніх двох третин язика
- В. Рухова іннервація власних м'язів язика
- С. Смакова, дотикова, температурна і больова іннервація задньої третини язика.
- D. Дотикова, температурна і больова іннервація передніх двох третин язика
- Е. Рухова іннервація скелетних м'язів язика

Смакова, дотикова, температурна і больова іннервація задньої третини язика



Surveying the patient it is revealed, that he does not feel bitter, tactile sensitivity of a posterior third of tongue is disturbed. What nerve is involved in pathological process?

- A. Hypoglossal.
- B. Lingual.
- C. Glossopharyngeal.
- D. Facial.
- E. Trigeminal.

Glossopharyngeal.

