

Внаслідок операційної **травми м'яких** тканин шиї **справа**, порушилися регулярні рухові екскурсії **правого куполу** діафрагми. Який з нервів нервів вірогідно постраждав?

A. N. phrenicus dexter.

B. N. vagus

C. N. accessorius

D. Rr. dorsales nervi spinalis

E. N. intercostales.

A. N. phrenicus dexter.

У хворого відсутня чутливість в передньому трикутнику шиї.
Який нерв із шийного сплетення пошкоджено?

- A. Поперечний шийний
- B. Великий вушний
- C. Малий потиличний
- D. Надключичний
- E. Шийна петля

А. Поперечный шейный

Хворий потрапив у клініку з пораненням в ділянці шиї. При обстеженні виявлено **пошкоджений нерв**, розташований **попереду переднього драбинчастого м'яза**. Який нерв пошкоджений?

А. Діафрагмальний

В. Блукаючий

С. Язикоглотковий

Д. Під'язиковий

Е. Шийний відділ симпатичного
стовбуру

А. Діафрагмальний

У потерпілого- **різана рана шиї**, яка знаходиться уздовж заднього краю m. sternocleidomastoideus, **послаблена чутливість шкіри задньої поверхні вушної раковини**. Який нерв може бути ушкодженим?

- A. n. auricularis magnus
- B. r. auricularis nervi vagi
- C. nn. auriculares anteriores
- D. D. n. auriculotemporalis
- E. E. n. auricularis posterior

A. n. auricularis magnus

У оперованого чоловіка 36 років , спостерігалися
судорожні скорочення діафрагми. Блокаду якого нерва
необхідно зробити, щоб ліквідувати це ускладнення?

A. n. phrenicus

B. n. vagus

C. n. splanchnicus major

D. n. accessorius

E. tr. sympathicus

A. n. phrenicus

У хворого порушено сприйняття дотику та холодного в ділянці шкіри лопаток? Які нервові структури ушкоджені?

- А. задні корінці спинномозкових нервів від С8-ТН6
- В. передні корінці спинномозкових нервів від Th1-Th12
- С. задні корінці спинномозкових нервів від L2-L6
- Д. задні корінці спинномозкових нервів від С1-С4
- Е. передні корінці спинномозкових нервів від С2-С8

А. задні корінці спинномозкових нервів від С8-ТН6

Хвора скаржиться лікарю, що вона не може **підійняти лопатки**. Які нервові гілки не виконують функцію?

rr. m. levator scapulae

rr. m. scalenus medius

rr. m. scalenus posterior

rr. m. splenius cervicis

rr. m. scalenus anterior

- A.rr. m. levator scapulae
- B. rr. m. scalenus medius
- C. rr. m. scalenus posterior
- D. rr. m. splenius cervicis
- E. rr. m. scalenus anterior

A.rr. m. levator scapulae

У хворої жінки порушена зліва іннервація шкіри в ділянці привушної залози, вушної часточки і в шкірі увігнутої поверхні вушної раковини та позаду неї. Який нерв ушкоджено?

великий вушний

надключичний

шийний поперечний

малий потиличний

діафрагмовий

- A. великий вушний
- B. надключичний
- C. шийний поперечний
- D. малий потиличний
- E. діафрагмовий

У дитини перелом 3,4,5 шийних хребців. Внаслідок цього дитині дуже важко дихати. Про ушкодження нервових волокон яких нервів у першу чергу подумав лікар?

А. діафрагмових

- A. правого діафрагмового нерва
- B. правого поперечного нерва шиї
- C. правого надключичного нерва
- D. лівого надключичного нерва
- E. лівого діафрагмового нерва

А. правого діафрагмового нерва

М'язові **гілки шийного сплетення** іннервують м'язи, окрім:

А. підлопаткових м'язів

В. довгих м'язів голови

С. задніх драбинчастих м'язів

Д. передніх драбинчастих м'язів

Е. м'язів-підіймачів лопаток

А. підлопаткових м'язів

В. довгих м'язів голови

С. задніх драбинчастих м'язів

Д. передніх драбинчастих м'язів

Е. м'язів-підіймачів лопаток

А. підлопаткових м'язів

Чоловік скаржиться на порушення чутливості в шкірі вушної часточки. Пошкодження нервових волокон якого нерва викликало такий стан у хворого?

- A. n. auricularis magnus plexus
cervicalis
- B. n. auriculotemporalis n.
trigeminus
- C. n. auricularis anteriores n.
trigeminus
- D. n. auricularis n. vagus
- E. n. auricularis posterior n. facialis

n. auricularis magnus plexus

Після проведеної операції на шиї, хворий втратив
чутливість шкіри на бічній та передній поверхні шиї.
Який нерв шийного сплетення був пошкоджений під час
операції?

- A. шийний поперечний нерв
- B. великий вушний нерв
- C. малий потиличний нерв
- D. надключичний нерв
- E. бічний надключичний нерв

А. шейный поперечный нерв

У хворого була проведена операція – видалення доброякісної пухлини в ділянці лопатково-ключичного трикутника шиї. Під час ранкового обстеження хворий не відчув дотику руки лікаря до шкіри шиї над яремною вирізкою груднини та нижче ключиці. Який із названих нервів шийного сплетення був пошкоджений під час операції у хворого?

- A. n. supraclaviculares
- B. n. levator scapulae
- C. n. auricularis magnu
- D. n. occipitalis minor
- E. n. transversus colli

A. n. supraclaviculares

У хворого **різана рана** шкіри в ділянці **заднього відділу дельтоподібного м'яза**. Частина волокон якого нерва із шийного сплетення може бути пошкоджена?

- A. n. supraclaviculares
- B. n. levator scapulae
- C. n. auricularis magnus
- D. n. occipitalis minor
- E. n. transversus colli

A. n. supraclaviculares

Хворого оперують з приводу **аневризми дуги аорти**. Щоб не **пошкодити лівий діафрагмовий нерв**, лікар повинен пам'ятати, що він проходить:

- A. латерально від дуги аорти
- B. позаду дуги аорти
- C. медіально від дуги аорти
- D. спереду дуги аорти
- E. внизу дуги аорти

А. латерально від дуги аорти