

1. У реанімаційне відділення поступив хворий з важким отруєнням. Для проведення комплексу лікування необхідно виконати катетеризацію і введення лікарських речовин в підключичну вену. В якому топографічному утворенні вона знаходиться?

- A. spatium antescalenum
- B. spatium interscalenum
- C. spatium
retrosternocleidomastoideus
- D. spatium interaponeuroticum
suprasternale
- E. trigonum omotrabezoidium

A. spatium antescalenum

2. У хірургічне відділення доставлений потерпілий з ножовим пораненням променевого боку передпліччя. З рани витікає венозна кров. Яка судина постраждала?

A. v. cephalica

B. v. basilica

C. v. intermedia cubiti

D. vv. ulnares

E. vv. brachiales

A. v. cephalica

3. На заключному етапі видалення **тимуса**, у хворого виникла значна **венозна кровотеча**. Яку кровоносну судину при цьому було пошкоджено?

А. яремна венозна дуга

В. підключична вена

С. внутрішня грудна вена

Д. плечоголова вена

Е. передня яремна вена

А. яремна венозна дуга

4. У хірургічне відділення доставлений потерпілий з ножовим пораненням ліктьового боку передпліччя. З рани витікає венозна кров. Яка судина постраждала?

A. v. basilica

B. v. cephalica

C. v. intermedia cubiti

D. vv. ulnares

E. vv. brachiales

A. v. basilica

5. У хворого з тіомомої (пухлина вилочкової залози) спостерігається ціаноз, розширення підшкірної венозної сітки і набряк м'яких тканин обличчя, шиї, верхньої половини тулуба і верхніх кінцівок. Який венозний стовбур стиснутий пухлиною?

А. верхня порожниста вена

В. підключична вена

С. зовнішня яремна вена


Д. внутрішня яремна вена

Е. нижня порожниста вена

А. верхня порожниста вена

6. У хворого виявлена злоякісна пухлина кореня правої легені, яка здавлює вену, що огинає radix pulmonis dexter ззаду наперед, переходячи з заднього середостіння у переднє і впадає у верхню порожнисту вену. Яка вена здавлена пухлиною?

- ▶ V. pericardiacae.
- ▶ V. mediastinales.
- ▶ V. intercostales posteriores dextri.
- ▶ V. azygos.
- ▶ V. hemiazygos.



► V. azygos.

7. У хворої злоякісна пухлина заднього сектора молочної залози. Метастазами уражені nodi lymphoidei supraclavicularis та infraclavicularis, якими здавлюються корені v. cava superior. Які вени є коренями v.cava superior?

- ▶ Vv. jugularis sinister et subclavia sinister.
- ▶ Vv. jugularis dexter et sinister.
- ▶ Vv. jugularis dexter et subclavia dexter.
- ▶ Vv. brachiocephalica dexter et sinister.
- ▶ V. brachiocephalica dexter et v. subclavia sinister.



► Vv. brachiocephalica dexter
et sinister.

8. У хворого, 40 років, виявлено синдром здавлювання верхньої порожнистої вени, який супроводжується набряком шиї, верхньої половини грудної клітки (“Стоксів комір”), набуханням, пульсацією шийних вен. Які вени є коренями верхньої порожнистої вени?

- ▶ V. brachiocephalica dextra et sinistra.
- ▶ V. brachiocephalica dextra et v. subclavia sinistra.
- ▶ V. jugularis interna sinistra et v. subclavia sinistra.
- ▶ V. jugularis interna dextra et sinistra.
- ▶ V. jugularis interna dextra et v. subclavia dextra.



► V. brachiocephalica
dextra et sinistra.

9. Онколог хворому, 48 років, проводить видалення пухлини правої легені. Яка вена огинає ззаду наперед корінь правої легені?

- ▶ V. cava superior.
- ▶ V. hemiazygos.
- ▶ V. azygos.
- ▶ V. cava inferior.
- ▶ V. hemiazygos accessoria.



V. azygos.

10. В лікарні у хворого знадобилось взяти кров для дослідження. Найбільш добре пальпується косо розташована судина в ділянці ліктьової ямки. Яка це вена?

- ▶ V. cephalica.
- ▶ V. mediana cubiti.
- ▶ V. brachialis.
- ▶ V. mediana antebrachii.
- ▶ V. basilica.

V. mediana cubiti.

11. Хворому необхідно ввести ліки внутрішньовенно. Яка вена **верхньої кінцівки** має практичне значення як місце найзручнішого проведення венепункції?

- ▶ V. cephalica.
- ▶ V. basilica.
- ▶ V. poplitea.
- ▶ V. mediana cubiti.
- ▶ Vv. ulnares.

V. mediana cubiti.

12. Чоловік звернувся до лікарні в зв'язку зі скаргами на біль в ділянці підвищення великого пальця кисті. При огляді виявлено лімфангіт передньої плечової ділянки. Лімфатичні пахвові вузли збільшені. Вздож якої вени розповсюджується інфекція?

- ▶ V. ulnaris.
- ▶ V. basilica.
- ▶ V. radialis.
- ▶ V. brachialis.
- ▶ V. cephalica.

V. cephalica.

13. Після автокатастрофи постраждалого було доставлено в лікарню з раною задньої плечової ділянки та венозною кровотечею судини, що знаходиться в *canalis humeromuscularis*. Яка вена ушкоджена?

V. profunda brachii.

V. ulnaris.

V. radialis.

V. axillaries.

V. brachialis.

V. brachialis.


14. У чоловіка, який звернувся до хірурга зі скаргами на біль та припухлість вен верхньої кінцівки, було виявлено запальний процес підшкірних вен. Які поверхневі вени здійснюють відтік від кінцівки?

- ▶ V. cephalica, v. basilica, v. thoracoacromialis.
- ▶ V. cephalica, v. basilica, v. profunda brachii.
- ▶ V. brachialis.
- ▶ V. cephalica, v. basilica, v. mediana cubiti.
- ▶ V. circumflexa humeri.

V. cephalica, v. basilica,
v. mediana cubiti.

► 15. У пораненого
венозна кровотеча з
ліктьового боку
передпліччя. Яка
вена обумовлює
кровотечу?

- ▶ v. basilica
- ▶ v. profunda brachii
- ▶ v. brachialis.
- ▶ v. mediana cubiti.
- ▶ V. circumflexa humeri.



► v. basilica