



- ▶ Хворий 45 р. випадково випив оцтову кислоту. Опік яких відділів травної системи перш за все буде відбуватися?

- ▶ А. Порожнина рота, ротоглотки .
 - ▶ В. Порожнина рота та гортаноглотки.
 - ▶ С. Глотки, шлунку
 - ▶ D. Глотки та стравоходу.
 - ▶ Е. Стравоходу та шлунку.
- 


- ▶ Порожнина рота, ротоглотки .

- ▶ При обстеженні хворої дитини лікар виявив часткову відсутність **сосочків на бічній поверхні язика**. Які це сосочки?

- А. Листоподібні
 - В. Ниткоподібні
 - С. Грибоподібні
 - Д. Конічні
 - Е. Жолобуваті
- 


Листоподібні

- ▶ Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігається **закидання молока у носову порожнину**. Вкажіть на можливу причину виникнення цього порушення.

- ▶ А. Вовча паща.
 - ▶ В. Викривлення носової перегородки вправо.
 - ▶ С. Перелом основи черепа.
 - ▶ D. Заяча губа.
 - ▶ Е. Викривлення носової перегородки вліво.
- 

« Вовча паща».

- ▶ При огляді порожнини рота лікар виявив невелику виразку на передній лівій піднебінній дужці. На який м'яз розповсюдиться запальний процес?

- ▶ A. M. palatoglossus
 - ▶ B. M. styloglossus
 - ▶ C. M. palatopharyngeus
 - ▶ D. M. genioglossus
 - ▶ E. M. hyoglossus
- 


- ▶ **M. palatoglossus**

- ▶ При обстеженні лікар виявив у пацієнта гіпертрофію та запалення лімфоїдної тканини, набряк слизової оболонки між дужками м'якого піднебіння (гострий тонзиліт). Який з мигдаликів міститься в нормі в цьому місці?

- ▶ A. Tonsilla palatina
- ▶ B. Tonsilla pharyngealis
- ▶ C. Tonsilla tubaria
- ▶ D. Tonsilla lingualis
- ▶ E. Tonsilla adenoidea

- ▶ Tonsilla palatina

- ▶ До лікаря звернулася мати дитини 8 років зі скаргами на болі при ковтанні, підвищення температури тіла. При обстеженні лікар виявив набряк і гіперемію лімфоїдної тканини між дужками м'якого піднебіння. Який з мигдаликів є в нормі в цьому місці?

- ▶ A. *Tonsilla lingualis*.
 - ▶ B. *Tonsilla pharyngealis*.
 - ▶ C. *Tonsilla tubaria*.
 - ▶ D. *Tonsilla palatina*.
 - ▶ E. *Tonsilla nasalis*.
- 


Tonsilla palatina.

- ▶ До лікаря звернулася мати немовляти зі скаргами, що під час першого годування **молоко почало витікати з носової порожнини.** Яка аномалія розвитку у немовляти?

- ▶ А. Незрощення твердого піднебіння.
- ▶ В. Заяча губа.
- ▶ С. Атретія стравоходу.
- ▶ D. Атретія анального отвору.
- ▶ Е. Стравохідно-трахейний свищ.

- ▶ Незрошення твердого піднебіння.

- ▶ Вагітна жінка отримала підвищену дозу випромінювання. У результаті цього порушився процес внутрішньоутробного розвитку плода. При формуванні порожнини рота **не відбулося зрощення піднебінних відростків верхньої щелепи**. Виникнення якої аномалії передбачається?

- ▶ А. Атрєзія стравоходу.
 - ▶ В. «Вовча паща».
 - ▶ С. Мікротома.
 - ▶ D. Макростома.
 - ▶ Е. «Заяча губа».
- 

► **«Вовча паща».**

- ▶ При вивченні гістологічного препарату в слизовій оболонці ротової порожнини визначені сальні залози. З якого відділу отримано препарат?

- ▶ А. Шовна зона щоки
- ▶ В. Спинка язика
- ▶ С. Слизова частина губи
- ▶ D. Шовна зона твердого піднебіння
- ▶ Е. Дно порожнини рота


► Шовна зона щоки

- ▶ Пацієнт помилково випив розчин оцтової кислоти. Яка оболонка порожнини рота зазнала найбільших пошкоджень?

- ▶ А. слизова
- ▶ В. м'язова
- ▶ С. серозна
- ▶ D. еластична мембрана
- ▶ Е. м'язова і серозна


► **Слизова**

- ▶ Після травми обличчя у хворого **гематома щічної ділянки**. Відтік з якої **слинної залози** блоковано гематомою?

- ▶ А. привушна
 - ▶ В. під'язикова
 - ▶ С. піднижньощелепна
 - ▶ D. губна
 - ▶ Е. щічна
- 

▶ **привушна**

- ▶ Стоматолог при огляді порожнини рота виявив на границі середньої та задньої третин спинки язика запалення сосочків. Запалення яких сосочків виявив лікар?

- ▶ A. Papillae vallatae
 - ▶ B. Papillae fungiformes
 - ▶ C. Papillae foliatae
 - ▶ D. Papillae filiformes
 - ▶ E. Papillae conicae
- 


▶ **Papillae vallatae**

- ▶ Після травми обличчя у хворого **гематома** в **піднижньощелепній ділянці** обличчя. Відтік з якої **слинної залози** блоковано гематомою?

- ▶ А. привушна
- ▶ В. під'язикова
- ▶ С. піднижньощелепна
- ▶ D. губна
- ▶ Е. щічна

► Піднижньощелепна

- ▶ У хворого запалення під'язикового сосочка. З яких **слинних залоз** буде ускладнено виділення слини?

- ▶ А. Під'язикової і привушної.
 - ▶ В. Під'язикової і піднижньощелепної.
 - ▶ С. Привушної і піднижньощелепної.
 - ▶ D. Привушної і піднебінної.
 - ▶ Е. Під'язикової і щічної.
- 

► **Під'язикової і піднижньощелепної.**

- ▶ У хворого на **рак спинки язика** виникла сильна кровотеча внаслідок ураження пухлиною **дорзальної артерії язика**. Яку судину перев'язує лікар для зупинки кровотечі?

- ▶ А. Дорзальну артерію язика
- ▶ В. Лицьову артерію
- ▶ С. Язикову артерію
- ▶ D. Глибоку артерію язика
- ▶ Е. Висхідну артерію глотки


► Язикову артерію

- ▶ У хворого 25 років у ділянці правої щоки свіжа подовжня **різана рана** завдовжки до 4 см і глибиною 1см, яка сильно кровоточить. На які анатомічні структури потрібно звернути особливу увагу при накладанні швів?

- ▶ А. Гілки лицьового нерва.
- ▶ В. Верхньощелепну артерію.
- ▶ С. Гілки верхньощелепного нерва.
- ▶ D. Нижньощелепну артерію.
- ▶ Е. Протоку привушної залози.


- ▶ Протоку привушної залози.

- ▶ При огляді присінка порожнини рота лікар-стоматолог виявив **почервоніння** ділянки в області **другого верхнього кутнього зуба**. Про патологію якої залози можна подумати в першу чергу?

- ▶ А. Під'язикової.
 - ▶ В. Привушної.
 - ▶ С. Щічної.
 - ▶ Д. Піднебінної.
 - ▶ Е. Язикової.
- 

► **Привушної.**

- ▶ Хворий 35 років, звернувся до приймального відділення зі скаргами на **біль та набряк в ділянці дна ротової порожнини**. Після огляду, діагностовано запальний процес у ділянці вивідної протоки піднижньощелепної залози. Куди відкривається ця протока?

- ▶ А. Під'язикове м'ясце.
 - ▶ В. Присінок порожнини рота.
 - ▶ С. Сліпий отвір язика.
 - ▶ Д. Ясеневу кишеню.
 - ▶ Е. Власне порожнина рота.
- 


- ▶ **Під'язикове м'ясце.**

- ▶ При огляді плода спостерігається розщеплення верхньої губи. Поставте діагноз вродженої вади обличчя:

- A. Палатосхізис
- B. Хейлосхізис
- C. Макростомія
- D. Мікрогнатія
- E. Гіпертелорізм

Хейлосхізис


- ▶ Під час огляду плода виявлено розщеплення твердого піднебіння. Встановіть імовірний діагноз вродженої вади обличчя.

- A. Палатосхізис
 - B. Хейлосхізис
 - C. Макростомія
 - D. Мікрогнатія
 - E. Гіпертелорізм
- 

Палатосхізис



- ▶ Який гормон навколоушних слинних залоз підсилює мінералізацію зубів шляхом стимуляції надходження кальцію у заплнені тканини?

- A. Паротин
 - B. Глюкагон
 - C. Кальцитонін
 - D. Паратирин
 - E. Кортизол
- 

Паротин

- ▶ У постраждалого з травмою основи черепа встановлене пошкодження гачкоподібного відростка присередньої пластинки крилоподібного відростка клиноподібної кістки. Функція якого м'яза м'якого піднебіння буде порушена?

- A. Напрягача піднебінної завіски
- B. Піднебінно-язикового
- C. Піднебінно-глоткового
- D. М'яза язичка
- E. Підіймача піднебінної завіски

Напрягача піднебінної завіски

- ▶ Для уточнення діагнозу хворому 15-ти років потрібно зробити сіалографію **привушної залози**. Де розташований **отвір**, крізь який буде введена рентгенконтрастна маса?


A. На щоці в ділянці навпроти 2-го верхнього великого кутнього зуба

B. На щоці в ділянці навпроти 2-го нижнього великого кутнього зуба

C. На щоці в ділянці навпроти 2-го нижнього малого кутнього зуба


D. На щоці в ділянці навпроти 2-го верхнього малого кутнього зуба

► E. -



**На щоці в ділянці навпроти 2-го
верхнього великого кутнього зуба**

The examination of the patient revealed hypertrophy and inflammation of the **lymphoid tissue**, swelling of the mucous membrane of the soft palate between the arches (**acute tonsillitis**). Which of the tonsils is contained in the norm in this place?



- ▶ A. Tonsilla tubaria
- ▶ B. Tonsilla pharyngealis
- ▶ C. Tonsilla lingualis
- ▶ D. Tonsilla palatina
- ▶ E. All answers are correct

Tonsilla palatina