

- ▶ Під час огляду ротової порожнини у пацієнта спостерігається торкання різальних країв **верхніх та нижніх різців**. Для якого прикусу характерне таке розміщення зубів?

- ▶ А. Прямий прикус
- ▶ В. Закритий прикус
- ▶ С. Прогенія
- ▶ D. Ортогнатія
- ▶ Е. Біпрогнатія

► *А. Прямой прикус*

- У людини зуби закріплені в особливих **комірках** верхньої та нижньої щелеп. До якої системи відносять зуби людини?

- ▶ А. Гетеродонтої
- ▶ В. Акродонтої
- ▶ С. Гомодонтої
- ▶ D. Плевродонтої
- ▶ Е. Текодонтої

► Е. Текодонтної

► На поверхні коронки другого **великого кутнього** зуба, яка контактує з щогою, лікар виявив **каріозну** порожнину. Як називається вражена поверхня коронки?

- ▶ A. Facies vestibularis
- ▶ B. Facies mesialis
- ▶ C. Facies lingualis
- ▶ D. Facies distalis
- ▶ E. Facies occlusalis

► *Facies vestibularis*

- ▶ На поверхні коронки другого **великого кутнього** зуба, яка контактує з щокою, лікар виявив каріозну порожнину. Як називається вражена поверхня коронки?

- ▶ A. 6-7 *років*
- ▶ B. 12-13 років
- ▶ C. 8-9 років
- ▶ D. 4-5 років
- ▶ E. 10-11 років

► *6-7 років*

- ▶ Педіатр, оглядаючи однорічну дитину, виявив в порожнині рота 4 зуба. Вкажіть, яку кількість молочних зубів повинна мати дитина цього віку:

- ▶ A. 8
- ▶ B. 14
- ▶ C. 20
- ▶ D. 12
- ▶ E. 10

► *A. 8*

► Пацієнтка віком 36 років звернулася до лікаря-стоматолога із приводу набряку під правим оком. Після обстеження встановлено діагноз: **флегмона** підочноямкової ділянки. Від яких зубів інфекція найчастіше поширюється в цю ділянку обличчя?

- ▶ А. Другого премоляра та першого моляра
- ▶ В. Верхнього ікла й першого премоляра
- ▶ С. Верхніх першого та другого молярів
- ▶ D. Верхнього присереднього різця
- ▶ Е. Верхніх бічних та присередніх різців

- ▶ *Верхнього ікла й першого премоляра*

- ▶ Під час огляду порожнини рота на **губній та язиковій поверхні** зубів знайдено темно-жовті та коричневі плями, які вкривають більше ніж половину поверхні зубів; емаль та дентин зруйновані. Який із наведених діагнозів найімовірніший?

- ▶ А. Ерозія зубів
- ▶ В. Клиноподібні дефекти
- ▶ С. Глибокий карієс
- ▶ D. Флюороз
- ▶ Е. Карієс емалі

► *Флюороз*

- Для уточнення діагнозу хворому 15-ти років потрібно зробити **сіалографію** привушної залози. Де розташований отвір, крізь який буде введена рентгенконтрастна маса?

- ▶ А. На щоці в ділянці навпроти 2-го верхнього великого кутнього зуба
- ▶ В. На щоці в ділянці навпроти 2-го нижнього великого кутнього зуба
- ▶ С. На щоці в ділянці навпроти 2-го нижнього малого кутнього зуба
- ▶ D. На щоці в ділянці навпроти 2-го верхнього малого кутнього зуба
- ▶ Е. -

- ▶ *А. На щоці в ділянці навпроти 2-го верхнього великого кутнього зуба*

- ▶ Пацієнт звернувся до ортопеда-стоматолога з приводу протезування зубів. Лікар визначив, що протезування потребують зуби, які не мають **додаткових антагоністів**. Назвіть ці зуби:

- ▶ А. Нижні перші моляри
- ▶ В. Верхні другі моляри
- ▶ С. Нижні другі премоляри
- ▶ D. Нижні другі моляри
- ▶ Е. Верхні треті моляри

► *Верхні треті моляри*

- Дитині 13-ти років видалили другий **молочний великий кутній зуб**. Який постійний зуб виросте на його місці?

- А. Другий малий кутній зуб
- В. Другий великий кутній зуб
- С. Третій великий кутній зуб
- D. Перший малий кутній зуб
- Е. Перший великий кутній зуб

- *Другий малий кутній зуб*

- ▶ У пацієнта після екстракції 7 верхнього зуба в лунці з'явилося повітря. Стінка якої приносової пазухи найімовірніше пошкоджена у цьому разі?

- ▶ А. Гайморової пазухи
- ▶ В. Клиноподібної пазухи
- ▶ С. Середні комірки решітчастої пазухи
- ▶ D. Задні комірки решітчастої пазухи
- ▶ Е. Лобової пазухи

► *Гайморової назухи*

- ▶ Під час огляду порожнини рота лікар-стоматолог виявив наявність **запалення тканин**, які оточують зуб. Запалення якого анатомічного утворення виявив лікар?

- ▶ A. Paradontium
- ▶ B. Alveola dentalis
- ▶ C. Gingiva
- ▶ D. Cementum
- ▶ E. ---

► *Paradontium*

► У потерпілого травмована верхня щелепа - вибитий **перший малий корінний** зуб. Який відросток верхньої щелепи пошкоджено?

- ▶ А. Альвеолярний
- ▶ В. Виличний
- ▶ С. Очноямковий
- ▶ D. Піднебінний
- ▶ Е. Лобовий

▶ Альвеолярный

Стоматолог при огляді ротової порожнини дитини виявив **коротку вуздечку верхньої губи**. На які **зуби** впливає ця аномалія розвитку?

- ▶ А. медіальні верхні різці;
- ▶ В. медіальні нижні різці;
- ▶ С. латеральні верхні різці;
- ▶ D. латеральні нижні різці;
- ▶ Е. верхні ікла.

Медіальні верхні різці.

- ▶ Мати звернулася до педіатра. Хвора дівчинка **6 міс.** з високою температурою, плаче, запихає іграшки до рота. Який **зуб** прорізується?

- ▶ А. присередній нижній різець;
- ▶ В. бічний нижній різець;
- ▶ С. присередній верхній різець;
- ▶ D. бічний верхній різець;
- ▶ Е. нижній кутній зуб.

Присередній нижній різець.

► Мати звернулася до педіатра за допомогою. Хвора дівчинка **9 міс.** з високою температурою, плаче, запихає іграшки до рота. Який зуб прорізується?

- ▶ А. бічний нижній різець;
- ▶ В. присередній нижній різець;
- ▶ С. малий кутній зуб;
- ▶ D. ікло;
- ▶ Е. нижній кутній зуб.

► Бічний нижній різець.

► Мати звернулася по допомогу до педіатра.
Хворий хлопчик 12 міс. з високою
температурою, плаче, запихає іграшки до рота.
Який зуб прорізується?

- ▶ А. Нижній перший великий кутній зуб;
- ▶ В. Присередній нижній різець;
- ▶ С. Ікло;
- ▶ D. Малий кутній зуб;
- ▶ Е. Нижній другій великий кутній зуб;

- ▶ нижній перший великий кутній зуб.

► Мати звернулася до педіатра за допомогою. Хвора дівчинка **20 міс.** з високою температурою, плаче, кусає іграшки. Який **зуб** прорізується?

- ▶ А. Перший верхній великий кутній зуб;
- ▶ В. Присередній нижній різець;
- ▶ С. Малий кутній зуб;
- ▶ D. Ікло;
- ▶ Е. Нижній другий великий кутній зуб.

- ▶ Нижній другий великий кутній зуб.

- ▶ При огляді дівчинки **18 міс.** лікар відмітив припухлість ясен. Дівчинка з високою температурою, плаче, запихає іграшки до рота іграшки. Який **зуб** прорізується в цьому віці?

- ▶ А. нижнє ікло;
- ▶ В. присередній нижній різець;
- ▶ С. верхнє ікло;
- ▶ D. нижній другій великий кутній зуб;
- ▶ Е. малий кутній зуб.

► верхнє ікло.

► Мати звернулася до педіатра за допомогою. Хвора дівчинка **13 міс.** з високою температурою, плаче, кусає іграшки. Який **зуб** прорізується в цьому віці?

- ▶ А. верхнє ікло;
- ▶ В. нижнє ікло;
- ▶ С. верхній другій великий кутній зуб;
- ▶ D. нижній другий великий кутній зуб;
- ▶ Е. перший нижній великий кутній зуб.

► Перший нижній великий кутній зуб.

► При огляді ротової порожнини стоматолог виявив, що у дитини з'явилися перші великі нижні корінні зуби. Який вік дитини?

- ▶ A. 6- 7 років.
- ▶ B. 5-6 років.
- ▶ C. 8-9 років.
- ▶ D. 10-11 років.
- ▶ E. 12-13 років.

► **6- 7 років.**

► Мати звернулася до педіатра за допомогою.
Хвора дівчинка **19 міс.** з високою
температурою, плаче, кусає іграшки. Який
зуб прорізується в цьому віці?

- ▶ А. верхнє ікло;
- ▶ В. нижнє ікло;
- ▶ С. верхній другій великий кутній зуб;
- ▶ нижній другий великий кутній зуб;
- ▶ Е. перший нижній великий кутній зуб;

► верхнє ікло.

- У хворого видалений **зуб**, у якого язикова поверхня менша за щічну. Жувальна поверхня у вигляді овала. Глибока поперечна борозна розділяє **щічний та піднебінний горбки**. Корінь здавлений в мезіо-дистальному напрямку з повздовжними борознами на апроксимальних поверхнях і **роздвоєний**. Визначте який зуб видалений?

- ▶ А. Верхнє ікло.
- ▶ В. Перший верхній малий кутній зуб.
- ▶ С. Нижнє ікло.
- ▶ D. Перший нижній малий кутній зуб.
- ▶ Е. Перший верхній великий кутній зуб.

- ▶ Перший верхній малий кутній зуб.

- ▶ Під час судово-медичної експертизи за анатомічною формулою зубів було встановлено, що труп належить **дитині 6 – 8 років**. Присутність **яких зубів** ротової порожнини надала можливість ідентифікації?

- ▶ А. Молочних премолярів.
- ▶ В. Постійних різців.
- ▶ С. Постійних ікол.
- ▶ D. Молочних третіх молярів.
- ▶ Е. Постійних перших та других молярів.

► Постійних різців.

Dentist at examination of oral cavity of child found out the **short bridle of upper lip**. On what teeth will render the negative consequences this anomaly of development?

- ▶ A. Medial upper incisors
- ▶ B. Lateral upper incisors
- ▶ C. Lateral lower incisors
- ▶ D. Medial lower incisors
- ▶ E. Upper canines

Medial upper incisors

A tooth in which lingual surface less than a cheek is remote in a patient. **Masticatory surface in the form of oval.** A deep transversal fissure divides cheek and language tubercles. A root is strongly constrained in mesio-distal direction with longitudinal fissures on aproximal surfaces and bifurcated. Define what tooth is this.

- ▶ A. First upper premolar
- ▶ B. Upper canine
- ▶ C. Lower canine
- ▶ D. First lower premolar
- ▶ E. Second upper premolar

First upper premolar