


Після звільнення з під завалу у постраждалого відзначається затемнення свідомості, багато підшкірних крововиливів на голові та шиї, дрібні рани на обличчі та **перелом скронево-нижньощелепного суглобу**. **Які кістки** можуть бути пошкоджені?

- 
- 
- A. Сконева кістка та нижня щелепа
 - B. Клиновидна кістка та нижня щелепа
 - C. Лобна та носові кістки
 - D. Сконева кістка та верхня щелепа
 - E. Вилична кістка та слізна кістка




A. Сконева кістка та нижня щелепа



До дільничого терапевта звернувся чоловік 38 років, в якого було діагностовано порушення кровотоку по хребтовій артерії. Яку структуру вона пронизує, щоб потрапити в порожнину черепа?




- 
- 
- A. Membrana atlantooccipitalis posterior
 - B. Membrana atlantooccipitalis anterior
 - C. Lig. alaris
 - D. Lig. cruciforme atlantis
 - E. Lig. flava




A. Membrana atlantooccipitalis posterior




20-річний студент пірнув на мілині, внаслідок удару головою настала миттєва смерть. На розтині виявлено пошкодження атлanto-осьового суглоба і зуба осьового хребця, поранення спинного та довгастого мозку. Пошкодження якої зв'язки відбулося?

- 
- 
- A. Lig. cruciforme atlantis
 - B. Lig. alaria dextra
 - C. Lig. apicis dentis
 - D. Lig. alaria sinistra
 - E. Lig. transversum atlantis




A. Lig. cruciforme atlantis

- 
- У хворого артроз скронево-нижньощелепного суглоба. Рухи в суглобі різко обмежені. До яких суглобів відноситься **скронево-нижньощелепний суглоб** за формою суглобових поверхонь та кількістю осей обертання?

- 
- A. Двохосьовий, комбінований
 - B. Простий, чашоподібний
 - C. Складний, багатоосьовий
 - D. Простий, одноосьовий
 - E. Складний, кулястий
- 



А. ДВОХОСЬОВИЙ, КОМБІНОВАНИЙ





У хворого після падіння рентгенологічно виявлено перелом кісток черепа в ділянці **потилично-соскоподібного шва**. До якого виду з'єднання відноситься потилично-соскоподібний шов?




А. Синдесмоз

В. Діартроз

С. Амфіартроз

Д. Синхондроз

Е. Геміартроз




А. Синдесмоз



■ У хворого **відкритий рот**, він не може його закрити і членороздільно говорити. Яке ураження у хворого?




- 
- 
- A. Вивих нижньої щелепи
 - B. Стрес
 - C. Перелом нижньої щелепи
 - D. Параліч жувальних м'язів
 - E. Ураження рухового центру мови




А. Вивих нижньої щелепи




До яких суглобів за класифікацією належить **серединний атлanto-осьовий суглоб?**



- 
- 
- А. Одноосьовий
 - В. Двоосьовий
 - С. Трьохосьовий
 - D. Комплексний
 - Е. Блокоподібний




■ А. Одноосьовий






Які рухи можливі в серединному атлanto-осьовому суглобі?



- 
- A. Всі відповіді вірні
 - B. Відведення-приведення
 - C. Згинання-розгинання
 - D. Колові обороти
 - E. Обертання (rotatio)




Е. Обертання (rotatio)




Навколо яких осей можливі рухи в серединному атлanto-осьовому суглобі?



- 
- 
- А. Горизонтальної
 - В. Вертикальної
 - С. Фронтальної
 - D. Вертикальної і фронтальної
 - Е. Сагітальної і вертикальної





■ В. Вертикальної





Яким за формою суглобових поверхонь є articulatio
atlanto-occipitalis?






A. Articulatio ellipsoidea

B. Articulatio sellaris

C. Ginglimus

D. Articulatio trochoidea

E. Articulatio plana



A. Articulatio ellipsoidea



У 3-х річного хлопчика при обстеженні виявлено **переднє тім'ячко**. В який термін в нормі відбувається заростання кістковою тканиною переднього тім'ячка?




А. наприкінці 2-го року життя


В. наприкінці 3-го року життя

С. на 5-му місяці життя

Д. на 2-му місяці життя

Е. на 9-му місяці життя






А. наприкінці 2-го року життя

Хворого оперують з приводу травми **скронево-нижньощелепного суглоба**. Під час розсічення виявлена структура, **що доповнює конгруентність** суглобових поверхонь. Що це за структура?





А. Складка

В. Зв'язка


С. Меніск

Д. Диск

Е. Губа





D. Диск



При падінні у маленької дитини було травмоване **переднє тім'ячко**. Який **вид з'єднання** кісток черепа зазнав патологічних змін?




- 
- 
- A. Синдесмоз
 - B. Синхондроз
 - C. Синостоз
 - D. Синсаркоз
 - E. Геміартроз



А. Синдесмоз

Пацієнт звернувся до лікаря з приводу **вивиху головки нижньої щелепи**. До якого **виду** сполучення кісток належить даний суглоб?






A. Синхондроз

В. Геміартроз

С. Діартроз


D. Синостоз


Е. Синдесмоз



С. Діартроз

Травматолог кладе свої великі пальці обернуті марлею на жувальні поверхні нижніх молярів хворого, другими пальцями захоплює нижній край нижньої щелепи та сильно тягне її до низу, а підборіддя у цей час повертає вверх. Далі щелепа відводиться назад. Що лікує травматолог?

- 
- 
- A. Перелом основи нижньої щелепи
 - B. Вивих нижньої щелепи
 - C. Перелом тіла нижньої щелепи
 - D. Артроз скронево-нижньощелепного суглоба
 - E. Запалення ясен



В. Вивих нижньої щелепи