


- ▶ При оперативному втручанні з приводу каменів жовчних ходів хірург повинен знайти **загальну печінкову протоку**. Між листками якої зв'язки вона знаходиться?

- ▶ А. Печінково-дванадцятипалокишкової.
- ▶ В. Печінково-шлункової.
- ▶ С. Печінково-ниркової.
- ▶ D. Круглої зв'язки печінки.
- ▶ Е. Венозної зв'язки.


- ▶ Печінково-дванадцятипалокишкової.

- ▶ При дослідженні **жовчний міхур** переповнений жовчю. Яка ділянка **позапечінкових жовчних ходів** патологічно змінена?

- ▶ А. Ліва часткова протока.
  - ▶ В. Міхурова протока.
  - ▶ С. Загальна печінкова протока.
  - ▶ D. Загальна жовчна протока.
  - ▶ Е. -
- 

► Міхурова протока.


- ▶ Під час холецистектомії (видалення жовчного міхура), конкременти (жовчні камінчики) можуть переміститися по широкій **міхуровій протоці в наступні відділи жовчовивідних шляхів**. В якому місці хірург повинен провести огляд?

- ▶ A. Ductus hepaticus communis.
  - ▶ B. Ductus choledochus.
  - ▶ C. Ductus hepaticus dexter.
  - ▶ D. Ductus hepaticus sinister.
  - ▶ E. Ductulus billiferi.
- 




- ▶ Ductus choledochus.

- ▶ Хворий потрапив в клініку зі скаргами на болі в ділянці живота, нудоту. При пальпації живота лікар-хірург виявив болючу точку на перетині правої ребрової дуги і зовнішнього краю правого прямого м'яза живота (**точка Кера**). Який попередній діагноз найімовірніше поставить лікар?

- ▶ А. Нефрит.
  - ▶ В. Панкреатит.
  - ▶ С. Холецистит.
  - ▶ D. Гастрит.
  - ▶ Е. Дуоденіт.
- 

▶ Холецистит.


- ▶ У хворого з **пухлиною підшлункової залози** розвинулася механічна жовтуха, внаслідок здавлення **жовчновивідної протоки**. Яка протока здавлена?

- ▶ A. ductus choledochus;
  - ▶ B. ductus cysticus;
  - ▶ C. ductus hepaticus communis;
  - ▶ D. ductus hepaticus dexter;
  - ▶ E. ductus hepaticus sinister
- 

- ▶ Ductus choledochus.

- ▶ У хворого з жовчнокам'яною хворобою розвилася механічна жовтуха. При обстеженні встановлено, що камінь знаходиться в загальній жовчній протоці. Які жовчовивідні протоки утворюють обтуровану протоку?



- ▶ A. Ductus hepaticus communis et ductus cysticus;
  - ▶ B. Ductus hepaticus dexter et sinister;
  - ▶ C. Ductus hepaticus dexter et ductus cysticus;
  - ▶ D. Ductus hepaticus sinister et ductus cysticus;
  - ▶ E. Ductus hepaticus communis et ductus choledochus.
- 


- ▶ Ductus hepaticus communis et ductus cysticus.

- ▶ Лікар пальпує у хворого 43 р. **нижній край печінки**. На якому рівні у здорової людини розташована нижня межа печінки ?

- ▶ А. По краю ребрової дуги
- ▶ В. На 2 см нижче краю ребрової дуги
- ▶ С. На 4 см нижче краю ребрової дуги
- ▶ D. На 4 см вище краю ребрової дуги
- ▶ Е. На 3 см нижче краю ребрової дуги

► По краю ребровой дуги


- ▶ Хворому поставлено діагноз: **панкреатит**.  
В якій області передньої стінки живота  
можна пропальпувати запалений орган?

- ▶ А. Надчеревній і лівому підребер'ї
  - ▶ В. Надчеревній і правому підребер'ї
  - ▶ С. Лівій бічній
  - ▶ D. Пупковій
  - ▶ Е. Правій бічній
- 

▶ Надчеревній і лівому підребер'ї




- ▶ Визначення розмірів печінки дозволило встановити, що по правій середньоключичній лінії верхня її межа знаходиться на рівні IV міжребрового простору, нижній її край виступає з під ребрової дуги на 4 см. Оцініть розміри печінки.

- ▶ А. Печінка збільшена - нижня її межа зміщена донизу.
  - ▶ В. Печінка зменшена - нижня її межа зміщена донизу.
  - ▶ С. Печінка зменшена - нижня її межа зміщена догори.
  - ▶ Д. Печінка збільшена - верхня її межа зміщена догори
  - ▶ Е. Розміри печінки нормальні.
- 

- ▶ Печінка збільшена - нижня її межа зміщена донизу.


- ▶ Під час операції, маніпулюючи в ділянці між шлунком та печінкою, хірург остерігався пошкодити **печінково-дванадцятипалу зв'язку**, тому що там знаходиться:

- ▶ А. Спільна жовчна протока, власна печінкова артерія, ворітна вена
  - ▶ В. Спільна жовчна протока, спільна печінкова артерія, ворітна вена печінки.
  - ▶ С. Власна печінкова артерія, шлунково-дванадцятипалокишкова артерія.
  - ▶ D. Ворітна вена печінки, печінкові вени
  - ▶ Е. Нижня порожниста вена, міхурова протока.
- 

- ▶ Спільна жовчна протока, власна печінкова артерія, ворітна вена

Проводячи хірургічне втручання на жовчному міхурі, лікарю необхідно визначити **загальну міхурову протоку**. В якому анатомічному утворенні очеревини вона знаходиться?



- ▶ A. Lig. Hepatoduodenale.
  - ▶ B. Lig. Hepatorenale.
  - ▶ C. Lig. Gastrocolicum.
  - ▶ D. Lig. Duodenorenale.
  - ▶ E. Lig. Hepatogastricum.
- 



▶ Lig. Hepatoduodenale.


- ▶ У хворого 62 років, який звернувся до лікаря зі скаргами на підвищену спрагу, схуднення, прискорене сечовиділення. Був поставлений діагноз: цукровий діабет. Яка залоза уражена?

- ▶ А. Підшлункова залоза
- ▶ В. Острівці підшлункової залози
- ▶ С. Гіпофіз
- ▶ D. Надниркова залоза
- ▶ Е. Щитоподібна залоза

## ► Підшлункова залоза

1. A patient with cholelithiasis fell ill with mechanic jaundice. Examination revealed that the stone was in the **common bile duct**. What bile-excreting ducts make up the obturated duct?

.


- ▶ A. Ductus hepaticus sinister et ductus cysticus
  - ▶ B. Ductus hepaticus dexter et sinister
  - ▶ C. Ductus hepaticus dexter et ductus cysticus
  - ▶ D. Ductus hepaticus communis et ductus cysticus
  - ▶ E. Ductus hepaticus communis et ductus choledochus
- 

# **Ductus hepaticus communis et ductus cysticus**

A surgeon has to find the **common hepatic duct** during the operative intervention on account of concrements in the gall ducts. The common hepatic duct is located between the leaves of:





- ▶ A. Venous ligament
  - ▶ B. Hepatogastric ligament
  - ▶ C. Hepatorenal ligament
  - ▶ D. Round ligament of liver
  - ▶ E. Hepatoduodenal ligament
- 

# **Hepatoduodenal ligamen**

