

У хворого після перелому верхньої третини плечової кістки розвинувся параліч задньої групи м'язів плеча і передпліччя. Який нерв пошкоджено?

А. Променевий  
В. Ліктьовий  
С. Серединний  
D. М'язово-шкірний  
Е. Пахвовий

- Променевий

Випадково стукнувшись ліктем об стіл, хворий відчув пекучість і **поколювання на внутрішній поверхні передпліччя**. Який нерв був травмований в цьому випадку?

- A. N. ulnaris.
- B. N. radialis.
- C. N. medianus.
- D. N. axillaris.
- E. N. musculocutaneus.

- N. ulnaris.

Хворий скаржиться на порушення чутливості шкіри в медіальній частині тильної та долонної поверхні кисті. Який з нервів ушкоджений?

- A. N. ulnaris
- B. N. radialis
- C. N. medianus
- D. N. Musculocutaneus
- E. N. cutaneus antebrachii medialis

- A. N. ulnaris

Після травми передньої поверхні верхньої третини передпліччя у хворого порушена **пронація**, ослаблене **долонне згинання кисті** і порушена **чутливість шкіри 1,2,3-го та променевої сторони 4-го пальців долонної поверхні та шкіри нігтьової і проміжної фаланг тильної поверхні 2,3,4 пальців**. Який нерв уражений при порушенні вказаних функцій?

- A. Серединний нерв у верхній третині передпліччя
- B. Ліктьовий нерв
- C. Променевий нерв
- D. М'язово-шкірний нерв
- E. Присередній шкірний нерв передпліччя

Серединний нерв у верхній третині передпліччя

У постраждалого з глибокою травмою м'яких структур присередньої поверхні дистальної половини плеча при обстеженні виявлена **втрата чутливості 5-го і 4-го пальців**. Який нерв пошкоджено?

- A. ліктьовий
- B. променевий
- C. серединний
- D. присередній шкірний передпліччя
- E. м'язово-шкірний

- ліктьовий

Хворий скаржиться на порушення чутливості шкіри в медіальній частині тильної та долонної поверхні кисті. Який з нервів ушкоджений?

- A. N. ulnaris
- B. N. radialis
- C. N. medianus
- D. N. musculocutaneus
- E. N. cutaneus antebrachii medialis

- N. ulnaris

У хворого після перелому верхньої третини плечової кістки розвинувся параліч задньої групи м'язів плеча і передпліччя. Який нерв пошкоджено?

А. Промєневий

В. Ліктєвий

С. Серєдинний

Д. М'язово-шкірний

Е. Пахвовий

- Променевий

Хворий не відчуває **дотику до шкіри в ділянці присередньої поверхні плеча**. Запалення якого нерва спостерігається у хворого?

- A. Шкірного присереднього нерва плеча
- B. Шкірного присереднього нерва передпліччя
- C. Променевого нерва
- D. Ліктьового нерва
- E. Пахвового нерва

Шкірного присереднього нерва плеча

При обстеженні пацієнта з ножовими ранами правої руки встановлено втрату чутливості шкіри бічної половини тильної поверхні кисті та проксимальних фаланг 1-го, 2-го і частково 3-го пальців. Який нерв пошкоджено?

- A. Променевий
- B. Серединний
- C. Ліктьовий
- D. М'язово-шкірний
- E. Бічний шкірний передпліччя

- Променевий

У постраждалого виявлено рану верхньої частини передньої ділянки плеча. При обстеженні встановлена втрата активного **згинання в ліктьовому суглобі і чутливості шкіри передньо-бічної поверхні передпліччя**. Порушення якого нерва має місце?

А. М'язово-шкірного

В. Променевого

С. Серединного

Д. Ліктьового

Е. Пахвового

- М'язово-шкірного

У хворого спостерігається порушення чутливості на латеральній поверхні передпліччя. Який нерв пошкоджений?

A. N. musculocutaneus

B. N. radialis

C. N. ulnaris

D. N. medianus

E. N. axillaris

- N. musculocutaneus

У хворого відсутня чутливість шкіри мізинця. Який нерв  
постраждав?

- A. Ліктьовий
- B. Серединний
- C. Променевий
- D. М'язово – шкірний
- E. Присередній шкірний передпліччя

- Ліктьовий

У травматологічне відділення поступив чоловік 35 років з травмою в ділянці правого плеча. При огляді встановлено **перелом діафіза** правої **плечової кістки** в середній третині зі зміщенням відломків; **пальці** правої **кисті не розгинаються**. Який нерв постраждав?

А. Променевий

В. Ліктьовий

С. Серединний

Д. М'язово – шкірний

Е. Пахвовий

- Променевий

До лікаря звернувся хворий зі скаргами на неможливість **відведення правої руки** після раніше перенесеної травми. При обстеженні пасивні рухи не обмежені. Виявлена **атрофія дельтоподібного м'яза**.  
Який нерв пошкоджено?

А. Пахвовий

В. Променевий

С. Ліктьовий

Д. Серединний

Е. Надлопатковий

- Пахвовий

При запаленні глибоких лімфатичних вузлів пахвової ділянки хірург вимушений був розкрити глибоко розміщений гнійник. Однак, після операції у хворого виникло ускладнення: втратилась здатність згинати предпліччя в ліктьовому суглобі і порушилась шкірна чутливість передньо-латеральної поверхні передпліччя. Поранення якого нерва плечового сплетення виникло при оперативному втручанні?

- A. М'язово-шкірного нерва
- B. Ліктьового нерв
- C. Променевого нерв
- D. Серединний нерв
- E. Присереднього шкірний нерв плеча

- М'язово-шкірного нерва

Після перенесеної травми в ділянці плеча хворий не може **розігнути кисть**. При огляді відмічено також зниження больової і температурної **чутливості в ділянці 2,5 пальців тильної сторони кисті з боку великого пальця**. Який нерв пошкоджено внаслідок травми?

А. Променевий  
В. Серединний  
С. Ліктьовий  
D. Пахвовий  
Е. М'язово-шкірний

- Променевий

При обстеженні хворого невропатолог виявив підвищену больову чутливість шкіри на долонній поверхні I, II, III і променевої сторони IV-го пальців, середньої частини долоні та підвищення I-го пальця.

Функція якого нерва пошкоджена ?

- A. Серединний нерв.
- B. Присередній шкірний нерв передпліччя.
- C. Ліктьовий нерв.
- D. Променевий нерв.
- E. М'язово-шкірний нерв.

- Серединний нерв.

У хворого “кігтеподібна” кисть. Який нерв уражений?

- А. Ліктювий нерв.
- В. Променевий.
- С. Серединний.
- Д. М'язово-шкірний.
- Е. Пахвовий.

- Ліктьовий нерв

У пацієнта спостерігається обмеження згинання у ліктьовому суглобі, зниження тонусу двоголового м'язу плеча та втрата чутливості шкіри на передньо-латеральній поверхні передпліччя.

Функція якого нерва постраждала ?

- A. N. musculocutaneus
- B. N. axillaris
- C. N. medianus
- D. N. ulnaris
- E. N. Radialis

- N. musculocutaneus

The patient with chronic disease of liver has a **positive phrenic symptom**. What muscle a diaphragmatic nerve has been compressed to for verification of the symptom?

- A. To the middle scalene muscle.
- B. To the subclavian muscle.
- C. To the posterior scalene muscle.
- D. To the sternocleidomastoid muscle.
- E. To the anterior scalene muscle.

To the anterior scalene muscle.

Regular excursions of a diaphragm were broken because of an operational trauma of soft tissues of a neck on right hand side. What nerve has suffered?

- A. N. intercostales.
- B. N. vagus
- C. N. phrenicus dexter.
- D. N. accessorius
- E. Rr. dorsales nervi spinalis

N. phrenicus dexter.

Loss sensation of IV and V fingers is revealed in patient after trauma of medial humeral epicondyle. What nerve is injured?

- A. Ulnar
- B. Radial
- C. Median
- D. Medial cutaneous nerve of forearm
- E. Musculocutaneous

# Ulnar

## CUTANEOUS NERVES OF THE HAND

Palmar view

Dorsal view

