



Після травми ока виникло нагноєння м'яких тканин **орбіти**. Через який анатомічний утвір гнійний процес може поширитися у **середню черепну ямку**?




- 
- 
- A. Через верхню очноямкову щілину
 - B. Через передній решітчастий отвір
 - C. Через задній решітчастий отвір
 - D. Через нижню очноямкову щілину
 - E. Через вилично-очноямковий отвір

Відповідь А. Через верхню очноямкову щілину




У хворого виявлене руйнування стінки барабанної порожнини з розповсюдженням гною до задньої черепної ямки. Яка із стінок зруйнована?



- 
- 
- A .Paries mastoideus
 - B. Paries membranaceus
 - C. Paries labyrinthicus
 - D .Paries tegmentalis
 - E .Paries jugularis

Відповідь А .Paries mastoideus



Дитина 3-х років поступила в клініку з діагнозом: отит. Є вірогідність розповсюдження гною із барабанної порожнини через **верхню стінку**. Куди може потрапити гній?






A.В середню черепну ямку.

B.У внутрішнє вухо

C.В слухову трубу

D.В зовнішній слуховий прохід


E.В задню черепну ямку




Відповідь А.В середню черепну ямку




В лікарню надійшов пацієнт з травмою голови. Діагностовано перелом клиноподібної кістки у ділянці основи **крилоподібного відростка**. Вміст якого з названих каналів може бути пошкоджено?

- 
- 
- А.Лицевий
 - В.М'язово-трубний
 - С.Крилоподібний
 - D.Сонний
 - Е. Барабанний

► С.Крилоподібний



Під час обстеження пацієнта у відділенні щелепно-лицевої хірургії лікар вивчає **контрфорси верхньої щелепи**. Скільки основних контрфорсів вона має?




➤ A.4

➤ B.6

➤ C.3


➤ D.5

➤ E.2




➡ A.4


У пацієнта травма черепа. На рентгенограмі спостерігається лінія перелому основи черепа, що проходить між **овальним та круглим отворами**. Яка кістка черепа ушкоджена?

- 
- 
- ▶ А. Потилична
 - ▶ В. Решітчаста
 - ▶ С. Скронева
 - ▶ D. Клиноподібна
 - ▶ Е. Вилична

➡ D. Клиноподібна



► При обстеженні пацієнта в відділенні щелепно-лицевої хірургії лікар вивчає **контрфорси нижньої щелепи**.
Скільки основних контрфорсів вона має?



➤ A.4


➤ B.2

➤ C.3


➤ D.5

➤ E.1


➡ B.2



- 
- Хворий 35 років, звернувся до лікаря зі скаргами на сильний нежить і втрату відчуття запахів на протязі тижня. При обстеженні, в носовій порожнині велика кількість слизу, що покриває слизову оболонку і блокує **рецептори нюху**. Де в носовій порожнині розташовані ці рецептори?

- 
- 
- А. Верхня носова раковина
 - В. Середня носова раковина
 - С. Нижня носова раковина
 - D. Загальний носовий хід
 - Е. Присінок носа


■ А. Верхня носова раковина






У хворого при гнійному запаленні **носової порожнини** це запалення поширилось у **передню черепну ямку**. Через який анатомічний утвір розповсюдилось запалення?




- 
- 
- A. Foramina cribrosa
 - B. Recessus sphenoethmoidalis
 - C. Fissura orbitalis inferior
 - D. Canalis infraorbitalis
 - E. Fissura orbitalis superior

A. Foramina cribrosa






У хворого із гнійним середнім отитом інфекція із барабанної порожнини поширилась на цибулину яремної вени. Анатомічною передумовою цього ускладнення є витончення однієї із стінок барабанної порожнини. Аномалія якої стінки має місце?


- 
- 
- А.Верхньої
 - В.Нижньої
 - С.Бічної
 - Д.Передньої
 - С.Задньої


В.Нижньої






Внаслідок пухлини гіпофізу при рентгенографії виявлено збільшення і **руйнування ямки турецького сідла**. Стінка якої кісткової порожнини руйнується?



- 
- 
- А.Пазуха клиноподібної кістки
 - В.Барабанної порожнини
 - С.Носової порожнини
 - D.Пазуха лобової кістки
 - Е.Пазуха верхньої щелепи

А.Пазуха клиноподібної кістки







У нейрохірургічну клініку госпіталізовано чоловіка з внутрішньочерепною пухлиною. Після обстеження встановлено, що пухлина звужує простір, який обмежений великим і малим крилами (ala major, ala minor) клиноподібної кістки (os sphenoidale). Який простір звужує пухлина?

- 
- 
- A.Верхню очноямкову щілину (fissura orbitalis superior)
 - B.Крилоподібний канал (canalis pterygoideus)
 - C.Остистий отвір (foramen spinosum)
 - D.Овальний отвір (foramen ovale)
 - E.Круглий отвір (foramen rotundum)

- А.Верхню очноямкову щілину (fissura orbitalis superior)




- 
- 
- У дитини **3-х років** у передній ділянці волосяної частини голови **виявлено прогинання кісток черепа**. Які структури черепа новонародженого визначають це явище?

- 
- 
- A. Fonticulus anterior
 - B. Fonticulus mastoideus
 - C. Fonticulus occipitalis
 - D. Fonticulus posterior
 - E. Fonticulus sphenoidalis
 -

➡ A. Fonticulus anterior


Вигляд збоку



Вигляд згори





- 
- 
- У жінки діагностовано запалення **третьої гілки трійчастого нерва**. Через **який отвір** виходить із черепа ця гілка?


- 
- 
- А.Остистий
 - В.Круглий
 - С.Овальний
 - Д.Яремний
 - Е.Рваний
 -



■ С.Овальний



- 
- 
- * Після пластичної операції на піднебінні у хлопчика виникло ускладнення у вигляді запалення кістки в ділянці розташування малих піднебінних отворів (foramina palatine minora). Яка кістка уражена запаленням?

- 
- 
- А. Верхня щелепа (maxilla).
 - В. Решітчаста кістка (os ethmoidale).
 - С. Лобова кістка (os frontale).
 - D. Клиноподібна кістка (os sphenoidale).
 - Е. Піднебінна кістка (os palatinum)

■ Е. Піднебінна кістка (os palatinum)

