

- При проведенні операції на **тонкій кишці** лікар виявив ділянку слизової оболонки, де на тлі циркулярних складок була присутня **поздовжня складка**. Який відділ тонкої кишки має таку будову?

- A. Pars descendens duodeni.
- B. Pars horizontalis duodeni.
- C. Pars ascendens duodeni.
- D. Початковий відділ jejunum.
- E. Дистальний відділ ileum.

- A. Pars descendens duodeni.

- Хворий пред'являє скарги на порушення евакуаторної функції шлунка (тривала затримка їжі в шлунку). При обстеженні виявлено **пухлину початкового відділу 12-палої кишки**. Визначите локалізацію пухлини.

- A. Pars inferior.
- B. Pars superior
- C. Pars descendens.
- D. Pars ascendens.
- E. Flexura duodeni interior.

- **Pars superior.**

- У слизовій кишки хірургом виявлено групові лімфоїдні вузлики (Пейерові бляшки). Який це відділ кишки?

- А. Пряма кишка.
- В. Порожня кишка.
- С. Сліпа кишка.
- D. Дванадцятипала кишка.
- Е. Клубова кишка.

- **Клубова кишка.**

- При ендоскопії тонкої кишки на слизовій оболонці видно **поздовжню складку**. Яку частину якої кишки бачить лікар?

- А. Висхідна частина дванадцятипалої кишки.
- В. Горизонтальна частина дванадцятипалої кишки.
- С. Низхідна частина дванадцятипалої кишки.
- D. Початкова частина порожньої кишки.
- Е. Кінцева частина клубової кишки.

- **Низхідна частина дванадцятипалої кишки.**

У хворого 60 років унаслідок злоякісної пухлини великого сосочка дванадцятипалої кишки виникла обтураційна жовтяниця. Видаляючи пухлину, хірург бере до уваги, що на великому сосочку дванадцятипалої кишки відкривається:

- А. Міхурна протока.
- В. Загальна печінкова протока.
- С. Печінково-підшлункова ампула.
- D. Права печінкова протока.
- Е. Ліва печінкова протока.

- **Печінково-підшлункова ампула.**

- Дитині хірург поставив діагноз **дивертикула Меккеля**. В якому відділі шлунково-кишкового тракту необхідно розшукувати його під час оперативного втручання?

- А. У ділянці клубової кишки.
- В. У ділянці порожньої кишки.
- С. У ділянці ободової кишки.
- D. У ділянці дванадцятипалої кишки.
- Е. У ділянці сигмоподібної ободової кишки.

- **У ділянці клубової кишки.**

- У хворого при фіброгастродуоденоскопії виявлено запалення **цибулини 12-палої кишки**. В якому відділі кишки локалізується запалення?

- A. Pars ascendens.
- B. Pars descendens.
- C. Pars horizontalis.
- D. Pars superior.
- E. Pars inferior

- **Pars superior.**

- Хворому призначено ендоскопію 12-палої кишки. У результаті виявлено запалення **великого дуоденального сосочка** і порушення виділення жовчі у просвіт кишки. В якому відділі 12-палої кишки виявлено порушення?

- А. Нижня горизонтальна частина.
- В. Висхідна частина.
- С. Цибулина.
- D. Верхня частина.
- Е. Низхідна частина.

- **Низхідна частина.**

- У потерпілого ножове поранення в поперекову ділянку справа. Пошкоджена **права нирка**. Які органи заочеревинного простору можуть бути пошкоджені?

- А. 12-пала кишка
- В. Поперечна ободова кишка
- С. Лівий згин поперечної ободової кишки
- D. Низхідна ободова кишка
- Е. Початковий відділ порожнистої кишки

- **12-пала кишка**

- Обстежуючи секційний матеріал, патанатом помітив на внутрішній поверхні одного з відрізків кишечника folliculi lymphatici aggregati (Пеєрові бляшки). Якій кишці належить цей відрізок?

- A. Ileum
- B. Jejunum
- C. Duodenum
- D. Colon ascendens
- E. Colon descendens

- **Ileum**

- До лікарні поступив хворий з симптомами механічної жовтухи і з підозрою на рак великого сосочка дванадцятипалої кишки, який розташований в:

- А. низхідній частині дванадцятипалої кишки.
- В. верхній частині дванадцятипалої кишки.
- С. горизонтальній частині дванадцятипалої кишки.
- D. висхідній частині дванадцятипалої кишки.
- Е. дванадцятипало-порожньому згині.

- **низхідній частині дванадцятипалої кишки.**

- У дитини 10-ти років хірург запідозрив запалення **дивертикула Меккеля**, що потребує оперативного втручання. Вкажіть, ревізія якої ділянки кишківника необхідна, щоб віднайти дивертикул?

- А. 1 м клубової кишки від місця впадіння її в товсту кишку
- В. 0,5 м порожньої кишки від зв'язки Трейца
- С. Низхідну ободову кишку
- D. Висхідну ободову кишку
- Е. 20 см клубової кишки від клубово-сліпокишкового кута

- **А. 1 м клубової кишки від місця впадіння її в товсту кишку**

- До лікарні звернувся хворий 22 років зі скаргами на нічні болі, неможливість прийому м'ясної їжі. При фіброгастродуоденоскопії виявлено виразку **цибулини 12-палої кишки**. В якому відділі кишки локалізується виразка?

- A. Pars ascendens.
- B. Pars descendens.
- C. Pars horizontalis.
- D. Pars superior.
- E. Pars inferior

- **Pars superior.**

- При фіброгастродуоденоскопії лікарю необхідно оглянути **великий сосочок 12-палої кишки**. Яке анатомічне утворення може служити орієнтиром для його знаходження?

- А. Поздовжня складка 12-палої кишки
- В. Кругла складка 12-палої кишки
- С. Цибулина 12-палої кишки
- D. Дуоденальні залози
- Е. Печінково-дуоденальна зв'язка

А. Поздовжня складка 12-палої
КИШКИ

- Чоловік 26 р скаржиться на голодні і нічні болі в животі, печія протягом останніх 3-х місяців. Проведена гастродуоденоскопія. Виявлено виразка **цибулини дванадцятипалої кишки**. В якій ділянці **передньої черевної стінки** найбільш ймовірно виявлення хворобливості при пальпації.

- A. Reg. umbilicalis
- B. Reg. abdominalis lateralis dextra
- C. Reg. hypochondriaca dextra
- D. Reg. hypochondriaca sinistra
- E. Reg. epigastrica

E. Reg. epigastica