

1. Юнак 17 років доставлений в лікарню з відкритим переломом **ПОТИЛИЧНОЇ КІСТКИ** і сильною кровотечею з рани. Що може бути причиною сильної кровотечі в цьому випадку?

А. пошкодження поперечної
венозної пазухи

В. пошкодження печеристих пазух

С. пошкодження верхньої
кам'янистої пазухи

Д. пошкодження нижньої
кам'янистої пазухи

Е. пошкодження клиновидно-
тім'яної пазухи

А. пошкодження поперечної венозної пазухи

2. У хворого запалення середнього вуха ускладнилося **мастоїдитом**. Надалі виникла загроза гнійного **тромбозу найближчої венозної пазухи**. Яка саме пазуха може бути пошкоджена?

А. сигмоподібна

В. поперечна

С. верхня сагітальна

Д. клиноподібно-тім'яна

Е. нижня кам'яниста

А. сигмоподібна

3. У хворого, 26 років, виявлений великий фурункул м'яких тканин обличчя в ділянці кореня носа і нижньої повіки. Ускладненням цього захворювання може бути розповсюдження інфекції по венозним сполученням цього регіону в пазухи твердої мозкової оболони. Яка з пазух найбільш ймовірно може бути уражена?

А. печериста

В. сигмоподібна

С. верхня сагітальна

Д. потилична

Е. верхня кам'яниста

А. печериста

4. При проведенні трахеотомії у хворого 45 років, який потрапив в реанімаційне відділення лікарні з набряком **гортані**, була випадково травмована **яремна венозна дуга**, яка **лежить в:**

A. spatium interaponeuroticum
suprasternale

B. spatium pretracheale

C. spatium retropharyngeale

D. spatium interscalenum

E. spatium antescalenum

A. spatium
interaponeuroticum
suprasternale

5. Чоловік 70 років під час гоління зрізав гнійник в ділянці соскоподібного відростка. Через 2 дні він був доставлений в лікарню з діагнозом запалення оболон головного мозку. Яким шляхом інфекція потрапила в порожнину черепа? Крізь:

A. v. emissariae mastoideae

B. v. tympanicae

C. v. labyrinthi

D. v. facialis

E. v. auriculares

A. v. emissariae
mastoideae

6. При виконанні нижньої трахеотомії в ургентному порядку, яка проводилася по середній лінії ший, в подальшому ускладнилася кровотечею. Яке судинне утворення було пошкоджено?

A. arcus venosus juguli

B. v. jugularis anterior

C. a. thyroidea interior

D. v. thyroidea inferior

E. v. jugularis externa

A. arcus venosus juguli

7. При оперативному підході до щитоподібної залози з поперечного (комірного) доступу відкривається **міжапоневротичний надгруднинний простір**. Пошкодження якого анатомічного утворення, що знаходиться в цьому просторі, небезпечно для життя?

А. яремної венозної дуги

В. зовнішньої яремної вени

С. підключичної вени

Д. нижньої щитоподібної артерії

Е. верхньої щитоподібної артерії

А. яремної венозної дуги

8. У хворого внаслідок пошкодження шкіри в середній ділянці груднинно-ключично-соскоподібного м'яза виникла повітряна емболія. Яка вена шиї була травмована?

А. Зовнішня яремна вена

В. Передня яремна вена

С. Внутрішня яремна вена

Д. Задня вушна вена

Е. Поперечна вена шиї.

А. Зовнішня яремна вена

9. У хворого Л. 27 років з остеомієлітом **нижньої щелепи** в патологічний процес втягнута **вена**, яка проходить в **її каналі**. Внаслідок запалення у хворого виник набряк обличчя в ділянці **нижньої щелепи**. Яка вена уражена?

- A. V. alveolaris inferior
- B. V. submental
- C. V. lingual
- D. V. labialis inferior
- E. V. sphenopalatina

A. V. alveolaris inferior

10. У потерпілого - травма м'яких тканин та тім'яних кісток в ділянці стрілоподібного шва, яка супроводжується сильною кровотечею. Яке з утворень найімовірніше пошкоджено?

- 
- A. Sinus rectus
 - B. Sinus petrosus superior
 - C. Sinus sagittalis superior
 - D. Sinus sagittalis inferior
 - E. Sinus transversus

C. Sinus sagittalis superior

11. У потерпілого травма м'яких тканин та **тім'яних кісток в ділянці їх з'єднання між собою**, яка супроводжується сильною кровотечею. Яке судинне утворення пошкоджене ?

- A. Sinus sagittalis superior
- B. Sinus transversus
- C. Sinus petrosus superior
- D. Sinus rectus
- E. Sinus sagittalis inferior

A. Sinus sagittalis superior

12. Студентка 17 років видавила
гнійник у медіальному куті ока.
Через 2 дні вона поступила в
інститут нейрохірургії з
діагнозом: тромбоз печеристої
пазухи. Яким шляхом інфекція
попала в цю пазуху?

- A. Чеpez v. angularis
- B. Чеpez v. maxillaris
- C. Чеpez v. profunda faciei
- D. Чеpez v. transversa faciei
- E. Чеpez v. diploicae frontalis

A. Чеpez v.angularis

13. У чоловіка 40 років із флегмоною обличчя гнійне запалення та значний набряк м'яких тканин, спричинили зменшення просвіту **лицевої вени** і **ретроградний** (зворотній) напрямок **току венозної крові**. Інфікування якої венозної пазухи можливе?

А. Печеристої

В. Верхньої кам'янистої

С. Нижньої кам'янистої

Д. Прямої

Е. Сигмоподібної

А. Печеристої

14. У дитини М., 6 років гнійне запалення середнього вуха ускладнилось гнійним запаленням **комірок соскоподібного відростка**. Виникла необхідність трепанації (розтину) **соскоподібного відростка**.

Про близьке розташування якого **венозного синуса** слід пам'ятати хірургу, щоб уникнути його пошкодження?

- А. Сигмоподібного
- В. Верхнього сагітального
- С. Нижнього сагітального
- Д. Поперечного
- Е. Печеристого

А. Сигмоподібного

15. Хворий страждає на
параліч очних м'язів,
порушення зіничного
рефлексу, діплопію, біль за
ходом трійчастого нерва. Про
аневризму (розширення)
якого венозного синуса
можливо думати ?

- A. Sinus cavernosus
- B. Sinus transversus
- C. Sinus sagittalis superior
- D. Sinus petrosus superior
- E. Sinus occipitalis

A. Sinus cavernosus

16. Хворий 27-ми років звернувся до лікаря зі скаргою на наявність твердої пухлини попереду від козелка вушної раковини. Хірург-стоматолог, видаляючи пухлину, виявив вену. Яка вена проходить у даній ділянці?

- A. V. retromandibularis
- B. V. facialis
- C. V. jugularis interna
- D. V. jugularis externa
- E. V. auricularis posterior

A. V. retromandibularis

17. Гнійні вогнища на
обличчі вище ротової
порожнини небезпечні
можливістю поширення
інфекції у порожнину
черепа. Наявністю яких
анастомозів вен обличчя
це зумовлено?

А. З очними венами

В. З крилоподібним сплетенням

С. З передніми вушними венами

Д. З потиличною веною

Е. З середньою і глибокими
скроневими венами

А. 3 очными венами

18. Хірург стоматолог накладав шви чоловіку 26 років, на різану рану в ділянці **ший над грудниною** і запобігав кровотечі з судини, що лежить **між поверхневим і глибоким** листком власної фасції ший. Це:

A. v. jugularis externa

B. arcus venosus juguli

C. v. thyroidea superior

D. v. thyroidea inferior

E. v. jugularis interna

B. arcus venosus juguli

19. Небезпечно витискувати гнійники на лиці, особливо вище ротової щілини. Через які венозні анастомози може поширитися інфекція у порожнину черепа?

- А. Анастомози вен лиця з середньою і глибокими скроневими венами
- В. Анастомози вен лиця з очними венами
- С. Анастомози вен лиця з передніми вушними венами
- Д. Анастомози вен лиця з крилоподібним сплетенням
- Е. Анастомози з потиличною веною

В. Анастомози вен лица з очними венами

20. У постраждалого з ножовим пораненням шиї визначається кровотеча. При первинній обробці рани встановлено, що пошкоджена судина яка розташована вздовж латерального краю груднинно-ключично-соскоподібного м'яза. Визначте цю судину.

- A. V. jugularis externa
- B. V. jugularis anterior
- C. A. carotis externa
- D. A. carotis interna
- E. V. jugularis interna

A. V. jugularis externa

21. У хворого внаслідок
ножового поранення ший
розпочалась кровотеча з
загальної сонної артерії, яка
проходить в **сонному**
трикутнику у складі **судинно-**
нервового пучка . Які складові
формують цей пучок разом з
артерією?

- A. n. phrenicus, v.jugularis externa
- B. n. vagus, v.jugularis interna
- C. n. vagus, v.jugularis anterior
- D. n. hypoglossusv.jugularis interna
- E. n. hypoglossus, v.jugularis
externa

B. n. vagus, v.jugularis interna

22. В постраждалого з ножовим пораненням шиї відмічається кровотеча. Кров темного кольору. При обробці встановлено пошкодження судини, яка розташована на передній поверхні шиї нижче під'язикової кістки. Яка судина пошкоджена?

A. A. carotis externa

B. V. jugularis interna

C. V. jugularis anterior

D. A. carotis communis

E. V. jugularis externa

C. V. jugularis anterior