

1. У чоловіка віком 35 років під час травми задньої поверхні плеча пошкоджено променевий нерв і артеріальна судина, що проходить поруч з ним в *canalis humeromuscularis*. Яку артерію пошкоджено?
 - A. *A. profunda brachii*
 - B. *A. ulnaris*
 - C. *A. radialis*
 - D. *A. axillaris*
 - E. *A. brachialis*
2. У пацієнта з'явилися ознаки запалення слизової оболонки *передніх та середніх комірок решітчастої кістки*. Крізь яке утворення носової порожнини стало можливим розповсюдження інфекції?
 - A. Середній носовий хід
 - B. Хоани
 - C. Нижній носовий хід
 - D. Верхній носовий хід
 - E. Загальний носовий хід
3. У пацієнта об'єктивно спостерігається: відсутні функції *розгинання, приведення та пронації плеча*. Пошкодження якого м'яза викликало такий стан?
 - A. Великого круглого
 - B. Підлопаткового
 - C. Надостьового
 - D. Малого круглого
 - E. Підостьового
4. До лікаря звернулися родичі пацієнта віком 52 років зі скаргами на те, що він не може прочитати написане, *не розуміє що йому кажуть*, але може розмовляти. Де локалізується зона ураження мозку?
 - A. У корі заднього відділу верхньої скроневої звивини
 - B. У гіпокампі
 - C. У корі переднього відділу верхньої скроневої звивини
 - D. У корі заднього відділу нижньої лобової звивини
 - E. -
5. Хірург виявив у чоловіка болючість у *правій пахвинній ділянці*. Захворювання яких органів має місце?
 - A. Апендикс, сліпа кишка
 - B. Пряма кишка і сліпа кишка
 - C. Дуоденум, тонка кишка
 - D. Висхідна ободова кишка, права нирка
 - E. Підшлункова залоза і дуоденум
6. Хворому проведено трепанацію і вишкрібання осередків відростка скроневої кістки через його гнійне запалення, яке перейшло з *середнього вуха*. На якому відростку здійснено хірургічне втручання?
 - A. *Processus mastoideus*
 - B. *Processus zygomaticus*
 - C. *Processus styloideus*
 - D. *Processus pterygoideus*
 - E. -

7. Пацієнт віком 28 років порізав склом передню поверхню передпліччя на 2 см нижче ліктьового суглоба і скаржиться, що він не здатний *обертати кисть досередини*. Функція якого м'яза, найімовірніше, порушена?

A. **M. pronator teres**

B. M. supinator

C. M. flexor pollicis longus

D. M. flexor digitorum profundus

E. M. pronator quadratus

8. Виконуючи оперативне втручання, хірург повинен потрапити до чепцевої сумки очеревинної порожнини через *чепцевий отвір* (отвір Вінслова). Які анатомічні структури обмежують його *попереду*?

A. **Печінково-дванадцятипалокишкова зв'язка**

B. Верхня частина 12-палої кишки

C. Печінко-ниркова зв'язка

D. Нутрощева поверхня печінки

E. Великий чепець

9. Під час хірургічного лікування стегнової грижі лікар виділяє *поверхневий отвір стегнового каналу*. Яка анатомічна структура його утворює?

A. *Hiatus saphenus*

B. Fossa femoralis

C. Septum femorale

D. Arcus iliopectineus

E. Fascia pectinea

10. У пацієнта спостерігається травма променево-зап'ясткового суглоба. Якими кістками *проксимального ряду зап'ястка* (крім горохоподібної) сформовано цей суглоб?

A. **Човноподібною, півмісяцевою, тригранною**

B. Човноподібною, трапецієподібною, гачкуватою

C. Човноподібною, трапецієподібною, півмісяцевою

D. Трапецієподібною, гачкуватою, півмісяцевою

E. -

11. У пацієнта віком 40 років після щелепно-лицевої травми порушилася *функція під'язичної та підщелепної залоз* зліва. У цих залозах відзначається гіпосалівація. Функція якої пари нерв порушена?

A. **VII пари**

B. XI пари

C. XII пари

D. X пари

E. VI пари

12. До лікаря звернувся хворий з ознаками *ексудативного плевриту*. В якому з перерахованих анатомічних утворень переважним чином може накопичуватися рідина?

A. **Recessus costodiaphragmaticus pleure**

B. Recessus costomediastinalis pleure

C. Recessus frenicomediastinalis pleure

D. Sinus transversus pericardii

E. Sinus obliquus pericardii

13. Під час огляду у хворого виявилося запалення анатомічного утворення, що врівноважує тиск між барабанною порожниною та глоткою. Назвіть це утворення:

- A. Слухова труба
- B. Зовнішній слуховий прохід
- C. Внутрішній слуховий прохід
- D. Внутрішнє вухо
- E. Соскоподібна печера

14. У пацієнта після травми в ділянці ліктьового суглоба з'явилося утруднення під час згинання 4-го і 5-го пальців кисті, зменшився в розмірах виступ мізинця. Під час огляду виявлено зниження больової та температурної чутливості в ділянці 4-го і 5-го пальців на долонній поверхні і 5-го та частково 4-го пальця на тильній поверхні кисті. Який нерв пошкоджено внаслідок травми?

- A. Ліктьовий
- B. Присередній шкірний нерв передпліччя
- C. М'язово-шкірний
- D. Серединний
- E. Променевий

15. Подразнення слизової оболонки бронхів викликає кашльовий рефлекс. Де замикається рефлекторна дуга цього рефлексу?

- A. Довгастий мозок
- B. Уставні нейрони на рівні спинного мозку
- C. Бічні роги спинного мозку
- D. Передні роги спинного мозку
- E. Середній мозок

16. Внаслідок травми у людини були пошкоджені півколові канали внутрішнього вуха. На які подразники не зможе адекватно реагувати ця людина?

- A. Рух з кутовим прискоренням
- B. Рух з лінійним прискоренням
- C. Шкірні
- D. Світлові
- E. Звукові

17. У пацієнта після катетеризації сечового міхура в загальному аналізі сечі з'явилася велика кількість свіжих еритроцитів, що ймовірно, пов'язано з пошкодженням найвузчої частини сечовипускного каналу. Яка частина сечівника пошкоджена?

- A. Перетинчаста
- B. Губчаста
- C. Дальша
- D. Ближча
- E. Передміхурова

18. У пацієнта під час огляду встановлено наявність атетозу та хореї. Яка структура ЦНС імовірно уражена?

- A. Смугасте тіло
- B. Довгастий мозок
- C. Лімбічна система

- D. Мозочок
- E. Гіпоталамус

19. Під час огляду пацієнта хірург установив наявність поранення *верхньої третини нирки*. Цілісність якого органу треба перевірити в цьому разі, зважаючи на синтопію *лівої нирки*?

- A. Шлунка
- B. Низхідної ободової кишки
- C. Печінки
- D. Поперечної ободової кишки
- E. Тонкої кишки

20. У пацієнта з відкритою травмою хребта виявлено *розрив правої половини спинного мозку*. Зникнення якого виду чутливості можна очікувати тільки з боку розриву?

- A. Пропріоцептивної
- B. Больової
- C. Тактильної
- D. Температурної
- E. -

21. Внаслідок кульового поранення в надключичній ділянці зліва у хворого виникло *порушення рухів верхньої кінцівки*. Які нервові структури пошкоджені?

- A. Плечове сплетення
- B. Міжреброві нерви
- C. Нервові корінці
- D. Спинний мозок
- E. Шийне сплетення

22. Лікар вимірює зовнішні розміри таза та визначає відстань *між великими вертлюгами* стегнових кісток. Який розмір визначив лікар?

- A. *Distantia intertrochanterica*
- B. *Distantia intercristalis*
- C. *Distantia interspinosa*
- D. *Conjugata externa*
- E. *Diameter oblique*