

ВІЛ/СНІД



Загальні відомості:

- ▶ Синдром набутого імунodefіциту вперше було зафіксовано в США у 1983 році. Впродовж двох місяців хворий помер. Сьогодні за добу у світі чотириста тисяч осіб заражується цією хворобою. Сам по собі СНІД не є смертельною хворобою, але функціонування його вірусу в організмі впливає на імунну систему так, що навіть проста нежить може призвести до смерті людини.
- ▶ Збудник — вірус, що має вигляд спіралі у трикутній серцевині. Він носить назву ВІЛ (вірус імунodefіциту людини) і має три типи: ВІЛ 1 та ВІЛ 2, що є дуже поширеними у Західній Європі, та ВІЛ 3, на який страждають переважно американці та африканці. Вірус вражає Т-лімфоцити, що служать для його розмноження, та макрофаги, що разносять його по організму.
- ▶ ВІЛ руйнує Т-лімфоцити, і це призводить до втрати організмом захисних реакцій, внаслідок чого активізується, так звана, умовно-патогенна флора організму і різко підвищується ймовірність смертельних запалень, уражень нервової системи, розвитку онкологічних захворювань.


ВІЛ передається такими способами:

- ▶ При використанні нестерильних голок чи шприців (тих, котрі вже були у вживанні і заражені ВІЛ) для ін'єкцій;
- ▶ При переливанні інфікованої крові неінфікованій людині;
- ▶ При занятті незахищеним статевим актом ;
- ▶ Від інфікованої матері до новонародженої дитини під час виношування плоду, при пологах чи годуючи дитину грудьми



ВІЛ не передається:

- ▶ Через чхання, кашель, при перебуванні в одному приміщенні з інфікованою людиною Через укуси комах;
- ▶ Через домашніх тварин;
- ▶ При використанні загального посуду (чашок, вилок, ложок), рушників, постільної білизни, телефону, унітазу, ванни, басейну, і т.д.;
- ▶ При обіймах, рукостисканні, поцілунку.



Симптоми:

У більшості людей після зараження ВІЛ не спостерігається жодних симптомів. Іноді за кілька днів після інфікування з'являються симптоми, що нагадують грип:

- ▶ □ збільшення лімфовузлів,
- ▶ □ лихоманка,
- ▶ □ втрата 10% ваги тіла впродовж двох місяців,
- ▶ □ слабкість.

Проте ці симптоми за кілька тижнів минають самі по собі. Безсимптомний етап розвитку хвороби може тривати до 10 років.



Діагностика СНІДу:

Так як ранній період ВІЛ-інфекції часто є безсимптомним, лікарі та інший медичний персонал можуть виявити його лише за допомогою дослідження крові пацієнта на наявність у ній антитіл до компонентів ВІЛ.



Міри профілактики:

Оскільки вакцини проти СНІДу не існує, єдиним способом запобігти інфекції є уникнення ситуацій, що несуть ризик зараження, таких як спільне використання голочок та шприців або практикування небезпечних статевих відносин.



ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ: ДАНІ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2021 РОКУ



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я

У БЕРЕЗНІ 2021 РОКУ В УКРАЇНІ ОФІЦІЙНО ЗАРЕЄСТРОВАНО*



1 286

ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ



419

ДІАГНОСТОВАНО СНІД



161

СМЕРТЕЙ ВІД СНІДУ

ШЛЯХИ ІНФІКУВАННЯ ВІЛ



ГЕТЕРОСЕСУАЛЬНИЙ
795



ГОМОСЕСУАЛЬНИЙ
37



ПАРЕНТЕРАЛЬНИЙ
451



ВЕРТИКАЛЬНИЙ**
148



НЕВІДОМИЙ
1

* Без урахування даних АР Крим з 2014 року та частини територій проведення внутрішньочеревної операції з 2015 року. ** Білячість з нем (1-99%) після 18 місяців не матиме ВІЛ-інфекції.

www.phc.org.ua

ПОШИРЕНІСТЬ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ


за даними медичного нагляду, станом на 01.04.2019 *




ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я



РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВИРУСА ВИЧ В МИРЕ




Млн. человек



Число ВИЧ-инфицированных в миллионах

Всего: **37,9** миллиона



Источник: UNAIDS, 2018 год

© DW

Дякую за увагу

Презентація закінчена.